

# Chapitre 3

## Dérivée

### 3.1 Définitions

**Définition 3.1** Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$ ,  $f$  une application de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$  et  $x \in ]a, b[$ . Pour  $h \in ]a - x, b - x[$ ,  $h \neq 0$ , on pose  $\varphi(h) = \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ . On dit que  $f$  est dérivable en  $x$  si  $\varphi$  a une limite finie en 0 (cette limite est alors unique, d'après la proposition 1.1, chapitre 1). On note alors  $f'(x)$  cette limite (on a donc  $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h)$ ).

**Remarque 3.1** On reprend les hypothèses de la définition précédente. Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$ .  $f$  une application de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$  et  $x \in ]a, b[$ . Pour  $h \in ]a - x, b - x[$ ,  $h \neq 0$  on pose  $\varphi(h) = \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ . On suppose que  $\varphi$  a une limite finie en 0. Cette limite est notée  $f'(x)$ . En posant  $\varphi(0) = f'(x)$ , la fonction  $\varphi$  est alors continue en 0.

Nous donnons maintenant une autre manière de définir la dérivée. L'intérêt de cette seconde définition est qu'elle sera généralisable pour des applications de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^p$  si  $n > 1$ .

**Définition 3.2** Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$ ,  $f$  une application de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$  et  $x \in ]a, b[$ . On dit  $f$  est différentiable en  $x$  si il existe  $A \in \mathbb{R}$  t.q.

$$f(x+h) = f(x) + Ah + hg(h), \text{ pour } h \text{ t.q. } x+h \in ]a, b[,$$

avec  $\lim_{h \rightarrow 0} g(h) = 0$  (et donc  $g$  continue en 0 si on pose  $g(0) = 0$ ). La différentielle de  $f$  en  $x$  est alors l'application linéaire de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  :  $h \mapsto Ah$ . (La proposition 3.1 montre que  $A$  est unique.)

Voici le lien entre ses deux définitions.

**Proposition 3.1** Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$ ,  $f$  une application de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$  et  $x \in ]a, b[$ . On a alors :

1. L'application  $f$  est dérivable en  $x$  si et seulement si elle est différentiable en  $x$ .
2. Si  $f$  est dérivable, la différentielle de  $f$  est l'application linéaire de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  :  $h \mapsto f'(x)h$ .

DÉMONSTRATION :

Pour  $h \in ]a - x, b - x[$ ,  $h \neq 0$ , on pose  $\varphi(h) = \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ .

Si  $f$  est dérivable en  $x$ , on a  $\lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h) = f'(x)$ , c'est-à-dire  $\varphi(h) = f'(x) + g(h)$  avec  $\lim_{h \rightarrow 0} g(h) = 0$ . On en déduit donc que  $f(x+h) = f(x) + hf'(x) + hg(h)$  avec  $\lim_{h \rightarrow 0} g(h) = 0$ . Ceci montre que  $f$  est

différentiable en  $x$  et que la différentielle de  $f$  en  $x$  est l'application linéaire de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  qui à  $h$  associe  $f'(x)h$ .

Réciproquement, on suppose maintenant que  $f$  est différentiable en  $x$ . Il existe donc  $A \in \mathbb{R}$  t.q.  $f(x+h) = f(x) + Ah + hg(h)$  (pour  $h$  t.q.  $x+h \in ]a, b[$ ) et  $\lim_{h \rightarrow 0} g(h) = 0$ . On en déduit que  $\varphi(h) = A + g(h)$  et donc, comme  $\lim_{h \rightarrow 0} g(h) = 0$ , que  $f$  est dérivable en  $x$  et  $f'(x) = A$ .

On a donc bien montré les deux assertions de la proposition 3.1. ■

**Définition 3.3 (Tangente à la courbe)** Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$ ,  $f$  une application de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$  et  $x \in ]a, b[$ . On suppose que  $f$  est dérivable en  $x$ . La tangente à la courbe de  $f$  au point  $(x, f(x))$  est la droite d'équation  $y \mapsto f(x) + f'(x)(y - x)$ .

**Remarque 3.2** Soit  $f$  une application continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $x \in \mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est dérivable en  $x$ . En général (c'est à dire en dehors de certains points particuliers que nous appellerons "points d'inflexion"), la droite de pente  $f'(x)$  et passant par le point  $(x, f(x))$  est la seule, parmi toutes les droites passant par le point  $(x, f(x))$ , à ne pas traverser le courbe de  $f$  au point  $(x, f(x))$ .

**Remarque 3.3** Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$ ,  $f$  une application de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$  et  $x \in ]a, b[$ . Le fait que  $f$  soit dérivable en  $x$  implique que  $f$  est continue en  $x$ . La réciproque est fautive comme le montre l'exemple  $f(x) = |x|$  pour  $x \in \mathbb{R}$  ( $f$  est continue en 0 mais non dérivable en 0).

## 3.2 Opérations sur les dérivées

**Proposition 3.2** Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$ .  $f$  et  $g$  deux applications de  $I = ]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$  et  $x \in ]a, b[$ . On suppose que  $f$  et  $g$  sont dérivables en  $x$ . Alors :

1. L'application  $f + g$  est dérivable en  $x$  et  $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$ .
2. L'application  $fg$  est dérivable en  $x$  et  $(fg)'(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x)$ .
3. On suppose  $g(y) \neq 0$  pour tout  $y \in I$ . L'application  $f/g$  est alors définie sur  $I$ ,  $f/g$  est dérivable en  $x$  et :

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)}{g(x)} - \frac{f(x)g'(x)}{g^2(x)} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}.$$

DÉMONSTRATION :

Pour simplifier les écritures (cela ne change pas les raisonnements), on se limite au cas  $I = \mathbb{R}$ .

1. Pour  $h \neq 0$ , on remarque que

$$\frac{(f(x+h) + g(x+h)) - (f(x) + g(x))}{h} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{g(x+h) - g(x)}{h}.$$

Comme les deux termes de droite ont une limite quand  $h \rightarrow 0$ , on en déduit que le terme de gauche a aussi une limite quand  $h \rightarrow 0$ . Cette limite est  $f'(x) + g'(x)$ . Ceci prouve bien que  $f + g$  est dérivable en  $x$  et que  $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$ .

2. la démonstration est un peu plus longue pour ce deuxième item. Pour  $h \neq 0$ , on a :

$$\frac{fg(x+h) - fg(x)}{h} = \frac{(f(x+h) - f(x))g(x+h)}{h} + \frac{f(x)(g(x+h) - g(x))}{h}.$$

Comme  $f$  est dérivable en  $x$  et que  $g$  est continue en  $x$  (car  $g$  est dérivable en  $x$ ), le premier terme du membre de droite tend vers  $f'(x)g(x)$  quand  $x$  tend vers 0. Comme  $g$  est dérivable en  $x$ , le second terme du membre de droite tend vers  $f(x)g'(x)$  quand  $x$  tend vers 0. On obtient bien, finalement, que  $fg$  est dérivable en  $x$  et que  $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ .

3. Pour ce troisième item, on commence par montrer que la fonction  $1/g$  (qui est bien définie sur  $I$  car  $g$  ne s'annule pas) est dérivable et par calculer sa dérivée. Pour  $h \neq 0$ , on a :

$$\frac{1}{h} \left( \frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)} \right) = \frac{g(x) - g(x+h)}{hg(x+h)g(x)} = -\frac{g(x+h) - g(x)}{h} \frac{1}{g(x+h)g(x)}.$$

Comme  $g$  est continue et dérivable en  $x$ , on en déduit que  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left( \frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)} \right) = -\frac{g'(x)}{g^2(x)}$  et donc que  $\frac{1}{g}$  est dérivable en  $x$  et que sa dérivée est  $\frac{-g'(x)}{g^2(x)}$ .

Pour conclure on utilise maintenant le deuxième item en remarquant que  $\frac{f}{g} = f \left( \frac{1}{g} \right)$ . On obtient que  $\frac{f}{g}$  est dérivable en  $x$  et que

$$\left( \frac{f}{g} \right)'(x) = \frac{f'(x)}{g(x)} - \frac{g'(x)f(x)}{g^2(x)}.$$

■

**Proposition 3.3 (Dérivée d'une fonction composée)** Soit  $I$  et  $J$  deux intervalles ouverts de  $\mathbb{R}$ ,  $g$  une application de  $I$  dans  $\mathbb{R}$  et  $f$  application de  $J$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $\text{Im}(g) \subset J$ . Soit  $x \in I$ . On suppose que  $g$  est dérivable en  $x$  et  $f$  dérivable en  $g(x)$ . Alors,  $f \circ g$  est dérivable en  $x$  et  $(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x)$ .

DÉMONSTRATION : Ici aussi, on suppose, pour simplifier les écritures, que  $I = J = \mathbb{R}$ . On va raisonner ici en utilisant plutôt la notion de différentiabilité (équivalente, par la proposition 3.1, à la notion de dérivabilité).

Comme  $g$  est différentiable en  $x$ , on a pour tout  $h \in \mathbb{R}$ ,

$$g(x+h) = g(x) + g'(x)h + hr(h),$$

avec  $\lim_{h \rightarrow 0} r(h) = 0$  (et donc  $r$  continue en 0 en posant  $r(0) = 0$ , comme cela est dit dans la définition 3.2). Pour tout  $h \in \mathbb{R}$ , on a donc :

$$f \circ g(x+h) = f(g(x+h)) = f(g(x) + g'(x)h + hr(h)). \quad (3.1)$$

On utilise maintenant le fait que  $f$  est différentiable en  $g(x)$ , on a donc pour tout  $k \in \mathbb{R}$ ,

$$f(g(x) + k) = f(g(x)) + f'(g(x))k + ks(k), \quad (3.2)$$

avec  $\lim_{k \rightarrow 0} s(k) = 0$  (et donc  $s$  continue en 0 en posant  $s(0) = 0$ ). Dans (3.2), on prend  $k = g'(x)h + hr(h)$ , on obtient, avec (3.1), pour tout  $h \in \mathbb{R}$  :

$$f \circ g(x+h) = f \circ g(x) + f'(g(x))g'(x)h + f'(g(x))hr(h) + (g'(x)h + hr(h))s(g'(x)h + hr(h)),$$

que l'on peut aussi écrire

$$f \circ g(x+h) = f \circ g(x) + f'(g(x))g'(x)h + hR(h),$$

avec  $R(h) = f'(g(x))r(h) + g'(x)s(g'(x)h + hr(h)) + r(h)s(g'(x)h + hr(h))$ . Par composition de fonctions continues (les fonctions  $s$  et  $r$  sont continues en 0), on a  $\lim_{h \rightarrow 0} s(g'(x)h + hr(h)) = 0$  et donc  $\lim_{h \rightarrow 0} R(h) = 0$ . Ce qui prouve que  $f \circ g$  est différentiable, et donc dérivable, en  $x$  et que sa dérivée est  $f'(g(x))g'(x)$ . ■

**Proposition 3.4 (Fonction réciproque)** Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$  et  $f$  une application de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est strictement croissante et continue. On rappelle (théorème 2.5) que  $f$  est alors une bijection de  $]a, b[$  dans  $] \alpha, \beta[$  (avec  $\alpha = \inf(\text{Im}(f))$  et  $\beta = \sup(\text{Im}(f))$ ). On note  $g$  la fonction réciproque de  $f$ . Soit  $x \in ]a, b[$ . on suppose que  $f$  dérivable en  $x$  et  $f'(x) \neq 0$ . Alors  $g$  est dérivable en  $f(x)$  et  $g'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$ .

DÉMONSTRATION : Le théorème 2.5 donne que  $g$  est continue (sur tout l'intervalle  $] \alpha, \beta[$ ) et donc continue en  $f(x)$  (c'est-à-dire au point  $f(x)$ ). On montre maintenant que  $g$  est dérivable en  $f(x)$ . On pose  $y = f(x)$ , de sorte que  $x = g(y)$ . Soit  $h \neq 0$  t.q.  $y+h \in ] \alpha, \beta[$  (noter que  $y \in ] \alpha, \beta[$ ). On a, comme  $f \circ g(z) = z$  pour tout  $z \in ] \alpha, \beta[$  :

$$\frac{g(y+h) - g(y)}{h} = \frac{g(y+h) - g(y)}{(y+h) - y} = \frac{g(y+h) - g(y)}{f \circ g(y+h) - f \circ g(y)}.$$

Mais  $g(y) = x$  et  $g(y+h) = g(y) + k(h) = x + k(h)$  avec  $\lim_{h \rightarrow 0} k(h) = 0$  car  $g$  est continue en  $y$  (noter d'ailleurs que  $k(h) \neq 0$  car  $h \neq 0$  et  $g$  injective). On a donc :

$$\frac{g(y+h) - g(y)}{h} = \frac{x + k(h) - x}{f(x + k(h)) - f(x)} = \frac{k(h)}{f(x + k(h)) - f(x)}$$

Par composition de limite (proposition 1.8) ou composition de fonctions continues (en posant  $k(0) = 0$ ), on en déduit :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(y+h) - g(y)}{h} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k}{f(x+k) - f(x)} = \frac{1}{f'(x)},$$

ce qui montre bien que  $g$  est dérivable en  $y$  et  $g'(y) = \frac{1}{f'(x)}$ . ■

**Remarque 3.4** Dans la proposition 3.4, si on admet que  $g$  est dérivable en  $f(x)$ , la formule donnant  $g'$  au point  $f(x)$  est facile à retrouver en écrivant que  $g \circ f(y) = y$ , pour tout  $y$ , et en dérivant la fonction composée  $g \circ f$  (proposition 3.3) en  $x$ . En effet, en supposant que  $g$  est dérivable en  $f(x)$ , la proposition 3.3 donne que  $g \circ f$  est dérivable en  $x$  et  $(g \circ f)'(x) = g'(f(x))f'(x)$ . Comme  $g \circ f(y) = y$  pour tout  $y$ , on a aussi  $(g \circ f)'(x) = 1$  et donc, puisque l'on a supposé que  $f'(x) \neq 0$ ,  $g'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$ .

### Exemple 3.1

1. On note  $\ln$  l'application de  $]0, +\infty[$  dans  $\mathbb{R}$  dont la dérivée est l'application  $x \mapsto 1/x$  et qui s'annule en 1 (nous verrons au chapitre 5 que cette application existe, c'est la primitive s'annulant en 1 de l'application  $x \mapsto 1/x$  définie sur  $]0, +\infty[$ ). L'application  $\ln$  est strictement croissante et continue (car dérivable) et son image est égale  $\mathbb{R}$ . La fonction réciproque de la fonction  $\ln$  existe donc et est strictement croissante continue de  $\mathbb{R}$  dans  $]0, +\infty[$  (théorème 2.5). Cette fonction réciproque s'appelle la fonction exponentielle, c'est l'application  $x \mapsto e^x$ . En appliquant la proposition 3.4, avec  $f = \ln$  et  $g$  la fonction réciproque, on obtient pour tout  $x \in ]0, \infty[$ ,  $g'(\ln(x)) = x$  (car  $f'(x) = 1/x \neq 0$ ) et donc, pour tout  $y \in \mathbb{R}$ ,  $g'(y) = g(y)$  (car  $x = g(\ln(x))$ ). On a ainsi montré que la dérivée de la fonction exponentielle est la fonction exponentielle elle-même.

2. On définit ici l'application  $f$  de  $]0, \infty[$  dans  $]0, \infty[$  par  $f(x) = x^4$  si  $x \in ]0, \infty[$ . On montre tout d'abord que  $f$  est dérivable en tout point de  $]0, +\infty[$  et  $f'(x) = 4x^3$  pour tout  $x \in ]0, +\infty[$ . On en déduit que, pour tout  $x > 0$ ,  $g'(x) = \frac{1}{4x^4}$  où  $g$  est la fonction réciproque de  $f$ .

### 3.3 Théorème des Accroissements Finis

Nous commençons par un cas particulier du théorème des Accroissements Finis.

**Théorème 3.1 (Théorème de Rolle)** Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f$  une application de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . on suppose que  $f$  continue sur  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$  (c'est-à-dire dérivable en tout point de  $]a, b[$ ). on suppose aussi que  $f(a) = f(b)$ . Alors, il existe  $c \in ]a, b[$  t.q.  $f'(c) = 0$ .

DÉMONSTRATION : Nous démontrons ce théorème en distinguant 3 cas possibles.

**Premier cas.** On suppose que  $f(x) = f(a)$  pour tout  $x \in [a, b]$ . On prend alors pour  $c$  un point quelconque de  $]a, b[$  (par exemple  $c = \frac{1}{2}(a + b)$ ) et on a bien  $f'(c) = 0$ .

**Deuxième cas.** On suppose qu'il existe  $x \in [a, b]$  t.q.  $f(x) > f(a)$ . Comme  $f$  est continue sur  $[a, b]$ , d'après le théorème 2.3, il existe  $c \in [a, b]$  t.q.  $f(c) = M = \max\{f(x), x \in [a, b]\}$ . Comme  $M > f(a) = f(b)$ , on a donc  $c \in ]a, b[$ . Pour  $h \neq 0$  t.q.  $a \leq c + h \leq b$ , on pose

$$\varphi(h) = \frac{f(c+h) - f(c)}{h}.$$

Pour  $h > 0$ , on a  $f(c+h) \leq M = f(c)$  et donc  $\varphi(h) \leq 0$ . On en déduit que  $f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0, h > 0} \varphi(h) \leq 0$ .

Pour  $h < 0$ , on a  $f(c+h) \leq M = f(c)$  et donc  $\varphi(h) \geq 0$ . On en déduit que  $f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0, h < 0} \varphi(h) \geq 0$ .

Finalement, on a donc nécessairement  $f'(c) = 0$ .

**Troisième cas.** On suppose qu'il existe  $x \in [a, b]$  t.q.  $f(x) < f(a)$ . On raisonne alors de manière semblable au cas précédent. On remarque qu'il existe  $c \in ]a, b[$  t.q.  $f(c) = m = \min\{f(x), x \in [a, b]\}$ . Puis, on montre que  $f'(c) = 0$ . ■

Nous donnons maintenant le théorème des Accroissements Finis.

**Théorème 3.2 (Théorème des Accroissements Finis)** Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f$  une application de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . on suppose que  $f$  continue sur  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$ . Alors, il existe  $c \in ]a, b[$  t.q.  $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$ .

DÉMONSTRATION : On va utiliser le théorème 3.1 pour une fonction bien choisie. Pour  $x \in [a, b]$ , on pose

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

La fonction  $g$  est continue sur  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$ . De plus, on a  $g(b) = g(a) = f(a)$ . Le théorème 3.1 montre donc qu'il existe  $c \in ]a, b[$  t.q.  $g'(c) = 0$ . Comme  $g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ , pour tout  $x \in ]a, b[$ , on a donc  $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ , c'est-à-dire  $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ . ■

Voici maintenant quelques conséquences du théorème des Accroissements Finis.

**Remarque 3.5** Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f$  une application de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . on suppose  $f$  continue sur  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$ . On a alors :

1.  $f(b) - f(a) = \gamma(b - a)$  avec  $\overline{m} \leq \gamma \leq \overline{M}$ ,  $\overline{m} = \inf\{f'(x), x \in ]a, b[ \} \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$  et  $\overline{M} = \sup\{f'(x), x \in ]a, b[ \} \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ . (C'est équivalent à la conclusion du théorème des Accroissements Finis sauf que le théorème des Accroissements Finis donne des inégalités strictes sur  $\gamma$  lorsque les bornes  $\overline{m}$  et  $\overline{M}$  ne sont pas atteintes. Cette équivalence est due au fait que  $f'$  vérifie la propriété des valeurs intermédiaires.)
2. On suppose de plus qu'il existe  $M \in \mathbb{R}$  t.q.  $|f'(x)| \leq M$  pour tout  $x \in ]a, b[$ . Alors  $|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$ . (C'est cette forme du théorème des Accroissements Finis qui pourra être généralisée au cas d'une application de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^p$ , voir le théorème 7.1. La forme donnée dans le théorème 3.2 n'étant plus vraie si  $p > 1$ .)
3. On suppose de plus que  $f'(x) \geq 0$  pour tout  $x \in ]a, b[$ . Alors  $f$  est croissante.
4. On suppose de plus que  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in ]a, b[$ . Alors  $f$  est strictement croissante.
5. On suppose de plus que  $f'(x) = 0$  pour tout  $x \in ]a, b[$ . Alors  $f$  est constante.

On suppose maintenant que  $f$  et  $g$  sont continues sur  $[a, b]$  et dérivables sur  $]a, b[$  et que  $f'(x) = g'(x)$  pour tout  $x \in ]a, b[$ . Alors  $f - g$  est constante.

### 3.4 Fonctions de classe $C^n$

**Définition 3.4** Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$  et  $f$  une application de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$ .

1.  $f$  est dérivable sur  $]a, b[$  si  $f$  est dérivable en tout point de  $]a, b[$ .
2.  $f$  est de classe  $C^0$  (on écrit  $f \in C^0(]a, b[)$  ou  $f \in C(]a, b[)$ ) si  $f$  est continue sur  $]a, b[$ .
3.  $n \geq 1$ .  $f$  est de classe  $C^n$  sur  $]a, b[$  (on écrit  $f \in C^n(]a, b[)$ ) si  $f$  est dérivable sur  $]a, b[$  et  $f'$  est de classe  $C^{n-1}$ .
4.  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $]a, b[$  si, pour tout  $n \geq 0$ ,  $f$  est de classe  $C^n$  sur  $]a, b[$ .

Notation :  $f^{(0)} = f$  et, pour  $n \geq 1$ ,  $f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$ .

**Exemple 3.2** Exemples de fonctions de classe  $C^\infty$ .

1.  $a = -\infty, b = \infty$ .  $f(x) = e^x$  pour  $x \in \mathbb{R}$ .  $f$  est de classe  $C^\infty$  et  $f^{(n)} = f$  pour tout  $n \geq 0$ .
2.  $a = 0, b = \infty$ . Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ .  $g(x) = x^\alpha = e^{\alpha \ln(x)}$  pour  $x \in ]a, b[$ .  $g$  est de classe  $C^\infty$ ,  $g'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$ , pour tout  $x \in ]a, b[$ , et, par récurrence sur  $n$ ,  $g^{(n)}(x) = \alpha(\alpha - 1) \dots (\alpha - n + 1)x^{\alpha-n}$  pour tout  $x \in ]a, b[$  et pour tout  $n \geq 2$ .
3.  $a = 0, b = \infty$ .  $h(x) = \ln(x)$  pour  $x \in ]a, b[$ .  $h$  est de classe  $C^\infty$  et  $h'(x) = x^{-1}$  pour tout  $x \in ]a, b[$  (pour calculer les dérivées suivantes de  $h$ , on utilise alors le deuxième item). (On rappelle que la fonction  $\ln$  est définie, sur  $\mathbb{R}_+^*$ , comme étant la primitive de  $x \mapsto 1/x$  s'annulant en 1. L'existence de cette primitive est montrée au chapitre 5.)

## 3.5 Exercices

### Exercice 3.1 (Opérations sur les dérivées)

Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$ ,  $x \in ]a, b[$  et  $f, g$  deux applications de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  et  $g$  sont dérivables en  $x$ .

1. Montrer que  $(f + g)$  est dérivable en  $x$  et  $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$ .
2. Montrer que  $fg$  est dérivable en  $x$  et  $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ .
3. On suppose que  $g(y) \neq 0$  pour tout  $y \in ]a, b[$ . Montrer que  $f/g$  est dérivable en  $x$  et que :

$$(f/g)'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}.$$

### Exercice 3.2 (Dérivée en un point)

Soit  $f$  une application continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est dérivable pour tout  $x \neq 0$  et que  $f'$  (définie sur  $\mathbb{R}^*$ ) admet une limite en 0, notée  $l$ . Montrer que  $f$  est dérivable en 0 et que  $f'(0) = l$ . [On pourra utiliser le théorème des accroissements finis.]

### Exercice 3.3 (Dérivabilité de $x \mapsto |x|^a$ )

Etudier, selon les valeurs du paramètre  $a > 0$ , la continuité et la dérivabilité de l'application  $f$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  définie par  $f(x) = |x|^a$  pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$  et  $f(0) = 0$ .

### Exercice 3.4 (Dérivée non continue)

On définit  $f$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  par :

$$\begin{aligned} f(x) &= 0, \text{ si } x \leq 0, \\ f(x) &= x^2 \sin \frac{1}{x}, \text{ si } x > 0. \end{aligned}$$

Montrer que  $f$  est dérivable en tout point de  $\mathbb{R}$  et calculer  $f'(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . La dérivée de  $f$  est-elle continue ?

### Exercice 3.5 (Dérivée et propriété des valeurs intermédiaires)

Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$  et  $f$  une application de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est dérivable pour tout  $x \in ]a, b[$ . On va montrer, dans cet exercice, que  $f'$  (définie sur  $]a, b[$ ) vérifie la propriété des valeurs intermédiaires.

Soit  $c, d \in ]a, b[$ ,  $c < d$ , et  $\gamma$  appartenant à l'intervalle ouvert dont les bornes sont  $f'(c)$  et  $f'(d)$ .

1. Montrer qu'il existe  $\eta \in ]0, d - c[$  t.q.  $\gamma$  appartienne à l'intervalle ouvert dont les bornes sont  $\frac{f(c+\eta) - f(c)}{\eta}$  et  $\frac{f(d-\eta) - f(d)}{-\eta}$ .
2. On définit  $g$  de  $[c, d - \eta]$  dans  $\mathbb{R}$  (avec  $\eta$  donné par la question précédente) par :

$$g(x) = \frac{f(x + \eta) - f(x)}{\eta}, \text{ pour } x \in [c, d - \eta].$$

Montrer que  $g$  est continue sur l'intervalle  $[c, d - \eta]$  et en déduire qu'il existe  $y \in [c, d - \eta]$  t.q.  $g(y) = \gamma$ .

3. Montrer qu'il existe  $z \in [c, d]$  t.q.  $f'(z) = \gamma$ .

**Exercice 3.6 (Propriété des valeurs intermédiaires n'implique pas continuité)**

En utilisant les deux exercices précédents, donner un exemple d'application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  vérifiant la propriété des valeurs intermédiaires et non continue.

**Exercice 3.7 (Accroissements finis "généralisés")**

Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ . Soit  $f$  et  $g$  deux applications continues de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  et  $g$  sont dérivables pour tout  $x \in ]a, b[$  et que  $g'(x) \neq 0$  pour tout  $x \in ]a, b[$ .

1. Montrer que  $g(x) - g(a) \neq 0$  pour tout  $x \in ]a, b[$ .
2. Montrer qu'il existe  $c \in ]a, b[$  t.q. :

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

[On pourra considérer la fonction  $u$  définie sur  $[a, b]$  par  $u(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}g(x)$ .]

**Exercice 3.8**

Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ . Soit  $f$  une application continue de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est deux fois dérivable pour tout  $x \in ]a, b[$  (c'est-à-dire que  $f$  est dérivable pour tout  $x \in ]a, b[$  et que  $f'$ , qui est donc définie sur  $]a, b[$ , est aussi dérivable pour tout  $x \in ]a, b[$ ). Soit  $x_0 \in ]a, b[$ .

1. Montrer qu'il existe  $A \in \mathbb{R}$  t.q. :

$$f(x_0) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x_0 - a) + \frac{(x_0 - a)(x_0 - b)}{2}A.$$

2. On définit  $\varphi$  sur  $[a, b]$  par :

$$\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) - \frac{(x - a)(x - b)}{2}A.$$

Montrer qu'il existe  $c \in ]a, x_0[$  et  $d \in ]x_0, b[$  t.q.  $\varphi'(c) = \varphi'(d) = 0$ .

3. Montrer qu'il existe  $\theta \in ]a, b[$  t.q. :

$$f(x_0) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x_0 - a) + \frac{(x_0 - a)(x_0 - b)}{2}f''(\theta).$$

**Exercice 3.9**

Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $f(x) = x + e^x$ . Montrer que  $f$  est strictement croissante, continue et bijective de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On note  $g$  l'application réciproque de  $f$ . Montrer que  $g$  est deux fois dérivable sur  $\mathbb{R}$ . Calculer  $g'(1)$  et  $g''(1)$ .

**Exercice 3.10 (Limite à l'infini)**

Soit  $f$  une fonction dérivable de  $]0, \infty[$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$ . Montrer que  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ .

**Exercice 3.11 (Dérivabilité en un point)**

Soit  $f$  une application continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ .

1. On suppose que  $f$  est dérivable en tout point  $x$  différent de  $a$  et que  $f'$  (définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ ) admet une limite en  $a$ , notée  $a_1$ . Montrer que  $f$  est dérivable en  $a$  et que  $f'(a) = a_1$ . [Cette question a été faite dans un exercice précédent avec  $a = 0$ .]
2. On suppose que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{a\}$  et que, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $f^{(n)}$  (définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ ) admet une limite en  $a$ , notée  $a_n$ . Montrer que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ . [On pourra raisonner par récurrence sur  $n$ .]

**Exercice 3.12 (Fonctions höldériennes)**

Soit  $f$  une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ ,  $\beta \in \mathbb{R}$ ,  $\beta > 0$  et  $k \in \mathbb{R}$ ,  $k > 0$ . On suppose que, pour tout  $x, y \in \mathbb{R}$ ,  $|f(y) - f(x)| \leq k|y - x|^\beta$ .

1. Montrer que  $f$  est continue en tout point de  $\mathbb{R}$ .
2. On suppose, dans cette question, que  $\beta > 1$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$ , montrer que  $f'(x) = 0$ . En déduire que  $f$  est constante.
3. (Exemple) Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $g(x) = |x|^{\frac{1}{2}}$ . Montrer que, pour tout  $x, y \in \mathbb{R}$ , on a  $|g(y) - g(x)| \leq |y - x|^{\frac{1}{2}}$ . [On pourra montrer qu'on peut supposer  $|y| \geq |x|$ , et distinguer les cas où  $x$  et  $y$  sont de même signe et où  $x$  et  $y$  sont de signe contraire.]

**Exercice 3.13 (Exercice de rédaction...)**

Soit  $\varphi$  une application de  $]0, \infty[$  dans  $\mathbb{R}$ , dérivable (en tout point de  $]0, \infty[$ ) et t.q.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \varphi(x) = 0$ .

1. On suppose que  $\varphi'(x) \leq 0$  pour tout  $x > 0$ . Montrer que  $\varphi(x) \geq 0$  pour tout  $x > 0$ .
2. On suppose que  $\varphi'(x) < 0$  pour tout  $x > 0$ . Montrer que  $\varphi(x) > 0$  pour tout  $x > 0$ .

**Exercice 3.14 (Etude d'une fonction)**

Soit  $a > 0$ . On définit  $f$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  de la manière suivante :

$$f(x) = \left(1 + \frac{a}{|x|}\right)^x, \text{ si } x \neq 0, \\ f(0) = 1.$$

(On rappelle que  $b^x = e^{x \ln b}$ , pour  $b > 0$  et  $x \in \mathbb{R}$ .)

1. (Continuité de  $f$ )
  - (a) Montrer que  $e^z \geq 1 + \frac{z^2}{2}$  pour tout  $z \in \mathbb{R}_+$ .  
En déduire que  $\ln(1 + y) \leq \sqrt{2y}$ , pour tout  $y \in \mathbb{R}_+$ .
  - (b) En utilisant la question précédente, montrer que  $1 \leq f(x) \leq e^{\sqrt{2ax}}$ , pour tout  $x \in ]0, \infty[$ .
  - (c) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} f(x) = 1$ .
  - (d) Montrer que  $f$  est continue en 0. [On pourra remarquer que  $f(x)f(-x) = 1$ , pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .]
2. (Dérivabilité de  $f$  sur  $\mathbb{R}^*$ ) Montrer que  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^*$  et que  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \neq 0$ . [Pour  $x > 0$ , on pourra mettre  $f'(x)$  sous la forme  $f(x)\varphi(x)$  et utiliser l'exercice 3.13.] Montrer que  $f$  est strictement croissante.

- (Dérivabilité en 0 ?) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = +\infty$ . L'application  $f$  est-elle dérivable en 0 ? (Justifier la réponse...)
- (Limites en  $\pm\infty$ ) Donner (en fonction de  $a$ ) les limites en  $+\infty$  et  $-\infty$  de  $f$ .  
Dans la suite, on note  $l$  et  $m$  ces limites.
- (Fonction réciproque) Montrer que  $f$  est une bijection de  $\mathbb{R}$  dans  $]m, l[$ . On note  $g$  la fonction réciproque de  $f$  (de sorte que  $g$  est une application de  $]m, l[$  dans  $\mathbb{R}$ ). Montrer que  $g$  est dérivable en 1 (noter que  $1 \in ]m, l[$ ) et calculer  $g'(1)$ . [Pour  $h \neq 0$ , on pourra appliquer le théorème des Accroissements Finis à la fonction  $f$  entre les points  $g(1+h)$  et  $g(1)$ .]
- (Régularité de la fonction réciproque) Montrer que la fonction réciproque de  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $]m, l[$  mais que  $f$  n'est pas de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

### 3.6 Exercices corrigés

#### Exercice 3.15 (Corrigé de l'exercice 3.8)

Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ . Soit  $f$  une application continue de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est deux fois dérivable pour tout  $x \in ]a, b[$  (c'est-à-dire que  $f$  est dérivable pour tout  $x \in ]a, b[$  et que  $f'$ , qui est donc définie sur  $]a, b[$ , est aussi dérivable pour tout  $x \in ]a, b[$ ). Soit  $x_0 \in ]a, b[$ .

- Montrer qu'il existe  $A \in \mathbb{R}$  t.q. :

$$f(x_0) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x_0 - a) + \frac{(x_0 - a)(x_0 - b)}{2}A.$$

---

**corrigé**

---

Il suffit de définir de définir  $A$  par la formule suivante :

$$A = \frac{2}{(x_0 - a)(x_0 - b)} \left( f(x_0) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x_0 - a) \right).$$

On obtient bien

$$f(x_0) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x_0 - a) + \frac{(x_0 - a)(x_0 - b)}{2}A. \quad (3.3)$$


---

- On définit  $\varphi$  sur  $[a, b]$  par :

$$\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) - \frac{(x - a)(x - b)}{2}A.$$

Montrer qu'il existe  $c \in ]a, x_0[$  et  $d \in ]x_0, b[$  t.q.  $\varphi'(c) = \varphi'(d) = 0$ .

---

**corrigé**

---

La fonction  $\varphi$  est continue sur l'intervalle  $[a, x_0]$  et dérivable sur l'intervalle  $]a, x_0[$ , on peut donc utiliser le théorème des accroissements finis (théorème 3.2). Il donne l'existence de  $c \in ]a, x_0[$  t.q.  $\varphi(x_0) - \varphi(a) = \varphi'(c)(x_0 - a)$ . Comme  $\varphi(a) = 0$  et  $\varphi(x_0) = 0$  (par le choix de  $A$ ), on a donc  $\varphi'(c) = 0$ .

De même, la fonction  $\varphi$  est continue sur l'intervalle  $[x_0, b]$  et dérivable sur l'intervalle  $]x_0, b[$ , on peut donc utiliser le théorème des accroissements finis. Il donne l'existence de  $d \in ]x_0, b[$  t.q.  $\varphi(x_0) - \varphi(b) = \varphi'(d)(x_0 - b)$ . Comme  $\varphi(b) = \varphi(x_0) = 0$ , on a donc  $\varphi'(d) = 0$ .

3. Montrer qu'il existe  $\theta \in ]a, b[$  t.q. :

$$f(x_0) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x_0 - a) + \frac{(x_0 - a)(x_0 - b)}{2} f''(\theta).$$

**corrigé**

La fonction  $\varphi'$  est continue sur l'intervalle  $[c, d]$  et dérivable sur l'intervalle  $]c, d[$  (car  $c, d \in ]a, b[$  et que  $f'$  est dérivable sur  $]a, b[$ ), on peut donc utiliser le théorème des accroissements finis. Il donne l'existence de  $\theta \in ]c, d[$  t.q.  $\varphi''(\theta) = 0$ . Or, pour tout  $x \in ]a, b[$ , on a  $\varphi''(x) = f''(x) - A$ . On a donc  $A = \varphi''(\theta)$ . En reportant cette valeur de  $A$  dans (3.3) on obtient bien  $f(x_0) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x_0 - a) + \frac{(x_0 - a)(x_0 - b)}{2} f''(\theta)$ .

N.B. Pour les questions 2 et 3, on peut aussi utiliser la version "réduite" du théorème 3.2, c'est-à-dire le théorème de Rolle (théorème 3.1).

### Exercice 3.16 (Corrigé de l'exercice 3.11)

Soit  $f$  une application continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ .

- On suppose que  $f$  est dérivable en tout point  $x$  différent de  $a$  et que  $f'$  (définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ ) admet une limite en  $a$ , notée  $a_1$ . Montrer que  $f$  est dérivable en  $a$  et que  $f'(a) = a_1$ . [Cette question a été faite dans un exercice précédent avec  $a = 0$ .]

**corrigé**

On veut montrer que  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = a_1$ , c'est-à-dire que pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q. :

$$h \neq 0, |h| \leq \alpha \Rightarrow \left| \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - a_1 \right| \leq \varepsilon. \quad (3.4)$$

Soit  $\varepsilon > 0$ . On cherche donc  $\alpha$  vérifiant (3.4). Comme  $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = a_1$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q. :

$$y \neq a, |y - a| \leq \alpha \Rightarrow |f'(y) - a_1| \leq \varepsilon. \quad (3.5)$$

Soit maintenant  $h \neq 0$  t.q.  $|h| \leq \alpha$ . En appliquant le théorème des accroissements finis (théorème 3.2) à la fonction  $f$  (qui est continue sur l'intervalle fermé dont les bornes sont  $a$  et  $a+h$  et dérivable sur l'intervalle ouvert dont les bornes sont  $a$  et  $a+h$ ) il existe  $y$  strictement compris entre  $a$  et  $a+h$  t.q.  $f(a+h) - f(a) = hf'(y)$ . Comme  $|y - a| \leq |h| \leq \alpha$ , on peut utiliser (3.4) et on obtient :

$$\left| \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - a_1 \right| = |f'(y) - a_1| \leq \varepsilon.$$

Pour tout  $\varepsilon > 0$ , on a donc bien trouvé  $\alpha > 0$  vérifiant 3.5. Ceci prouve que  $f$  est dérivable en  $a$  et que  $f'(a) = a_1$ . Comme  $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = a_1$ , on a donc aussi montré que  $f'$  est continue en  $a$ .

2. On suppose que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{a\}$  et que, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $f^{(n)}$  (définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ ) admet une limite en  $a$ , notée  $a_n$ . Montrer que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ . [On pourra raisonner par récurrence sur  $n$ .]

————— corrigé —————

On va montrer, par récurrence sur  $n$ , que  $f$  est de classe  $C^n$  sur  $\mathbb{R}$ , pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Initialisation.** Pour  $n = 0$ , on a bien  $f$  de classe  $C^0$  (car  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ ).

**Hérédité.** Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On suppose que  $f$  est de classe  $C^n$ , en on va montrer que  $f$  est de classe  $C^{n+1}$ . On pose  $g = f^{(n)}$ . La fonction  $g$  est donc continue sur  $\mathbb{R}$ . Les hypothèses de la question donne aussi que  $g$  est dérivable sur  $\mathbb{R} \setminus \{a\}$  et que  $\lim_{x \rightarrow a} g'(x) = a_{n+1}$  (car  $g' = f^{(n+1)}$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ ). On peut donc appliquer la question 1 à la fonction  $g$ . Elle donne que  $g$  est dérivable en  $a$  et que  $g'$  est continue en  $a$ . Comme  $g = f^{(n)}$ , on a donc  $f^{(n)}$  dérivable en  $a$  et  $f^{(n+1)}$  continue en  $a$ . Les hypothèses de la question donnant aussi que  $f^{(n)}$  est dérivable sur  $\mathbb{R} \setminus \{a\}$  et que  $f^{(n+1)}$  est continue sur  $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ , on obtient finalement que  $f$  est de classe  $C^{n+1}$ .

On a bien ainsi montré, par récurrence sur  $n$ , que  $f$  est de classe  $C^n$  sur  $\mathbb{R}$ , pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Ceci signifie que  $f$  est de classe  $C^\infty$ .

**Exercice 3.17 (Corrigé de l'exercice 3.12)**

Soit  $f$  une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ ,  $\beta \in \mathbb{R}$ ,  $\beta > 0$  et  $k \in \mathbb{R}$ ,  $k > 0$ . On suppose que, pour tout  $x, y \in \mathbb{R}$ ,  $|f(y) - f(x)| \leq k|y - x|^\beta$ .

1. Montrer que  $f$  est continue en tout point de  $\mathbb{R}$ .

————— corrigé —————

On va même montrer que  $f$  est uniformément continue. Soit  $\varepsilon > 0$ . On pose  $\alpha = (\frac{\varepsilon}{k})^{\frac{1}{\beta}}$ , de sorte que  $\alpha > 0$  et :

$$x, y \in \mathbb{R}, |x - y| \leq \alpha \Rightarrow |f(y) - f(x)| \leq k|y - x|^\beta \leq k\alpha^\beta = \varepsilon.$$

Ceci montre bien que  $f$  est uniformément continue sur  $\mathbb{R}$ .

2. On suppose, dans cette question, que  $\beta > 1$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$ , montrer que  $f'(x) = 0$ . En déduire que  $f$  est constante.

————— corrigé —————

Pour  $h \neq 0$ , on a, en utilisant l'hypothèse sur  $f$  avec  $y = x + h$ ,  $|f(x + h) - f(x)| \leq k|h|^\beta$ . On en déduit :

$$0 \leq \left| \frac{f(x + h) - f(x)}{h} \right| \leq k|h|^{\beta-1}.$$

Comme  $\beta > 1$ , on a  $\lim_{h \rightarrow 0} k|h|^{\beta-1} = 0$  et donc  $\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \right| = 0$  (on raisonne ici avec un  $x$  fixé). Ceci prouve que  $f'(x) = 0$ .

On a donc montré que  $f'(x) = 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . En utilisant le théorème des accroissements finis, ceci implique que  $f$  est constante (voir la remarque 3.5). On rappelle ici cette démonstration. Soit  $x \in \mathbb{R}^*$ . Le théorème des accroissements finis (théorème 3.2) donne l'existence de  $y$  entre 0 et  $x$  t.q.  $f(x) - f(0) = x f'(y)$ . comme  $f'(y) = 0$ , on a donc  $f(x) = f(0)$ . La fonction  $f$  est donc constante.

3. (Exemple) Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $g(x) = |x|^{\frac{1}{2}}$ . Montrer que, pour tout  $x, y \in \mathbb{R}$ , on a  $|g(y) - g(x)| \leq |y - x|^{\frac{1}{2}}$ . [On pourra montrer qu'on peut supposer  $|y| \geq |x|$ , et distinguer les cas où  $x$  et  $y$  sont de même signe et où  $x$  et  $y$  sont de signe contraire.]

—————  
corrigé  
—————

Soit  $x, y \in \mathbb{R}$ . En changeant éventuellement  $x$  en  $y$  et  $y$  en  $x$  (ce qui ne change pas  $|g(y) - g(x)|$  et  $|y - x|$ ), on peut supposer  $|y| \geq |x|$ . En changeant éventuellement  $y$  en  $-y$  et  $x$  en  $-x$  (ce qui ne change toujours pas  $|g(y) - g(x)|$  et  $|y - x|$ ), on peut également supposer  $y \geq 0$ . On distingue maintenant 2 cas selon le signe de  $x$ .

**Cas 1.** On suppose ici  $x \geq 0$ . On a alors  $|g(y) - g(x)| = \sqrt{y} - \sqrt{x}$  et  $|y - x| = y - x$ . On remarque alors que  $(\sqrt{y} - \sqrt{x})^2 = y + x - 2\sqrt{y}\sqrt{x} \leq y + x - 2\sqrt{x}\sqrt{x}$  (car  $\sqrt{y} \geq \sqrt{x}$ ) et donc  $(\sqrt{y} - \sqrt{x})^2 \leq y + x - 2x = y - x$ , ce qui donne bien :

$$|g(y) - g(x)| = \sqrt{y} - \sqrt{x} \leq \sqrt{y - x} = |y - x|^{\frac{1}{2}}.$$

**Cas 2.** On suppose ici  $x < 0$ . Comme  $g(y) \geq g(x) \geq 0$ , on a  $|g(y) - g(x)| = g(y) - g(x) \leq g(y)$ . En utilisant le premier cas précédent avec le couple  $(0, y)$ , on a :

$$g(y) = |g(y) - g(0)| \leq y^{\frac{1}{2}}.$$

Comme  $0 \leq y \leq y - x$ , on a  $y^{\frac{1}{2}} \leq |y - x|^{\frac{1}{2}}$  et donc :

$$|g(y) - g(x)| \leq g(y) \leq y^{\frac{1}{2}} \leq |y - x|^{\frac{1}{2}}.$$

---

### Exercice 3.18 (Corrigé de l'exercice 3.13)

Soit  $\varphi$  une application de  $]0, \infty[$  dans  $\mathbb{R}$ , dérivable (en tout point de  $]0, \infty[$ ) et t.q.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \varphi(x) = 0$ .

1. On suppose que  $\varphi'(x) \leq 0$  pour tout  $x > 0$ . Montrer que  $\varphi(x) \geq 0$  pour tout  $x > 0$ .

—————  
corrigé  
—————

Soit  $x > 0$ . On veut montrer que  $\varphi(x) \geq 0$ .

Soit  $y > x$ . La fonction  $f$  est continue sur  $[x, y]$  et dérivable sur  $]x, y[$ . Le théorème des accroissements finis donne donc l'existence de  $z \in ]x, y[$  t.q.  $\varphi(y) - \varphi(x) = (y - x)\varphi'(z)$ . Comme  $\varphi'(z) \leq 0$  et  $y > x$ , on a donc  $\varphi(x) \geq \varphi(y)$ . On peut maintenant passer à la limite dans cette inégalité quand  $y$  tend vers  $+\infty$  (avec  $x$  fixé) et on obtient :

$$\varphi(x) \geq \lim_{y \rightarrow \infty} \varphi(y) = 0.$$

2. On suppose que  $\varphi'(x) < 0$  pour tout  $x > 0$ . Montrer que  $\varphi(x) > 0$  pour tout  $x > 0$ .

—————  
corrigé  
—————

Soit  $x > 0$ . En appliquant encore une fois le théorème des accroissements finis, il existe  $z \in ]x, x + 1[$  t.q.  $\varphi(x + 1) - \varphi(x) = \varphi'(z)$ . Comme  $\varphi'(z) < 0$  n a donc  $\varphi(x) > \varphi(x + 1)$ . Or, on sait, par la question 1, que  $\varphi(x + 1) \geq 0$ . On a donc  $\varphi(x) > 0$ .

**Exercice 3.19 (Corrigé de l'exercice 3.14)**

Soit  $a > 0$ . On définit  $f$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  de la manière suivante :

$$f(x) = (1 + \frac{a}{|x|})^x, \text{ si } x \neq 0, \\ f(0) = 1.$$

(On rappelle que  $b^x = e^{x \ln b}$ , pour  $b > 0$  et  $x \in \mathbb{R}$ .)

1. (Continuité de  $f$ )

(a) Montrer que  $e^z \geq 1 + \frac{z^2}{2}$  pour tout  $z \in \mathbb{R}_+$ .

En déduire que  $\ln(1+y) \leq \sqrt{2y}$ , pour tout  $y \in \mathbb{R}_+$ .

-----  
**corrigé**

On pose, pour  $z \in \mathbb{R}$ ,  $g(z) = e^z - 1 - \frac{z^2}{2}$ . La fonction  $g$  est de classe  $C^\infty$  et on a  $g'(z) = e^z - z$ ,  $g''(z) = e^z - 1$  pour tout  $z \in \mathbb{R}$ . Comme  $g''(z) \geq 0$  pour tout  $z \in \mathbb{R}_+$ , la fonction  $g'$  est croissante sur  $\mathbb{R}_+$  (d'après le troisième item de la remarque 3.5). On a donc  $g'(z) \geq g'(0) = 1 \geq 0$  pour tout  $z \in \mathbb{R}_+$ . La fonction  $g$  est donc croissante sur  $\mathbb{R}_+$  (toujours par le troisième item de la remarque 3.5), ce qui donne  $g(z) \geq g(0) = 0$  pour tout  $z \in \mathbb{R}_+$ . Ce qui donne bien :

$$e^z \geq 1 + \frac{z^2}{2} \text{ pour tout } z \in \mathbb{R}_+.$$

Soit  $y \in \mathbb{R}_+$ . On applique l'inégalité précédente avec  $z = \sqrt{2y} \in \mathbb{R}_+$ , on obtient que  $e^{\sqrt{2y}} \geq 1 + y$ . Comme la fonction  $\ln$  est croissante sur  $\mathbb{R}_+^*$ , on obtient :

$$\sqrt{2y} \geq \ln(1+y).$$

-----  
(b) En utilisant la question précédente, montrer que  $1 \leq f(x) \leq e^{\sqrt{2ax}}$ , pour tout  $x \in ]0, \infty[$ .

-----  
**corrigé**

Soit  $x > 0$ . Comme  $f(x) = e^{x \ln(1 + \frac{a}{x})}$ , on a  $f(x) \geq 1$  (car  $x \ln(1 + \frac{a}{x}) > 0$ ) et, en utilisant la question précédente avec  $y = \frac{a}{x}$ ,  $f(x) \leq e^{x \sqrt{2 \frac{a}{x}}} = e^{\sqrt{2ax}}$ .

-----  
(c) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} f(x) = 1$ .

-----  
**corrigé**

En passant à limite, quand  $x \rightarrow 0$  avec  $x > 0$ , dans l'inégalité  $1 \leq f(x) \leq e^{\sqrt{2ax}}$ , on obtient que  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} f(x) = 1$ .

-----  
(d) Montrer que  $f$  est continue en 0. [On pourra remarquer que  $f(x)f(-x) = 1$ , pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .]

-----  
**corrigé**

Comme  $f(x) = \frac{1}{f(-x)}$  pour tout  $x < 0$ , on a (avec la question précédente) :

$$\lim_{x \rightarrow 0, x < 0} f(x) = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} f(x)} = 1.$$

On a donc  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ , et, comme  $f(0) = 1$ , on en déduit que  $f$  est continue en 0.

2. (Dérivabilité de  $f$  sur  $\mathbb{R}^*$ ) Montrer que  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^*$  et que  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \neq 0$ . [Pour  $x > 0$ , on pourra mettre  $f'(x)$  sous la forme  $f(x)\varphi(x)$  et utiliser l'exercice 3.13.] Montrer que  $f$  est strictement croissante.

————— corrigé —————

Pour  $x \in \mathbb{R}_+^*$ , on a  $f(x) = e^{x \ln(1 + \frac{a}{x})}$ . On en déduit que  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  comme composée de fonctions de classe  $C^1$  (on a même  $f$  de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ ).

De même, pour  $x \in \mathbb{R}_-^*$ , on a  $f(x) = e^{x \ln(1 - \frac{a}{x})}$ . On en déduit que  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}_-^*$  comme composée de fonctions de classe  $C^1$ . La fonction  $f$  est donc de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^*$ .

Pour  $x > 0$ , on a  $f'(x) = f(x)\varphi(x)$  avec :

$$\varphi(x) = \ln\left(1 + \frac{a}{x}\right) - \frac{a}{a+x}.$$

En tout point de  $\mathbb{R}_+^*$ ,  $\varphi$  est dérivable et on a, pour  $x \in \mathbb{R}_+^*$  :

$$\varphi'(x) = -\frac{a}{x(a+x)} + \frac{a}{(a+x)^2} = -\frac{a^2}{x(a+x)^2} < 0.$$

De plus, on a  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 0$ . Avec l'exercice 3.13, on en déduit que  $\varphi(x) > 0$  pour tout  $x > 0$ . Comme  $f'(x) = f(x)\varphi(x)$  et que  $f(x) > 0$ , on a donc aussi  $f'(x) > 0$  pour tout  $x > 0$ . En utilisant le quatrième item de la remarque 3.5, on en déduit que  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}_+$ .

Pour  $x \in \mathbb{R}_-^*$  on a  $f(x) = \frac{1}{f(-x)}$ . On a donc  $f$  dérivable sur  $\mathbb{R}_-^*$  et  $f'(x) = \frac{f'(-x)}{f(-x)^2}$  (pour tout  $x < 0$ ). On a donc aussi  $f'(x) > 0$  pour tout  $x < 0$ , ce qui donne que  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}_-$ . Finalement, on a bien montré que  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

3. (Dérivabilité en 0 ?) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = +\infty$ . L'application  $f$  est-elle dérivable en 0 ? (Justifier la réponse...)

————— corrigé —————

En reprenant la fonction  $\varphi$  introduite à la question précédente, on a  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} \varphi(x) = +\infty$ . Comme  $f'(x) = f(x)\varphi(x)$  pour tout  $x > 0$  et que  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ , on en déduit :

$$\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} f'(x) = +\infty.$$

Comme  $f'(x) = \frac{f'(-x)}{f(-x)^2}$  pour tout  $x < 0$ , on a aussi  $\lim_{x \rightarrow 0, x < 0} f'(x) = +\infty$ . On a donc  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = +\infty$ .

On va montrer maintenant que  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = +\infty$  (ce qui prouve bien que  $f$  n'est pas dérivable en 0).

Soit  $M \in \mathbb{R}$ . Comme  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = +\infty$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q. :

$$x \neq 0, |x| \leq \alpha \Rightarrow f'(x) \geq M.$$

Soit  $h \neq 0$ ,  $|h| \leq \alpha$ . En appliquant le théorème des accroissements finis (théorème 3.2) à la fonction  $f$  sur l'intervalle dont les bornes sont 0 et  $h$ , il existe  $x$  strictement entre 0 et  $h$  t.q.  $f(h) - f(0) = hf'(x)$ . Comme  $x \neq 0$  et  $|x| < |h| \leq \alpha$ , on a  $f'(x) \geq M$  et donc :

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = f'(x) \geq M.$$

On a donc :

$$h \neq 0, |h| \leq \alpha \Rightarrow \frac{f(h) - f(0)}{h} \geq M.$$

Ceci prouve que  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = +\infty$  et donc que  $f$  n'est pas dérivable en 0.

4. (Limites en  $\pm\infty$ ) Donner (en fonction de  $a$ ) les limites en  $+\infty$  et  $-\infty$  de  $f$ .

**corrigé**

Pour  $y \in ]-\frac{1}{a}, +\infty[$ , on pose  $\psi(y) = \ln(1 + ay)$ . La fonction  $\psi$  est dérivable et  $\psi'(y) = \frac{a}{1+ay}$ . On a donc, en particulier :

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + ay)}{y} = \psi'(0) = a.$$

On a donc (en posant  $y = \frac{1}{x}$ )  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(1 + \frac{a}{x}) = a$ . On en déduit que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e^a$ .

Comme  $f(x) = \frac{1}{f(-x)}$ , on a  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)} = e^{-a}$ .

Dans la suite, on note  $l$  et  $m$  ces limites.

**corrigé**

On a donc  $l = e^a$  et  $m = e^{-a}$

5. (Fonction réciproque) Montrer que  $f$  est une bijection de  $\mathbb{R}$  dans  $]m, l[$ . On note  $g$  la fonction réciproque de  $f$  (de sorte que  $g$  est une application de  $]m, l[$  dans  $\mathbb{R}$ ). Montrer que  $g$  est dérivable en 1 (noter que  $1 \in ]m, l[$ ) et calculer  $g'(1)$ . [Pour  $h \neq 0$ , on pourra appliquer le théorème des Accroissements Finis à la fonction  $f$  entre les points  $g(1+h)$  et  $g(1)$ .]

**corrigé**

La fonction  $f$  est continue strictement croissante de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . Ses limites en  $+\infty$  et  $-\infty$  sont  $l$  et  $m$ . Le théorème 2.5 donne alors que  $f$  est une bijection de  $\mathbb{R}$  dans  $]m, l[$  et que sa fonction réciproque, notée  $g$ , est continue strictement croissante de  $]m, l[$  dans  $\mathbb{R}$ .

On va montrer maintenant que  $g$  est dérivable en 1 et que  $g'(1) = 0$ , c'est-à-dire que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(1+h) - g(1)}{h} = 0.$$

L'idée principale est de remarquer que, pour  $h \neq 0$  (et t.q.  $1+h \in ]m, l[$ ), on a :

$$\frac{g(1+h) - g(1)}{h} = \frac{\tau}{f(\tau) - f(0)},$$

avec  $\tau = g(1+h) - g(1) = g(1+h)$  (car  $g(1) = 0$  puisque  $f(0) = 1$ ) et donc  $f(\tau) = 1+h = f(0)+h$ . (Noter aussi que  $\tau \neq 0$  car  $g$  est injective).

Comme  $g$  est continue, on a  $\lim_{h \rightarrow 0} g(1+h) - g(1) = 0$ . Pour montrer que  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(1+h) - g(1)}{h} = 0$ , il suffit donc de montrer que  $\lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\tau}{f(\tau) - f(0)} = 0$ , c'est-à-dire que pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q. :

$$\tau \neq 0, |\tau| \leq \alpha \Rightarrow \left| \frac{\tau}{f(\tau) - f(0)} \right| \leq \varepsilon. \quad (3.6)$$

Soit  $\varepsilon > 0$ . On cherche  $\alpha > 0$  satisfaisant (3.6). Comme  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = +\infty$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q.

$$x \neq 0, |x| \leq \alpha \Rightarrow f'(x) \geq \frac{1}{\varepsilon}. \quad (3.7)$$

Soit  $\tau \neq 0$  t.q.  $|\tau| \leq \alpha$ . On applique le théorème des accroissements finis à la fonction  $f$  sur l'intervalle dont les bornes sont 0 et  $\tau$ . Il donne l'existence de  $z$  strictement entre 0 et  $\tau$  t.q.  $f(\tau) - f(0) = \tau f'(z)$ . On a donc  $\frac{\tau}{f(\tau) - f(0)} = \frac{1}{f'(z)}$ . Comme  $f'(z) \geq \frac{1}{\varepsilon} > 0$  (grâce à (3.7) car  $|z| \leq |\tau| \leq \alpha$ ), on a donc  $0 < \frac{\tau}{f(\tau) - f(0)} \leq \varepsilon$ .

ce qui donne :

$$\left| \frac{\tau}{f(\tau) - f(0)} \right| \leq \varepsilon.$$

On a donc trouvé  $\alpha > 0$  satisfaisant (3.6). Ce qui prouve que  $g$  est dérivable en 1 et  $g'(1) = 0$ .

6. (Régularité de la fonction réciproque) Montrer que la fonction réciproque de  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $]m, l[$  mais que  $f$  n'est pas de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

**corrigé**

La fonction  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^*$  (mais pas sur  $\mathbb{R}$  car  $f$  n'est pas dérivable en 0) et  $f'$  ne s'annule pas sur  $\mathbb{R}^*$  (on a montré que  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$ ). On en déduit que la fonction réciproque de  $f$ , notée  $g$ , est de classe  $C^1$  sur  $\{f(x), x \in \mathbb{R}^*\}$ , c'est-à-dire sur  $]m, 1[ \cup ]1, l[$ . Plus précisément, pour tout  $y \in ]m, 1[ \cup ]1, l[$ , on a :

$$g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}.$$

Comme  $g$  est continue sur  $]m, l[$  et que  $f'$  est continue et non nulle sur  $\mathbb{R}^*$ , on en déduit bien que  $g'$  est continue sur  $]m, 1[ \cup ]1, l[$  (noter que  $g(y) \neq 0$  si  $y \neq 0$  car  $g$  est injective). Dans la question 6, on a montré que  $g$  est dérivable en 1 et que  $g'(1) = 0$ . Pour montrer que  $g$  est de classe  $C^1$  sur  $]m, l[$ , il reste donc seulement à montrer que  $g'$  est continue en 1. Or, comme  $\lim_{y \rightarrow 1} g(y) = g(1) = 0$ , on a :

$$\lim_{y \rightarrow 1} g'(y) = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{1}{f'(g(y))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{f'(x)} = 0.$$

Ce qui prouve la continuité de  $g'$  en 1. On a bien, finalement, montré que  $g$  est de classe  $C^1$  sur  $]m, l[$ .

**Exercice 3.20 (Points fixes de  $f$ , si  $f \circ f = f$ )**

Soit  $-\infty < a < b < +\infty$  et  $f$  une fonction continue de  $[a, b]$  dans  $[a, b]$ . On rappelle que  $x \in [a, b]$  est un point fixe de  $f$  si  $f(x) = x$ .

1. Montrer que  $f$  admet au moins un point fixe. [On pourra considérer la fonction  $g$  définie sur  $[a, b]$  par  $g(x) = f(x) - x$ .]

————— corrigé —————

On remarque que  $g(a) = f(a) - a \geq 0$  (car  $f(a) \geq a$ ) et  $g(b) = f(b) - b \leq 0$  (car  $f(b) \leq b$ ). Comme  $g$  est continue sur  $[a, b]$  et  $g(a) \geq 0 \geq g(b)$ , le théorème des valeurs intermédiaires donne l'existence de  $c \in [a, b]$  t.q.  $g(c) = 0$ .

On suppose dans la suite que  $f \circ f = f$ . On pose  $\text{Im}(f) = \{f(x), x \in [a, b]\}$ .

2. Montrer que tout élément de  $\text{Im}(f)$  est un point fixe de  $f$ .

————— corrigé —————

Soit  $y \in \text{Im}(f)$ . Il existe  $x \in [a, b]$  t.q.  $y = f(x)$ . On a donc  $f(y) = f(f(x)) = f \circ f(x) = f(x) = y$ . Ce qui prouve que  $y$  est un point fixe de  $f$ .

3. On suppose, dans cette question, que  $f$  admet un seul point fixe. Montrer que  $f$  est constante.

————— corrigé —————

Puisque  $f$  admet un seul point fixe, la question précédente donne que  $\text{Im}(f)$  ne peut contenir que un seul point. Ce qui prouve que  $f$  est constante.

On suppose dans la suite que  $f$  admet au moins 2 points fixes (distincts) et que  $f$  est dérivable (c'est-à-dire dérivable en tout point de  $]a, b[$ ).

4. Montrer qu'il existe  $m, M \in [a, b]$  t.q.  $\text{Im}(f) = [m, M]$  et  $m < M$ .

————— corrigé —————

L'image d'un intervalle fermé borné par une fonction continue est encore un intervalle fermé borné. Il existe donc  $m, M \in \mathbb{R}$  t.q.  $m \leq M$  et  $\text{Im}(f) = [m, M]$ . Comme  $f$  admet au moins 2 points fixes,  $\text{Im}(f)$  contient au moins deux points. Donc,  $m < M$ .

5. Montrer que  $f'(x) = 1$  pour tout  $x \in ]m, M[$  (ici et dans la suite,  $m$  et  $M$  sont donnés par la question précédente).

————— corrigé —————

Pour tout  $x \in ]m, M[$ , on a  $f(x) = x$  (car  $]m, M[ \subset \text{Im}(f)$ ). On a donc, pour tout  $x \in ]m, M[$ ,  $f'(x) = 1$ .

6. On suppose, dans cette question, que  $m > a$ .

- (a) Montrer que  $f'(m) = 1$ .

————— corrigé —————

On a  $a < m < M \leq b$ . La fonction  $f$  est donc dérivable en  $m$ . Pour  $0 < h < M - m$ , on a  $f(m) = m$  et  $f(m+h) = m+h$  (car  $m$  et  $(m+h)$  sont dans  $\text{Im}(f)$  et sont donc des points fixes de  $f$ ). On a donc :

$$\frac{f(m+h) - f(m)}{h} = 1.$$

On en déduit que :

$$f'(m) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(m+h) - f(m)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0, h > 0} \frac{f(m+h) - f(m)}{h} = 1.$$

(b) Montrer qu'il existe  $x \in ]a, m[$  t.q.  $f(x) < m$ .

**corrigé**

Comme  $f$  est dérivable en  $m$  et que  $f'(m) = 1$ , on a  $f(x) = f(m) + (x - m) + (x - m)\varepsilon(x)$  avec  $\lim_{x \rightarrow m} \varepsilon(x) = 0$ . Il existe donc  $\eta > 0$  t.q. :

$$|x - m| \leq \eta \Rightarrow |\varepsilon(x)| < 1.$$

Pour  $x \in [a, m[$  avec  $m - x < \eta$  on a donc :

$$f(x) < f(m) + (x - m) + |x - m| = f(m).$$

(c) En déduire que l'hypothèse  $m > a$  est en contradiction avec la définition de  $m$ .

**corrigé**

Si  $m > a$ , on vient de montrer l'existence de  $x \in [a, b]$  t.q.  $f(x) < f(m)$ , ce qui impossible car  $f(x) \in \text{Im}(f) = [m, M]$  et  $f(m) = m$  (car  $m \in \text{Im}(f)$  et donc  $m$  est un point fixe de  $f$ ).

7. Montrer que  $m = a$ ,  $M = b$  et  $f(x) = x$  pour tout  $x \in [a, b]$ .

**corrigé**

La question précédente donne  $m \leq a$  et donc finalement  $m = a$  (car  $[m, M] = \text{Im}(f) \subset [a, b]$ ). De manière analogue, on peut montrer que  $M = b$ . On a donc  $\text{Im}(f) = [a, b]$  et donc  $f(x) = x$  pour tout  $x \in [a, b]$ .

8. Montrer que le résultat de la question précédente peut être faux si on retire l'hypothèse " $f$  dérivable". [On cherche donc  $f$  continue de  $[a, b]$  dans  $[a, b]$  t.q.  $f \circ f = f$ ,  $f$  admet au moins deux points fixes distincts et il existe  $x \in [a, b]$  t.q.  $f(x) \neq x$ .]

**corrigé**

On peut prendre, par exemple,  $a = 0$ ,  $b = 3$ ,  $f(x) = 1$  si  $0 \leq x < 1$ ,  $f(x) = x$  si  $1 \leq x \leq 2$ ,  $f(x) = 2$  si  $2 < x \leq 3$ .

### Exercice 3.21 (Calcul de limites)

Calculer  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(x)}{x}$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{2x}}{x}$  et  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} \frac{x}{(\ln(1+x))^2}$ .

**corrigé**

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(x)}{x} = 0$  car  $|\frac{\sin(x)}{x}| \leq \frac{1}{x}$  pour tout  $x > 0$ .

Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $f(x) = e^x - e^{2x}$ . La fonction  $f$  est dérivable en 0 et  $f(0) = 0$ . On en déduit  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{2x}}{x} = f'(0) = -1$ .

Pour  $x \in ]-1, \infty[$ , on pose  $g(x) = \ln(1+x)^2$ . La fonction  $g$  est dérivable en 0 et  $g(0) = 0$ . On en déduit  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)^2}{x} = g'(0) = 0$ . Comme  $g(x) > 0$  quand  $x > 0$ , on a donc  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} \frac{x}{(\ln(1+x))^2} = +\infty$ .

**Exercice 3.22 (Fonction sous linéaire)**

Soit  $f$  une fonction dérivable de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et t.q.  $f(0) = 0$ . On définit la fonction  $g$  de  $\mathbb{R}_+$  dans  $\mathbb{R}$  (avec  $\mathbb{R}_+ = [0, \infty[$ ) par :

$$g(x) = \frac{f(x)}{x} \text{ si } x > 0,$$

$$g(0) = f'(0).$$

1. Montrer que  $g$  est continue en tout point de  $\mathbb{R}_+$ .

—————  
**corrigé**  
—————

La fonction  $g$  est continue sur  $]0, \infty[$  car c'est le quotient de deux fonctions continues et que son dénominateur ne s'annule par (sur  $]0, \infty[$ ). On peut aussi noter que  $g$  est dérivable sur  $]0, \infty[$

Comme  $f$  est dérivable en 0 et que  $f(0) = 0$ , On a  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0)$ . La fonction  $g$  est donc continue en 0 (et donc continue sur tout  $\mathbb{R}_+ = [0, \infty[$ ).

On suppose maintenant qu'il existe  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , t.q., pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $f(x) \leq \alpha x + \beta$ .

2. Montrer que  $g$  est majorée (c'est-à-dire que l'ensemble  $\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\}$  est majoré)

—————  
**corrigé**  
—————

La fonction  $g$  est continue sur  $[0, 1]$ . La restriction de  $g$  à  $[0, 1]$  est donc majorée (car  $[0, 1]$  est fermé et borné). Il existe donc  $M$  t.q., pour tout  $x \in [0, 1]$ ,  $g(x) \leq M$ .

Puis, pour  $x > 1$ , on remarque que  $g(x) \leq \alpha + \frac{\beta}{x} \leq \alpha + |\beta|$ . On a donc finalement, pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $g(x) \leq C = \max\{M, \alpha + |\beta|\}$ , ce qui prouve que  $g$  est majorée.

3. On suppose, dans cette question, que  $\alpha < f'(0)$ . Montrer qu'il existe  $a \in \mathbb{R}_+$  t.q.  $g(a) = \sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\}$ . Montrer que  $g(a) = f'(a)$ .

—————  
**corrigé**  
—————

On choisit  $\varepsilon = f'(0) - \alpha > 0$ , et on pose  $A = \frac{|\beta|}{\varepsilon} \geq 0$ . Pour  $x \geq A$ , on a donc  $g(x) \leq \alpha + \frac{\beta}{x} \leq \alpha + \varepsilon = f'(0)$ .

La fonction  $g$  est continue sur l'intervalle fermé borné  $[0, A]$ , il existe donc  $a \in [0, A] \subset \mathbb{R}_+$  t.q.  $g(a) = \sup\{g(x), x \in [0, A]\}$ . Mais, comme  $\sup\{g(x), x \in [0, A]\} \geq g(0) = f'(0)$  et que pour  $x > A$  on a  $g(x) \leq f'(0)$ , on a donc  $g(a) = \sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\}$ .

Si  $a = 0$ , on a bien  $g(a) = f'(a)$ . Si  $a > 0$ , le fait que  $g(a) = \sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\}$  et que  $g$  soit dérivable en  $a$  permet de montrer que  $g'(a) = 0$  (comme dans la démonstration du théorème des accroissements finis). Comme  $xg(x) = f(x)$  pour tout  $x > 0$ , on a  $g(x) + xg'(x) = f'(x)$  pour tout  $x > 0$  et donc  $g(a) = f'(a)$ .

4. On suppose, dans cette question, que  $f(x) = x - \frac{x^3}{1+x^2}$ .

(a) La fonction  $f$  vérifie-t-elle les hypothèses données au début de l'exercice ?

—————  
**corrigé**  
—————

Oui...  $f$  est dérivable et  $f(0) = 0$ .

(b) Donner des valeurs de  $\alpha$  et  $\beta$  pour lesquelles, pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $f(x) \leq \alpha x + \beta$ .

-----  
**corrigé**  
-----

Comme  $\frac{x^3}{1+x^2} \geq 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ , les valeurs suivantes conviennent :  $\alpha = 1, \beta = 0$ .

(c) Montrer qu'il existe un unique  $a \in \mathbb{R}_+$  t.q.  $g(a) = \sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\}$  et donner cette valeur de  $a$ .

-----  
**corrigé**  
-----

On a  $g(x) < 1$ , pour tout  $x \in ]0, \infty[$ , et  $g(0) = 1$ . Il existe donc un unique  $a \in \mathbb{R}_+$  t.q.  $g(a) = \sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\} (= 1)$  et  $a = 0$ .

5. On suppose, dans cette question, que  $\alpha = f'(0)$ . Montrer qu'il existe  $a \in \mathbb{R}_+$  t.q.  $g(a) = \sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\}$  et que  $g(a) = f'(a)$ .

-----  
**corrigé**  
-----

On pose  $\gamma = \sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\}$ . On a  $\gamma \geq g(0) = f'(0)$  et donc distingue deux cas ;

Premier cas :  $\gamma = f'(0)$ . Dans ce cas,  $a = 0$  convient car  $g(0) = f'(0) = \gamma$ .

Deuxième cas :  $\gamma > f'(0)$ .

On choisit alors  $\varepsilon = \frac{\gamma - f'(0)}{2} > 0$ , et on pose  $A = \frac{|\beta|}{\varepsilon} \geq 0$ . Pour  $x \geq A$ , on a donc  $g(x) \leq \alpha + \frac{\beta}{x} \leq \alpha + \varepsilon = f'(0) + \varepsilon = \frac{\gamma + f'(0)}{2} < \gamma$ . On a donc  $\sup\{g(x), x \in [A, \infty[ \} < \gamma$  et donc :

$$\gamma = \sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\} = \sup\{g(x), x \in [0, A]\}.$$

La fonction  $g$  est continue sur l'intervalle fermé borné  $[0, A]$ , il existe donc  $a \in [0, A] \subset \mathbb{R}_+$  t.q.  $g(a) = \sup\{g(x), x \in [0, A]\}$ . Ce qui donne bien  $g(a) = \gamma$ .

La démonstration de  $g(a) = f'(a)$  est identique à celle de la question 3.

6. Montrer, en donnant un exemple (c'est-à-dire en choisissant convenable  $f$ ) qu'il peut ne pas exister  $a \in \mathbb{R}_+$  t.q.  $g(a) = \sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\}$  (pour cet exemple, on aura donc nécessairement  $\alpha > f'(0)$ ).

-----  
**corrigé**  
-----

On peut prendre, par exemple,  $f$  définie par  $f(x) = x + \frac{x^3}{1+x^2}$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . On a bien  $f$  dérivable,  $f(0) = 0$ . Comme  $\frac{x^2}{1+x^2} < 1$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , les valeurs  $\alpha = 2$  et  $\beta = 0$  conviennent et on a  $g(x) < 2$ , pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ . Enfin, on a  $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 2$ . on en déduit que  $\sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\} = 2$  et qu'il n'existe pas d'élément  $a$  de  $\mathbb{R}_+$  t.q.  $g(a) = \sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\}$ .

### Exercice 3.23 (TAF...)

Soit  $f$  une application continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est dérivable pour tout  $x \neq 0$  et que  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = +\infty$ .

1. Montrer que  $f$  n'est pas dérivable en 0.

-----  
**corrigé**  
-----

On va montrer que  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \infty$  (ce qui prouve que  $f$  n'est pas dérivable en 0), c'est-à-dire que pour tout  $M \in \mathbb{R}$  il existe  $\alpha > 0$  t.q. :

$$h \neq 0, |h| \leq \alpha \Rightarrow \frac{f(h) - f(0)}{h} \geq M. \quad (3.8)$$

Soit donc  $M \in \mathbb{R}$ . Comme  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = +\infty$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q. :

$$x \neq 0, |x| \leq \alpha \Rightarrow f'(x) \geq M. \quad (3.9)$$

Soit maintenant  $h \neq 0$  avec  $|h| \leq \alpha$ , le théorème des accroissements finis (théorème 3.2) donne l'existence de  $c \in ]\min(0, h), \max(0, h)[$  t.q. :

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = f'(c).$$

Comme  $|h| \leq \alpha$ , on a  $c \in ]-\alpha, \alpha[$  et, comme  $c \neq 0$ , (3.9) donne  $f'(c) \geq M$ , on a donc  $\frac{f(h) - f(0)}{h} \geq M$ .

On a bien ainsi montré que pour tout  $M \in \mathbb{R}$ , il existe  $\alpha > 0$  vérifiant (3.8). Ceci montre que  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = +\infty$  et donc que  $f$  n'est pas dérivable en 0.

2. On suppose maintenant que  $f$  est bijective de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , strictement croissante et que  $f(0) = 0$ . On note  $g$  la fonction réciproque de  $f$  [l'existence de la fonction  $g$  a été vue en cours]. Montrer que  $g$  est dérivable en 0 et que  $g'(0) = 0$ .

**corrigé**

On reprend ici essentiellement la démonstration faite en cours pour montrer la dérivabilité d'une fonction réciproque.

On veut montrer que  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(0)}{h} = 0$ , c'est-à-dire que pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe  $\beta > 0$  t.q. :

$$h \neq 0, |h| \leq \beta \Rightarrow \left| \frac{g(h) - g(0)}{h} \right| \leq \varepsilon. \quad (3.10)$$

Soit  $h \neq 0$ . Comme  $f \circ g(h) = h$ ,  $f(0) = 0$  et  $g(0) = 0$  (noter que  $g(h) \neq 0$  car  $h \neq 0$  et  $g$  injective), on a :

$$\frac{g(h) - g(0)}{h} = \frac{g(h)}{f(g(h)) - f(0)}.$$

Le théorème des accroissements finis donne l'existence de  $d \in ]\min(0, g(h)), \max(0, g(h))[$  t.q. :

$$f(g(h)) - f(0) = g(h)f'(d)$$

(bien sûr, le point  $d$  dépend de  $h$ ). On a donc :

$$\frac{g(h) - g(0)}{h} = \frac{1}{f'(d)}. \quad (3.11)$$

Cette égalité, avec (3.9) et la continuité de  $g$  (qui a été vue en cours) nous suggère le choix de  $\beta$ , à partir de  $\varepsilon$ , pour avoir (3.10). En effet, soit  $\varepsilon > 0$ . On choisit  $M = 1/\varepsilon$ . Il existe alors  $\alpha > 0$  vérifiant (3.9). Mais, comme  $g$  est continue en 0, il existe  $\beta > 0$  t.q. :

$$y \in \mathbb{R}, |y| \leq \beta \Rightarrow |g(y)| \leq \alpha.$$

Si  $|h| \leq \beta$ , on a donc  $|g(h)| \leq \alpha$ . Ce qui donne  $d \in ]-\alpha, \alpha[$  et donc (comme on a aussi  $d \neq 0$ ),  $f'(d) \geq M = 1/\varepsilon > 0$ . Finalement, on obtient avec (3.11),

$$\left| \frac{g(h) - g(0)}{h} \right| = \frac{g(h) - g(0)}{h} \leq \varepsilon.$$

Pour tout  $\varepsilon > 0$  on a donc trouvé  $\beta$  vérifiant (3.10). Ce qui prouve que  $g$  est dérivable en 0 et  $g'(0) = 0$ .

**Exercice 3.24**

Etudier l'existence et la valeur d'une limite éventuelle en  $x_0$  pour les fonctions suivantes.

- $f_1(x) = \frac{x+|x|}{x}$ , pour  $x \neq 0$ , et  $x_0 = 0$ ,
- $f_2(x) = (\frac{\pi}{2} - x) \tan x$ , pour  $x \in ]0, \frac{\pi}{2}[ \cup ]\frac{\pi}{2}, \pi[$ , et  $x_0 = \frac{\pi}{2}$ .

---

**corrigé**

---

La limite à gauche de  $f_1$  en 0 est 0 et la limite à droite est 2. Donc,  $f$  n'a pas de limite en 0 pour  $x \in ]0, \frac{\pi}{2}[ \cup ]\frac{\pi}{2}, \pi[$ , on a :

$$f_2(x) = \frac{\frac{\pi}{2} - x}{\cos(x) - \cos(\frac{\pi}{2})} \sin(x).$$

Comme  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x) - \cos(\frac{\pi}{2})}{x - \frac{\pi}{2}} = -\sin(\frac{\pi}{2}) = -1$  et  $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$ , on en déduit :

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f_2(x) = 1.$$


---

**Exercice 3.25**

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes. Montrer qu'elles sont dérivables et donner une expression de leur dérivée.

- $f_1(x) = x^{\frac{1}{x}}$ ,
- $f_2(x) = \ln\left(\frac{1+\sin(x)}{1-\sin(x)}\right)$ .

---

**corrigé**

---

La fonction  $f_1$  est définie sur  $\mathbb{R}_+^*$  et est dérivable comme composée de fonctions dérivables. Comme  $f_1(x) = e^{\ln(x)/x}$ , on a, pour tout  $x > 0$  :

$$f_1'(x) = \frac{1}{x^2}(1 - \ln(x))x^{\frac{1}{x}}.$$

La fonction  $f_2$  est définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ . Elle est dérivable comme composée de fonctions dérivables et on trouve, pour tout  $x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ ,  $f_2'(x) = \frac{2}{\cos(x)}$ .

---

**Exercice 3.26**

En appliquant le théorème des accroissements finis, montrer que  $1 < \frac{e^x - 1}{x} < e^x$ , pour tout  $x > 0$ .

---

**corrigé**

---

Soit  $x > 0$ . Comme la fonction  $y \mapsto e^y$  est continue sur  $[0, x]$  et dérivable sur  $]0, x[$ , le théorème des accroissements finis donne l'existence de  $c \in ]0, x[$  t.q.  $e^x - e^0 = xe^c$ . On a donc :

$$\frac{e^x - 1}{x} = e^c.$$

Comme la fonction  $y \mapsto e^y$  est strictement croissante, on a  $1 = e^0 < e^c < e^x$  (car  $0 < c < x$ ) et donc :

$$1 < \frac{e^x - 1}{x} < e^x.$$


---

**Exercice 3.27 (Fonction convexe)**

Soit  $\varphi$  une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $\varphi$  est dérivable (c'est-à-dire dérivable en tout point de  $\mathbb{R}$ ) et que  $\varphi'$  est une fonction croissante.

1. Soit  $x < z < y$ . Montrer que  $\frac{\varphi(z)-\varphi(x)}{z-x} \leq \frac{\varphi(y)-\varphi(z)}{y-z}$ .
- 
- corrigé**

La fonction  $\varphi$  est continue sur  $[x, z]$  et dérivable sur  $]x, z[$ , le théorème des accroissements finis (théorème 3.2) donne l'existence de  $c \in ]x, z[$  t.q.

$$\frac{\varphi(z) - \varphi(x)}{z - x} = \varphi'(c).$$

De même, le théorème des accroissements finis donne l'existence de  $d \in ]z, y[$  t.q.

$$\frac{\varphi(y) - \varphi(z)}{y - z} = \varphi'(d).$$

Comme  $\varphi'$  est croissante et  $c < z < d$ , on a  $\varphi'(c) \leq \varphi'(d)$  et donc  $\frac{\varphi(z)-\varphi(x)}{z-x} \leq \frac{\varphi(y)-\varphi(z)}{y-z}$ .

---

2. Montrer que  $\varphi$  est convexe, c'est-à-dire que

$$\varphi(tx + (1 - t)y) \leq t\varphi(x) + (1 - t)\varphi(y) \text{ pour tout } x, y \in \mathbb{R} \text{ et tout } t \in [0, 1]. \quad (3.12)$$

[Pour  $x < y$  et  $t \in ]0, 1[$ , on pourra utiliser la question 1 avec  $z = tx + (1 - t)y$ .]

---

**corrigé**

L'inégalité (3.12) est immédiate pour  $x = y$ . Elle est aussi immédiate pour  $x \neq y$  et  $t = 0$  ou  $t = 1$ . Il reste à étudier le cas  $x \neq y$  et  $t \in ]0, 1[$ . On peut aussi supposer  $x < y$  (quitte à changer  $x$  en  $y$ ,  $y$  en  $x$  et  $t$  en  $1 - t$ ).

On applique alors la question 1 avec  $z = tx + (1 - t)y$ , de sorte que  $z - x = (1 - t)(y - x)$  et  $y - z = t(y - x)$ . On obtient

$$\frac{\varphi(z) - \varphi(x)}{(1 - t)(y - x)} = \frac{\varphi(z) - \varphi(x)}{z - x} \leq \frac{\varphi(y) - \varphi(z)}{y - z} = \frac{\varphi(y) - \varphi(z)}{t(y - z)}.$$

Ce qui donne, comme  $y - x > 0$ ,  $t > 0$  et  $(1 - t) > 0$ ,

$$t(\varphi(z) - \varphi(x)) \leq (1 - t)(\varphi(y) - \varphi(z)).$$

On en déduit bien l'inégalité (3.12).

---

3. On définit ici la fonction  $\psi$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  par  $\psi(x) = |x|$  si  $x \in \mathbb{R}$ . Montrer que  $\psi$  est convexe. La fonction  $\psi$  est-elle dérivable en tout point de  $\mathbb{R}$  ?
- 

**corrigé**

Soit  $x, y \in \mathbb{R}$  et  $t \in [0, 1]$ , on a

$$\psi(tx + (1 - t)y) = |tx + (1 - t)y| \leq t|x| + (1 - t)|y| = t\psi(x) + (1 - t)\psi(y).$$

Ce qui montre bien que  $\psi$  est convexe. La fonction  $\psi$  n'est pas dérivable en 0.

---

**Exercice 3.28 (Recherche d'un maximum et convexité)**

Soit  $\varphi$  une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  vérifiant

$$\varphi\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{1}{2}\varphi(x) + \frac{1}{2}\varphi(y) \text{ pour tout } x, y \in \mathbb{R}. \tag{3.13}$$

(Noter que  $\varphi$  n'est pas nécessairement dérivable.)

1. Dans cette question, on suppose qu'il existe  $a \in \mathbb{R}$  t.q.  $\varphi(a) = \max\{\varphi(x), x \in \mathbb{R}\}$ . (On a donc  $\varphi(a) \geq \varphi(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .)

(a) Soit  $\theta \neq 0$ . Montrer que

$$\varphi(a) \leq \frac{1}{2}\varphi(a+\theta) + \frac{1}{2}\varphi(a-\theta), \quad \varphi(a+\theta) \leq \varphi(a) \quad \text{et} \quad \varphi(a-\theta) \leq \varphi(a).$$

Montrer que  $\varphi(a+\theta) = \varphi(a-\theta) = \varphi(a)$ .

—————  
**corrigé**  
—————

On remarque que  $a = \frac{1}{2}(a+\theta) + \frac{1}{2}(a-\theta)$ . L'inégalité (3.13) donne donc  $\varphi(a) \leq \frac{1}{2}\varphi(a+\theta) + \frac{1}{2}\varphi(a-\theta)$ . Puis, comme  $\varphi(a) = \max\{\varphi(x), x \in \mathbb{R}\}$ , on a, bien sûr,  $\varphi(a+\theta) \leq \varphi(a)$  et  $\varphi(a-\theta) \leq \varphi(a)$ .

En utilisant ces trois inégalités, on remarque que

$$\varphi(a) \leq \frac{1}{2}\varphi(a+\theta) + \frac{1}{2}\varphi(a-\theta) \leq \frac{1}{2}\varphi(a+\theta) + \frac{1}{2}\varphi(a).$$

On a donc  $\frac{1}{2}\varphi(a) \leq \frac{1}{2}\varphi(a+\theta) \leq \frac{1}{2}\varphi(a)$ . Ce qui donne bien  $\varphi(a+\theta) = \varphi(a)$ . De même on a  $\varphi(a-\theta) = \varphi(a)$  (par exemple en changeant  $\theta$  en  $-\theta$ ).

(b) Montrer que  $\varphi(x) = \varphi(a)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  (la fonction  $\varphi$  est donc constante).

—————  
**corrigé**  
—————

Soit  $x \neq a$ . On pose  $\theta = x - a$ . La question précédente donne  $\varphi(x) = \varphi(a+\theta) = \varphi(a)$ . La fonction  $\varphi$  est donc constante.

2. On s'intéresse maintenant à une situation un peu plus compliquée. Soit  $g$  une fonction dérivable de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On pose  $f = \varphi + g$  et on suppose qu'il existe  $a \in \mathbb{R}$  t.q.  $f(a) = \max\{f(x), x \in \mathbb{R}\}$ .

(a) Soit  $h \neq 0$ .

i. Montrer que  $\varphi(a+h) - \varphi(a) \leq g(a) - g(a+h)$ .

—————  
**corrigé**  
—————

On remarque que  $\varphi(a+h) + g(a+h) = f(a+h) \leq f(a) = \varphi(a) + g(a)$ . on a donc  $\varphi(a+h) - \varphi(a) \leq g(a) - g(a+h)$ .

ii. Montrer que  $\varphi(a+h) - \varphi(a) \geq g(a-h) - g(a)$ .

—————  
**corrigé**  
—————

La question précédente, changeant  $h$  en  $-h$ , donne  $\varphi(a-h) - \varphi(a) \leq g(a) - g(a-h)$ . Ce qui peut s'écrire

$$\varphi(a) - \varphi(a-h) \geq g(a-h) - g(a).$$

Or l'inégalité (3.13) donne

$$\frac{1}{2}\varphi(a) + \frac{1}{2}\varphi(a) \leq \frac{1}{2}\varphi(a+h) + \frac{1}{2}\varphi(a-h).$$

On a donc  $\varphi(a+h) - \varphi(a) \geq \varphi(a) - \varphi(a-h)$  et, finalement, on obtient bien

$$\varphi(a+h) - \varphi(a) \geq \varphi(a) - \varphi(a-h) \geq g(a-h) - g(a).$$

- 
- (b) Montrer que  $\varphi$  est dérivable en  $a$  et que  $\varphi'(a) = -g'(a)$ . [On pourra commencer par calculer, en fonction de  $g'(a)$ , la limite de  $(g(a-h) - g(a))/h$  quand  $h$  tend vers 0.]

**corrigé**

Comme  $\frac{g(a-h)-g(a)}{h} = -\frac{g(a-h)-g(a)}{-h}$ , on a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a-h) - g(a)}{h} = -g'(a).$$

La question précédente donne, pour tout  $h > 0$ ,

$$\frac{g(a-h) - g(a)}{h} \leq \frac{\varphi(a+h) - \varphi(a)}{h} \leq -\frac{g(a+h) - g(a)}{h}$$

et, pour tout  $h < 0$ ,

$$\frac{g(a-h) - g(a)}{h} \geq \frac{\varphi(a+h) - \varphi(a)}{h} \geq -\frac{g(a+h) - g(a)}{h}$$

Comme  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a-h)-g(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{g(a+h)-g(a)}{h} = -g'(a)$ , on en déduit que  $\varphi$  est dérivable en  $a$  et que  $\varphi'(a) = -g'(a)$ .

---

N.B. On a donc montré que  $\varphi$  est nécessairement dérivable au point où  $f$  atteint son maximum.

3. (Exemple) On définit ici  $\varphi$  et  $g$  par  $\varphi(x) = |x|$  et  $g(x) = -x^2$  pour  $x \in \mathbb{R}$ . On pose  $f = \varphi + g$ . Donner les deux points  $a, b \in \mathbb{R}$  t.q.  $f(a) = f(b) = \max\{f(x), x \in \mathbb{R}\}$ . [On pourra commencer par dessiner la courbe de  $f$ .]

**corrigé**

La fonction  $f$  est paire. On l'étudie sur  $\mathbb{R}_+$ . On a  $f(x) = x(1-x)$  pour  $x \geq 0$ . La fonction  $f$  est donc strictement croissante sur  $[0, \frac{1}{2}]$  puis strictement décroissante sur  $[\frac{1}{2}, +\infty[$ . On en déduit que les points  $a$  et  $b$  sont les points  $\frac{1}{2}$  et  $-\frac{1}{2}$ .

---