Mathématiques Générales 1

DEVOIR SURVEILLÉ N° 1

Exercice 1 Une fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ a pour limite $+\infty$ en $+\infty$ lorsque

$$\forall M > 0, \quad \exists A > 0, \quad x > A \Rightarrow f(x) > M.$$

Exprimer avec les quantificateurs qu'une fonction g ne tend pas vers $+\infty$ en $+\infty$

Exercice 2 On considère l'équation différentielle

$$(x-1)(x-2)y' - (2x-3)y = x^2$$

1. Trouver une solution particulière sous forme d'un polynôme.
2. Déterminer les solutions générales de l'équation homogène sur des intervalles à déterminer.
3. Déterminer une solution continue sur $\mathbb{R}$ telle que $y(0) = 0$.

Exercice 3 Résoudre l'équation différentielle $y' + y \operatorname{th} x = \operatorname{th} x$ avec la condition $y(0) = 2$. Faites l'étude de la fonction solution.

Exercice 4 On considère l'équation différentielle régissant le mouvement d'un pendule amorti

$$y''(t) + 2ay'(t) + y(t) = \cos(t)$$

où a est un réel strictement positif.

1. Cherchez une solution particulière de (E) (on pourra prendre une fonction de la forme $A \cos(t) + B \sin(t)$)
2. Résoudre l'équation homogène associée à (E) en fonction de la valeur du paramètre a
3. Dans chacun des cas, donnez la solution de (E) telle que $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$. Tracer sommairement la forme des solutions. Quelle est leur limite en $+\infty$?

Exercice 5 Soient A , B et C trois ensembles tels que $A \neq \emptyset$. Montrez que $A \times B = A \times C$ si et seulement si $B = C$.

Exercice 6 Soit E un ensemble et A une partie de E . Montrez que, si pour toute partie X de E on a $A \cup X = E$, alors $A = E$. Montrez que, si pour toute partie X de E on a $A \cap X = X$, alors $A = E$.