Étude des variations d'une fonction

On considère l'application $f : x \mapsto \frac{x^3}{3} - 2x^2 - x$ définie pour tout $x \in \mathbb{R}$. On se propose d'étudier les variations de l'application $\phi : [0; \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$\phi(x) = f(\sin(x)) = \frac{\sin^3(x)}{3} - 2\sin^2(x) - \sin(x).$$

————— QUESTION 1 —————

La dérivée de $f(x)$ est

Le signe de $f'(x)$ est pour $x \in [0; 1]$.

Rappeler la formule de dérivation des fonctions composées: $(f \circ g)'(x) = \dots$

D'après cette formule, $\phi'(x) = \dots$

————— QUESTION 2 —————

Remplir le tableau de variations de la fonction ϕ :

x	
$\phi'(x)$	
$\phi(x)$	

Étude des variations d'une fonction

On pose $f(x) = \sqrt{x(1-x)}$ pour tout x réel pour lequel cela a un sens. On se propose d'étudier les variations de l'application

$$x \mapsto \phi(x) = f(e^x) = \sqrt{e^x(1-e^x)}$$

sur le domaine de $\mathbb{R}$ où $\phi(x)$ est bien définie.

————— QUESTION 1 —————

La fonction f est définie sur et la fonction ϕ sur

La dérivée de $f(x)$ est pour tout $x \in$

Donc, par la formule de dérivation des fonctions composées, $\phi'(x) =$

pour tout $x \in$

————— QUESTION 2 —————

Remplir le tableau de variations de la fonction ϕ :

x	
$\phi'(x)$	
$\phi(x)$	

Analyse des fonctions appliquée à l'optimisation

Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Pour tout $-1 \leq x \leq 1$, on note M_x (resp M'_x) le point du cercle trigonométrique d'abscisse x et d'ordonnée positive (resp. négative). Par définition $f(x)$ est l'aire du triangle $M_1 M_x M'_x$.

QUESTION 1

Pour tout $-1 \leq x \leq 1$, exprimer $f(x)$ en fonction de $H_x M_1$ et de $H_x M_x$:

$f(x) = \dots\dots\dots$

puis, en fonction de x :

$f(x) = \dots\dots\dots$

Calculer $f'(x)$ et le mettre sous la forme $\frac{(ax + b)(cx + d)}{\sqrt{1 - x^2}}$:

$f'(x) = \dots\dots\dots$

QUESTION 2

Remplir le tableau de variations de la fonction f :

x		
$f'(x)$		
$f(x)$		

L'aire du triangle est donc maximale quand H_x est le milieu du segment $\dots\dots\dots$,
 et elle vaut $\dots\dots\dots$.

Analyse des fonctions appliquée à l'optimisation

Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Pour tout $0 \leq \theta \leq \pi$, on note M_θ (resp M'_θ) le point du cercle trigonométrique tel que $(\vec{i}; \overrightarrow{OM_\theta}) = \theta$ (resp. $(\vec{i}; \overrightarrow{OM'_\theta}) = -\theta$) modulo 2π . Par définition $\varphi(\theta)$ est l'aire du triangle $M_0M_\theta M'_\theta$.

QUESTION 1

Pour tout $\theta \in [0; \pi]$, exprimer $\varphi(\theta)$ en fonction de $\cos \theta$ et $\sin \theta$:

$\varphi(\theta) = \dots\dots\dots$.

Calculer $\varphi'(\theta)$ et le mettre sous la forme d'un polynôme en $\cos \theta$:

$\varphi'(\theta) = \dots\dots\dots$.

$\varphi'(\theta)$ s'annule pour $\cos \theta = \dots\dots\dots$, c'est dire pour $\theta = \dots\dots\dots$.

QUESTION 2

Remplir le tableau de variations de la fonction φ :

θ		
$\varphi'(\theta)$		
$\varphi(\theta)$		

L'aire du triangle est donc maximale quand $\theta = \dots\dots\dots$,

et cette aire vaut $\dots\dots\dots$.

Caractérisation d'une fonction classique I

On cherche à déterminer toutes les applications f définies sur $\mathbb{R}$ et satisfaisant les trois conditions suivantes:

- (1) $\forall a, b \in \mathbb{R}, f(a + b) = f(a)f(b);$
- (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = 1;$
- (3) $f(0) = 1.$

On se propose de démontrer que f est nécessairement dérivable en tout point, et de trouver une expression de $f(x)$ (on pourra utiliser les résultats sur les équations différentielles linéaires du premier ordre).

QUESTION 1

Soient x_0 et x deux éléments distincts de $\mathbb{R}$. En posant $a = x_0$ et $b = x - x_0$ et en utilisant l'hypothèse (1), exprimer $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ en fonction de a, b et f :

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \dots\dots\dots$$

Avec l'hypothèse (2), on en déduit $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \dots\dots\dots$

f est donc solution de l'équation différentielle $\dots\dots\dots$

dont la solution générale est $\dots\dots\dots$ (avec C constante).

Compte tenu de l'hypothèse (3), $C = \dots\dots\dots$ et $f(x) = \dots\dots\dots$

Caractérisation d'une fonction classique II

On cherche à déterminer toutes les applications f définies sur $]0; +\infty[$ et satisfaisant les trois conditions suivantes:

- (1) $\forall a, b \in]0; +\infty[, f(ab) = f(a) + f(b)$;
- (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+x)}{x} = 1$;
- (3) $f(1) = 0$.

On se propose de démontrer qu'alors f est nécessairement dérivable en tout point $x \in]0; +\infty[$, et de trouver une expression de $f(x)$.

QUESTION 1

Soient x_0 et x deux éléments distincts de $]0; +\infty[$. En posant $a = x_0$ et $b = \frac{x - x_0}{x_0}$ et en utilisant l'hypothèse (1), exprimer $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ en fonction de a , b et f :

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \dots\dots\dots .$$

Avec l'hypothèse (2), on en déduit $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \dots\dots\dots$,

d'où l'existence de $f'(x_0) = \dots\dots\dots$ (en fonction de x_0).

On a donc $f(x) = \dots\dots\dots$ pour tout $x \in]0; +\infty[$, d'où on déduit

$f(x) = \dots\dots\dots + C$ (avec C constante).

Compte tenu de l'hypothèse (3), $C = \dots\dots\dots$ et

$f(x) = \dots\dots\dots$ pour tout $x \in]0; +\infty[$.