

## Analyse I

## PLANCHE 2 : LIMITES, CONTINUITÉ

Les exercices marqués du symbole ● sont les exercices qui seront traités prioritairement en TD.

Le site internet EXO7 (<http://exo7.emath.fr>) est fait pour vous ! Il s'agit d'une base de donnée d'exercices destinés aux étudiants de licence, avec des corrections des exercices écrites et filmées. Il a été conçu par une large équipe d'enseignants-chercheurs de plusieurs universités françaises.

Certains exercices de cette planche sont tirés du site Exo7. D'autres sont similaires (mais pas identiques) à un exercice d'EXO7.

Alors n'hésitez plus ! Consultez EXO7 et servez-vous en pour préparer les séances de TD à l'avance et pour vous entraîner !

## Limites de fonctions

## Exercice 1 ●

Soient  $l \in \mathbb{R}$ ,  $a \in \mathbb{R}$ ,  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite et  $f$  une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . Ecrire à l'aide des quantificateurs les phrases suivantes :

1.  $f(x)$  ne tend pas vers  $l$  quand  $x$  tend vers  $a$ .
2.  $f(x)$  ne tend pas vers  $l$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$ .

## Exercice 2 ●

1.  $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$  pour  $x \in ]-1, 1[$ . Quelle est la limite à droite de  $f$  en 1 ?
2.  $f(x) = \sqrt{x+5} - \sqrt{x-3}$  pour  $x \in [3, +\infty[$ . Quelle est la limite de  $f$  en  $+\infty$  ?
3.  $f(x) = \sqrt{x^2+x+1} - (x+1)$  pour  $x \in \mathbb{R}$ . Quelle la limite de  $f$  en  $+\infty$  ?
4.  $f(x) = \frac{\sqrt{x^3-3x+2}}{2x^2-x-1}$  pour  $x \in ]0, 1[$ . Quelle est la limite à gauche de  $f$  en 1 ?
5.  $f(x) = \frac{\sqrt{x+3}-\sqrt{4x+3}}{\sqrt{x+4}-\sqrt{2x+4}}$  pour  $x \in ]0, 1[$ . Quelle est la limite à droite de  $f$  en 0 ?
6.  $f(x) = \frac{\ln(2x^2-x+2)}{\sqrt{x^3+1}}$  pour  $x \in \mathbb{R}_+$ . Quelle est la limite en  $+\infty$  ?
7.  $f(x) = \frac{\sin^2(x)}{1+\cos(x)}$  pour  $x \in ]-\pi, \pi[$ . Quelle sont les limites (respectivement à droite et à gauche) en  $-\pi$  et  $\pi$  ?
8.  $f(x) = \frac{\tan(x)-\sin(x)}{\sin(x)(\cos(2x)-\cos(x))}$  pour  $x \in [-2, 2] \setminus \{0\}$ . Quelle est la limite en 0 ?
9.  $f(x) = 2x \ln(x + \sqrt{x})$  pour  $x \in \mathbb{R}_+^*$ . Quelle est la limite (à droite) en 0 ?
10.  $f(x) = (x^2 - 1) \ln(7x^3 + 4x^2 + 3)$  pour  $x \in ]-1, +\infty[$ . Quelle est la limite (à droite) en  $-1$  ?
11. Soit  $a > 0$ . On définit  $f$  par  $f(x) = \frac{(1+x)^a}{x}$  pour  $x \in ]0, 1[$ . Quelle est la limite (à droite) de  $f$  en 0 ?
12.  $f(x) = (1 + \sin x)^{\frac{1}{x}}$  pour  $x \in ]0, 1[$ . Quelle est la limite (à droite) de  $f$  en 0 ?

## Exercice 3 ●

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle ouvert  $I$  et soit  $x_0$  un point de  $I$ . On suppose que  $f$  admet une limite  $a > 0$  en  $x_0$ . Démontrer qu'il existe  $\eta > 0$  tel que si  $|x - x_0| < \eta$  alors  $|f(x)| \geq \frac{a}{2}$ .

# Propriétés des limites et opérations

## Exercice 4 [Opérations sur les limites] •

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ . On pose  $I = ]a, b[$ . Soient  $f$  et  $g$  deux applications de  $I$  dans  $\mathbb{R}$  et  $l, m \in \mathbb{R}$ . On suppose que  $l = \lim_{x \rightarrow a, x > a} f(x)$  et  $m = \lim_{x \rightarrow a, x > a} g(x)$ .

1. Montrer que  $\lim_{x \rightarrow a, x > a} (f + g)(x) = l + m$ .
2. On suppose que  $m \neq 0$ . Montrer qu'il existe  $c \in ]a, b[$  tel que pour tout  $x \in ]a, c[$ ,  $g(x) \neq 0$ . Montrer que

$$\lim_{x \rightarrow a, x > a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l}{m}$$

3. On suppose que  $m = 0$ ,  $l > 0$  et que pour tout  $x \in I$ ,  $g(x) > 0$ . Montrer que  $\lim_{x \rightarrow a, x > a} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$ .
4. On prend ici  $a = 0$ ,  $b = 1$ ,  $f(x) = \sin(\frac{1}{x})$  et  $g(x) = x$ . Les applications  $fg$  et  $f/g$  (qui est bien définie sur  $I$ ) ont-elles une limite à droite en 0 ?

## Exercice 5 [Limite, limite à droite et limite à gauche] •

Soient  $a \in \mathbb{R}$  et  $l \in \mathbb{R}$ . Soit  $f$  une application définie sur  $A = \mathbb{R} \setminus \{a\}$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ .

1. Montrer que  $f$  admet  $l$  comme limite en  $a$  si et seulement si  $f$  admet (en  $a$ )  $l$  comme limite à droite et comme limite à gauche.
2. Reprendre la question 1 avec  $l = +\infty$  et avec  $l = -\infty$ .

## Exercice 6 [Caractérisation de la limite à gauche]

Soient  $a \in \mathbb{R}$  et  $l \in \mathbb{R}$ . Soit  $f$  une application définie sur  $A = \mathbb{R} \setminus \{a\}$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ .

1. Montrer que  $f$  admet  $l$  comme limite à gauche en  $a$  si et seulement si  $f$  vérifie la condition suivante :  
Pour toute suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de points de  $A$ ,

$$x_n \uparrow a, \text{ quand } n \rightarrow +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l,$$

où " $x_n \uparrow a$  quand  $n \rightarrow +\infty$ " signifie " $a = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$  et  $x_{n+1} \geq x_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ".

2. Reprendre la question 1 avec  $l = +\infty$  et avec  $l = -\infty$ .

## Exercice 7 [Limite en $+\infty$ ] •

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x) = \sin(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . La fonction  $f$  admet-elle une limite en  $+\infty$  ?

## Exercice 8 [Fonction périodique admettant une limite]

Soit  $f$  une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose qu'il existe  $T > 0$  tel que  $f(x + T) = f(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  (on dit alors que  $f$  est périodique de période  $T$ ). On suppose de plus que  $f$  admet une limite finie, notée  $l$ , en  $+\infty$ . Montrer que  $f$  est une fonction constante.

## Exercice 9 •

On définit  $f$  par  $f(x) = \frac{\sin(\sqrt{x^2})}{x}$  pour  $x \neq 0$  et  $f(0) = 1$ . L'application  $f$  a-t-elle une limite en 0 ? une limite à droite en 0 ? une limite à gauche en 0 ?

## Exercice 10 •

Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on note  $E(x) = \sup\{n \in \mathbb{Z}; n \leq x\}$ . On définit  $f$  par  $f(x) = x - \sqrt{x - E(x)}$  pour tout  $x \neq 0$ . Soit  $n \in \mathbb{Z}$ , L'application  $f$  a-t-elle une limite en  $n$  ? une limite à droite en  $n$  ? une limite à gauche en  $n$  ?

## Continuité en un point, prolongement par continuité

### Exercice 11 •

Soit  $f$  la fonction réelle à valeurs réelles définie par :

$$f(x) = x \text{ si } x < 1,$$

$$f(x) = x^2 \text{ si } 1 \leq x \leq 4, \text{ et}$$

$$f(x) = 8\sqrt{x} \text{ si } x > 4.$$

1. Tracer le graphe de  $f$ .
2.  $f$  est-elle continue ?
3. Montrer que  $f$  est bijective et donner la formule définissant  $f^{-1}$ .

### Exercice 12 •

Soit  $f : \mathbb{R} \setminus \{1/3\} \rightarrow \mathbb{R}$  telle que  $f(x) = \frac{2x+3}{3x-1}$ .

Pour tout  $\varepsilon > 0$  déterminer  $\alpha$  tel que,  $|x| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) + 3| \leq \varepsilon$ . Que peut-on en conclure sur  $f$  ?

### Exercice 13 •

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}_+^*$  par  $f(x) = \frac{1}{x}$  et soit  $a > 0$ . Montrer que pour tous réels  $x, y \in [a, +\infty[$ , on a  $|f(x) - f(y)| \leq \frac{|x-y|}{a^2}$ . En déduire que  $f$  est continue sur  $]a, +\infty[$ . Que peut-on dire de la continuité de  $f$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  ?

### Exercice 14

Soit  $a \in \mathbb{R}$  et  $\varepsilon > 0$ . Trouver  $\eta > 0$  tel que  $|x - a| < \eta \Rightarrow |\sin(x) - \sin(a)| < \varepsilon$ . Que peut-on en déduire sur la fonction sinus ?

### Exercice 15 •

Etudier la continuité sur  $\mathbb{R}$  des fonctions suivantes :

1.  $f(x) = \sin(x) \sin\left(\frac{1}{x}\right)$  si  $x \neq 0$  et  $f(0) = 0$  ;
2.  $g(x) = x \frac{1}{\sin(x)}$  si  $x$  n'est pas un multiple de  $\pi$  et  $g(x) = 0$  si  $x$  l'est ;
3.  $j(x) = xE(x)$  ;
4.  $k(x) = E(x) \sin(\pi x)$ .

### Exercice 16 [Fonction continue, non nulle en un point] •

Soit  $f$  une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est continue en  $a$  et que  $f(a) \neq 0$ . Montrer que  $f$  est non nulle sur un intervalle ouvert contenant  $a$ .

### Exercice 17 [Prolongement par continuité]

Pour  $x \in ]0, 1[$ , on pose  $f(x) = \frac{x}{\ln(x)}$ . Peut-on prolonger  $f$  par continuité en 0 et en 1 ?

### Exercice 18 [Prolongement par continuité] •

Soit  $f$  l'application de  $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$  dans  $\mathbb{R}$  définie par :

$$f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{1 - |x|}.$$

1. La fonction  $f$  est-elle continue en 0 ?
2. Calculer  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ .
3. Existe-t-il une fonction  $g$  définie et continue sur  $\mathbb{R}$  et qui est égale à  $f$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$  ?

Exercice 19 • Pour quelle valeur de  $\alpha$  la fonction  $f$ , définie ci-après, est-elle continue sur  $\mathbb{R}$  ?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-8}{x-2} & \text{si } x \neq 2 \\ \alpha & \text{si } x = 2. \end{cases}$$

## Continuité sur un intervalle - théorème des valeurs intermédiaires

Exercice 20 •

Soit  $f$  une application continue d'un intervalle  $I \subset \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ .

1. On suppose que  $f$  ne s'annule pas sur  $I$ . Montrer que  $f$  garde un signe constant sur  $I$ .
2. On suppose que  $f(x) \in \mathbb{Z}$ , pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . Montrer que  $f$  est constante.

Exercice 21 [Polynôme de degré impair] •

Montrer que toute fonction polynôme de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , de degré impair, s'annule en au moins un point.

Exercice 22 •

Montrer que le polynôme  $x^{30} + 14x^{17} - 7x^5 - 7$  admet au moins une racine dans l'intervalle  $]0, 1[$ .

Exercice 23

1. Soit  $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue telle que  $f(a) = f(b)$ . Montrer que la fonction  $g(t) = f(t + \frac{b-a}{2}) - f(t)$  s'annule en au moins un point de l'intervalle  $[a; \frac{a+b}{2}]$ .
2. *Application* : une personne parcourt 4 km en 1 heure. Montrer qu'il existe un intervalle de 30 minutes pendant lequel elle parcourt exactement 2 km.

Exercice 24 •

soit  $f$  l'application de  $[-1, \infty[$  dans  $\mathbb{R}$  définie par  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+2x+2}}$  pour tout  $x \geq -1$ . Montrer que  $f$  est bijective de  $[-1, \infty[$  dans  $]0, 1[$  et donner une formule explicite pour sa fonction réciproque.

Exercice 25 [Existence d'un maximum] •

Soit  $f$  une fonction continue de  $\mathbb{R}_+$  dans  $\mathbb{R}_+$ . On suppose que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ . Montrer que  $f$  admet un maximum (c'est-à-dire qu'il existe  $a \in \mathbb{R}_+$  t.q., pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $f(x) \leq f(a)$ ).

Exercice 26 •

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions de  $[0, 1]$  dans  $\mathbb{R}$ , continues et t.q.  $f(0) = g(1) = 0$  et  $g(0) = f(1) = 1$ . Montrer que :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}_+, \exists x \in [0, 1], f(x) = \lambda g(x).$$

Exercice 27 [Borne supérieure atteinte] •

Soit  $f$  une application continue de  $\mathbb{R}_+$  dans  $\mathbb{R}_+$ . On suppose que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ . Montrer que  $\{f(x), x \in \mathbb{R}_+\}$  est majoré et qu'il existe  $a \in \mathbb{R}_+$  tel que  $f(a) = \sup\{f(x), x \in \mathbb{R}_+\}$ .

## Suites récurrentes et continuité

Voir les exercices 45, 46, 48, 51, 52 de la planche 1 sur les suites.

## Exercices supplémentaires

### Exercice 28 [Fonction lipschitzienne]

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  et  $k \in \mathbb{R}_+$ . On suppose que  $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$  pour tout  $x, y \in \mathbb{R}$ . Montrer que  $f$  est continue (sur tout  $\mathbb{R}$ ).

**Exercice 29** On dit qu'une fonction  $f$  définie sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$  et à valeurs dans  $\mathbb{R}$  est uniformément continue sur  $I$  si

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, y \in I, (|x - y| < \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon)$$

1. Montrer que  $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}$ , pour tout  $x, y \in \mathbb{R}_+$ . En déduire que l'application  $x \mapsto \sqrt{x}$  est uniformément continue sur  $\mathbb{R}_+$ .
2. Montrer que si  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  est uniformément continue sur  $I$ , alors  $f$  est continue sur  $I$ .
3. Montrer que l'application  $x \mapsto \frac{1}{x}$  n'est pas uniformément continue sur  $]0, 1]$ .

### Exercice 30 [Fonctions monotones]

Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  et  $I = ]a, b[$ . Soit  $f$  une application strictement croissante de  $I$  dans  $\mathbb{R}$ . On pose  $A = \{f(x), x \in I\}$ ,  $\alpha = \inf A$  et  $\beta = \sup A$ . (Si  $A$  est non minorée, on pose  $\inf A = -\infty$ . Si  $A$  est non majorée, on pose  $\sup A = +\infty$ .)

1. Montrer que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$  (on pourra distinguer les cas  $\alpha \in \mathbb{R}$  et  $\alpha = -\infty$ ). Montrer que  $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \beta$ .
2. Soit  $c \in I$ . Montrer que  $f$  admet une limite à droite en  $c$ , notée  $f_d(c)$ , et une limite à gauche en  $c$ , notée  $f_g(c)$ . Montrer que  $f_g(c) \leq f(c) \leq f_d(c)$ .
3. On suppose que  $f_d(c) = f_g(c)$  pour tout  $c \in I$  (avec  $f_d$  et  $f_g$  définies à la question précédente). Montrer que  $f$  est continue et que  $f$  est bijective de  $]a, b[$  dans  $] \alpha, \beta [$ .

### Exercice 31 [Injectivité et continuité impliquent monotonie]

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ , et soit  $f : ]a, b[ \rightarrow \mathbb{R}$  continue et injective. Montrer que  $f$  est monotone. [Utiliser le théorème des valeurs intermédiaires.]

### Exercice 32 [Valeur intermédiaire]

Soit  $f$  une fonction continue de  $[0, 1]$  dans  $\mathbb{R}$ .

1. Montrer que pour tout  $t \in [0, 1]$ , l'ensemble  $\{s \in [0, 1] \text{ t.q. } f(s) = \frac{f(0)+f(t)}{2}\}$  est non vide.  
Pour  $t \in [0, 1]$ , on pose  $\varphi(t) = \inf\{s \in [0, 1] \text{ t.q. } f(s) = \frac{f(0)+f(t)}{2}\}$ .
2. Soit  $t \in [0, 1]$ , montrer que  $\varphi(t) \in [0, 1]$  et que  $f(\varphi(t)) = \frac{f(0)+f(t)}{2}$ .
3. Montrer que si  $f$  est strictement croissante, l'application  $\varphi$  ainsi définie de  $[0, 1]$  dans  $[0, 1]$  est continue.
4. Donner un exemple de fonction  $f$  pour lequel la fonction  $\varphi$  n'est pas continue.

### Exercice 33 [Continuité de "max" et "min"]

1. Montrer que, pour tout  $x, y \in \mathbb{R}$ ,  $\max\{x, y\} = \frac{1}{2}(x + y + |x - y|)$  et  $\min\{x, y\} = \frac{1}{2}(x + y - |x - y|)$ .
2. Soit  $f$  et  $g$  deux applications de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On définit les applications  $f \top g$  et  $f \perp g$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  par :

$$(f \top g)(x) = \max\{f(x), g(x)\}, (f \perp g)(x) = \min\{f(x), g(x)\}, \text{ pour } x \in \mathbb{R}.$$

Soit  $a \in \mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  et  $g$  sont continues en  $a$ . Montrer que  $f \top g$  et  $f \perp g$  sont continues en  $a$ .

### Exercice 34 [Convexe implique continue]

Soit  $f$  une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est convexe, c'est à dire que  $f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$  pour tout  $t \in [0, 1]$  et pour tout  $x, y \in \mathbb{R}$ .

On pose  $\alpha = f(1) - f(0)$ ,  $\beta = f(0) - f(-1)$  et  $\gamma = \max\{|\alpha|, |\beta|\}$ .

1. Soit  $x \in ]0, 1[$ . Montrer que  $\beta x \leq f(x) - f(0) \leq \alpha x$ . [Utiliser le fait que  $x = t1 + (1-t)0$ , avec  $t = x$ , et  $0 = tx + (1-t)(-1)$ , avec  $t = \frac{1}{1+x}$ .]
2. Soit  $x \in ]-1, 1[$ . Montrer que  $|f(x) - f(0)| \leq \gamma|x|$ . En déduire que  $f$  est continue en 0.
3. Montrer que  $f$  est continue en tout point de  $\mathbb{R}$ .

### Exercice 35 [Exercice sur les valeurs intermédiaires]

Soit  $f$  une application continue de  $[0, 1]$  dans  $\mathbb{R}$  t.q.  $f(0) = f(1)$ . Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . pour  $x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$ , on pose  $g(x) = f(x + \frac{1}{n}) - f(x)$ .

1. Montrer que  $\sum_{k=0}^{n-1} g(\frac{k}{n}) = 0$ .
2. Montrer qu'il existe  $x_0, x_1 \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$  t.q.  $g(x_0) \leq 0$  et  $g(x_1) \geq 0$ .
3. Montrer qu'il existe  $x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$  t.q.  $f(x + \frac{1}{n}) = f(x)$ .

### Exercice 36 [Point fixe]

Soit  $f$  une fonction continue de  $[0, 1]$  dans  $[0, 1]$  et vérifiant

$$\forall x_1, x_2 \in [0, 1], |x_1 - x_2| \leq |f(x_1) - f(x_2)|.$$

1. Montrer que  $f$  est injective.
2. Montrer que  $\{f(0), f(1)\} = \{0, 1\}$ .
3. Montrer que  $f$  est surjective.
4. Montrer que  $f$  admet un point fixe.

### Exercice 37 [Equation fonctionnelle]

Soit  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}_+$ , à valeurs dans  $\mathbb{R}$  et vérifiant l'équation fonctionnelle suivante :

$$\text{Pour tout } x, y \in \mathbb{R}_+, f(x+y) = f(x)f(y).$$

1. Montrer que  $f$  est à valeurs positives ou nulles.
2. Montrer que si  $f(0) = 0$  alors  $f$  est identiquement nulle.

*Dans ce qui suit on suppose que  $f$  n'est pas identiquement nulle.*

3. Calculer  $f(0)$ .
4. Soit  $x \in \mathbb{R}_+$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ , exprimer  $f(nx)$  et  $f(\frac{x}{n})$  en fonction de  $f(x)$  et  $n$ .
5. Soit  $x \in \mathbb{R}_+$  et  $p, q$  deux entiers naturels strictement positifs. On pose  $r = \frac{p}{q}$ , En calculant  $f(q(rx))$  de deux manières différentes, exprimer  $f(rx)$  en fonction de  $f(x)$  et  $r$ .
6. *Dans cette question on suppose qu'il existe  $\alpha > 0$  tel que  $f(\alpha) = 0$ .*
  - (a) Construire une suite  $(x_n)$  de réels strictement positifs convergeant vers 0 et telle que  $f(x_n) = 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
  - (b) Montrer que la fonction  $f$  est nulle sur  $\mathbb{R}^{+*}$ .

*Dans ce qui suit on suppose que  $f$  est à valeurs strictement positives.*

7. On suppose dans cette question que  $f$  est continue à droite sur  $\mathbb{R}_+$ . Montrer qu'il existe un réel  $a$  tel que  $f(x) = e^{ax}$  pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ .
8. On suppose que  $f$  est continue à droite en 0, montrer que  $f$  est continue à droite en tout point de  $\mathbb{R}_+$  et conclure qu'il existe un réel  $a$  tel que  $f(x) = e^{ax}$  pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ .

9. On suppose qu'il existe deux réels  $A, B$  vérifiant  $0 \leq A < B$  tels que  $f$  soit majorée sur  $[A, B]$ .

(a) Montrer que sur  $[0, B - A]$ ,  $f$  est minorée de borne inférieure strictement positive.

(b) Montrer que  $f$  est continue à droite de 0.

(c) Montrer qu'il existe un réel  $a$  tel que  $f(x) = e^{ax}$  pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ .

### Exercice 38 [Croissance et continuité]

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$  et soit  $f$  une fonction croissante de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$ . Montrer que  $f$  est continue si et seulement si l'image  $f(]a, b[)$  est un intervalle.

### Exercice 39 [Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI)]

Soit  $f$  une fonction continue de  $[0, 1]$  dans  $[0, 1]$ .

1. Montrer qu'il existe  $x_2 \in [0, 1]$  tel que  $f(x_2) = (x_2)^2$ . [On pourra considérer la fonction  $g(x) = f(x) - x^2$ .]

2. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Montrer qu'il existe  $x_n \in [0, 1]$  tel que  $f(x_n) = (x_n)^n$ .

3. On suppose maintenant que  $f$  est strictement décroissante. Pour  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $x \in [0, 1]$ , on pose  $h_n(x) = f(x) - x^n$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Montrer que  $h_n$  est strictement décroissante sur  $[0, 1]$  et qu'il existe un unique  $x_n \in [0, 1]$  tel que  $f(x_n) = (x_n)^n$ .

Montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $h_{n+1}(x_n) > 0$ . En déduire  $x_{n+1} > x_n$ .

Montrer que la suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est convergente et que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$ . Quelle est la limite de  $(x_n)^n$  quand  $n \rightarrow +\infty$  ?

### Exercice 40 [Valeur intermédiaire]

Soit  $\alpha > 0, \beta > 0$ .

Soit  $f$  une fonction continue de  $[0, \alpha[$  dans  $\mathbb{R}$ , t.q.  $f(0) < 0$  et  $\lim_{x \rightarrow \alpha, x < \alpha} f(x) = +\infty$ .

Soit  $g$  une fonction continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , t.q.  $g(0) < 0$  et  $g(\beta) > 0$ .

Montrer qu'il existe  $x \in ]0, \min(\alpha, \beta)[$  t.q.  $f(x)(x - \beta) - g(x) = 0$ . [On pourra distinguer les cas  $\beta < \alpha$ ,  $\beta > \alpha$  et  $\beta = \alpha$ .]