USTL

Université des Sciences et Technologies de Lille

Math208 — Initiation à la modélisation mathématique
Licence Sciences — Examen de janvier 2007
Durée: 2 heures — Documents et calculatrices non autorisés

Exercice 1:

a) Exprimer la transformée discrète de Fourier d'ordre n avec $n = 3$. On donnera cette transformation explicitement sous la forme $(y_0, y_1, y_2) \rightarrow (c_0, c_1, c_2)$.

b) Cette transformée de Fourier est issue d'une formule d'interpolation d'une fonction f T -périodique aux points (x_0, y_0) , (x_1, y_1) et (x_2, y_2) , avec

$$y_k = f(x_k) \quad \text{et} \quad x_k = \frac{k}{n}T$$

Préciser l'expression de la fonction d'interpolation F qui passe par ces points.

c) Les formules donnant (y_k) et (c_k) peuvent s'étendre sur $\mathbb{Z}$. Justifier que ces deux suites sont périodiques de périodes n et que F interpole f en $(x_k)_{k \in \mathbb{Z}}$.

d) En utilisant $(y_{-1}, y_0, y_1) \rightarrow (c_{-1}, c_0, c_1)$. Justifier et donner l'expression d'une autre fonction d'interpolation qui passe par les points (x_{-1}, y_{-1}) , (x_0, y_0) et (x_1, y_1) .

Application:

Soit f la fonction telle que

$$f(x) = \frac{2x}{\pi} \text{ si } x \in [0, \pi/2]$$

$$f(x) = -\frac{2x}{\pi} + 2 \text{ si } x \in [\pi/2, \pi]$$

et telle que f soit impaire et périodique de période 2π

e) Donner la représentation graphique de f

f) Donner la transformée de Fourier d'ordre n (pour $n = 1$ et 2) de f

g) Exprimer la transformée de Fourier de f d'ordre 3.

h) En utilisant d), donner une fonction d'interpolation à valeurs dans $\mathbb{R}$ qui passe par les points $(x_k, y_k)_{k \in \mathbb{Z}}$

Exercice 2

On donne le programme Scilab suivant:

```
clear
duree=6.28;
h=0.01;
n=duree/h;
```

```

x(1)=1.;
y(1)=0.;
xp(1)=0.;
yp(1)=1.;

for i=1:n
x(i+1) = x(i) + h * xp(i);
y(i+1) = y(i) + h * yp(i);
xp(i+1) = xp(i) - h * x(i)/(x(i)**2+y(i)**2)**(3/2);
yp(i+1) = yp(i) - h * y(i)/(x(i)**2+y(i)**2)**(3/2);
end

plot2d(x,y,rect=[ -1.1 , -1.1, 1.1 , 1.1 ],frameflag= 3)
xtitle('courbe (x,y)', 'x', 'y')

```

Ce code est la résolution numérique d'une équation différentielle par la méthode d'Euler.

- Donner son expression sous la forme d'une équation différentielle d'ordre 1. Préciser aussi ses conditions initiales
- En fait, cette équation est issue d'une équation différentielle d'ordre 2. Donner son expression. Préciser encore ses conditions initiales (position et vitesse initiales)
- On donne dans la figure ci-dessus, le résultat de 2 exécutions consécutives de ce programme. La première avec $h = 0,01$ et la deuxième avec $h = 0,001$. Commenter cette figure.
- Quelles instructions est-il nécessaire d'ajouter au programme ci-dessus pour prendre en compte un second membre de la forme $\cos 3t$?

Exercice 3

On considère le système masses-ressorts suivant : deux particules libres z_1 et z_2 de même masse $m = 1$, deux particules fixes z_0 et z_3 aux positions $(0, 0)$ et $(0, 20)$ (en coordonnées cartésiennes, dans le repère direct (O, x, y) habituel), deux ressorts de raideur 1 entre les couples de particules

(z_0, z_1) et (z_2, z_3) , un ressort de raideur 2 entre le couple de particules (z_1, z_2) . On suppose également que les 2 particules z_1 et z_2 ont un poids égal à 5 (c'est à dire que, pour simplifier, le vecteur gravitation $\vec{g}$ a un module égal à 5 dans cet exercice) que l'on prendra en compte dans l'étude.

- Représenter par un dessin le système étudié. On fera apparaître les forces exercées sur les particules libres.
- Donner les équations du mouvement des particules libres, ainsi que la matrice de raideur K .
- Diagonaliser K . On écrira K comme un produit de 3 matrices, en utilisant un changement de base orthogonal.
- Décrire les modes propres (dans la direction verticale).
- Donner les solutions de l'équation homogène, puis la solution à l'équilibre.
- On se donne les conditions initiales suivantes à $t = 0$:

$$z_1(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad z_2(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \dot{z}_1(0) = \dot{z}_2(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Donner la solution complète, en coordonnées cartésiennes, décrivant le mouvement des deux particules libres.

Exercice 4

- On considère le système de deux ressorts en parallèle comme sur la figure de gauche ci-dessous, les deux ressorts étant respectivement de raideurs k_1 et k_2 . On souhaite remplacer ce système par un ressort unique. Quelle devrait être sa raideur ? Expliquer.
- On considère le système de deux ressorts en série comme sur la figure à droite ci-dessous, avec une particule intermédiaire sans poids, les deux ressorts étant toujours de raideurs k_1 et k_2 . On souhaite à nouveau remplacer ce système par un ressort unique. Quelle devrait être sa raideur ? Expliquer.