Exercice 1.

$$\begin{cases} x + y + mz = 1 \\ x + my + z = 1 \\ mx + y + z = 1 \end{cases} \xLeftrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 - L_1, L_3 \leftarrow L_3 - mL_1] \begin{cases} x + y + mz = 1 \\ (m-1)y + (1-m)z = 0 \\ (1-m)y + (1-m^2)z = 1-m \end{cases} \\ \xLeftrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 + L_1] \begin{cases} x + y + mz = 1 \\ (m-1)y + (1-m)z = 0 \\ (2-m-m^2)z = 1-m \end{cases}$$

Le système est réduit.

Déterminons les racines réelles du trinôme $2 - m - m^2$.

Son discriminant est $\Delta = 1 + 8 = 9 = 3^2 > 0$ et ses deux racines réelles sont 1 et -2 . Ainsi on a la factorisation :

$$2 - m - m^2 = (1 - m)(m + 2)$$

On distingue maintenant plusieurs cas selon que m soit racine de $m - 1$, de $2 - m - m^2$ ou pas.

• *Premier cas.* Si $m = -2$; le système devient le système trapézoïdal :

$$\begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ -3y + 3z = 0 \\ 0 = 3 \end{cases} \quad \text{il est incompatible}$$

Dans ce cas il n'y aucune solution : $\mathcal{S}_{-2} = \emptyset$.

• *Deuxième cas.* Si $m = 1$; le système devient le système trapézoïdal :

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad \text{il est compatible}$$

Dans ce cas il y a une infinité de solutions, et l'ensemble des solutions est :

$$\mathcal{S}_1 = \{(1 - y - z, y, z) \mid (y, z) \in \mathbb{R}^2\}$$

• *Troisième cas.* Si $m \notin \{1, -2\}$. Le système devient triangulaire :

$$\begin{cases} x + y + mz = 1 \\ (m-1)y + (1-m)z = 0 \\ (1-m)(m+2)z = 1-m \end{cases} \xLeftrightarrow[L_3 \leftarrow \frac{1}{(1-m)(m+2)} L_3] \begin{cases} x + y + mz = 1 \\ (m-1)y + (1-m)z = 0 \\ z = \frac{1}{m+2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + mz = 1 \\ y = \frac{1}{m+2} \\ z = \frac{1}{m+2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 - \frac{1}{m+2} - \frac{m}{m+2} = \frac{1}{m+2} \\ y = \frac{1}{m+2} \\ z = \frac{1}{m+2} \end{cases}$$

Ainsi il y a une unique solution et :

$$\mathcal{S}_m = \left\{ \left(\frac{1}{m+2}, \frac{1}{m+2}, \frac{1}{m+2} \right) \right\}$$

En conclusion :

• Si $m = -2$:

$$\mathcal{S}_{-2} = \emptyset$$

• Si $m = 1$:

$$\mathcal{S}_1 = \{(1 - y - z, y, z) \mid (y, z) \in \mathbb{R}^2\}$$

• Dans tous les autres cas :

$$\mathcal{S}_m = \left\{ \left(\frac{1}{m+2}, \frac{1}{m+2}, \frac{1}{m+2} \right) \right\}$$

Exercice 2.

1. Le trinôme u a pour discriminant $\Delta = 4 - 4 \times 2 = -4$ donc il garde un signe constant sur $\mathbb{R}$. Plus précisément, u est strictement positif sur $\mathbb{R}$ car le coefficient de x^2 est strictement positif.

$$(x+1) \left(\frac{1}{x^2 + 2x + 2} + 3^{(x^2+2x+2)} \right) = \frac{x+1}{x^2 + 2x + 2} + (x+1) e^{\ln(3)(x^2+2x+2)}$$

Cette décomposition montre que

$$\text{la fonction } x \mapsto (x+1) \left(\frac{1}{x^2 + 2x + 2} + 3^{(x^2+2x+2)} \right) \text{ est définie sur } \mathbb{R}.$$

$u'(x) = 2x + 2 = 2(x+1)$ donc

$$(x+1) \left(\frac{1}{x^2 + 2x + 2} + 3^{(x^2+2x+2)} \right) = \frac{1}{2} \times \frac{2(x+1)}{x^2 + 2x + 2} + \frac{1}{2 \ln 3} 2 \ln 3 (x+1) e^{\ln(3)(x^2+2x+2)}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{u'(x)}{u(x)} + \frac{1}{2 \ln 3} v'(x) e^{v(x)}$$

avec $v(x) = \ln(3) u(x)$

$\frac{u'}{u}$ se primitive en $\ln(|u|) = \ln u$ car u ne prend que des valeurs strictement positives.

$v' e^v$ se primitive en $e^v = 3^u$

Sur $\mathbb{R}$, $x \mapsto (x+1) \left(\frac{1}{x^2+2x+2} + 3^{(x^2+2x+2)} \right)$ a pour primitive

$$x \mapsto \frac{1}{2} \ln(x^2+2x+2) + \frac{1}{2 \ln 3} 3^{(x^2+2x+2)}.$$

2. (a) $x \in \mathcal{D}_f \iff \begin{cases} 3x-1 \geq 0 \\ 1-2x > 0 \\ 4-x \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq \frac{1}{3} \\ x < \frac{1}{2} \\ x \neq 4 \end{cases} \iff \begin{cases} x \in [\frac{1}{3}, \frac{1}{2}[\\ x \neq 4 \end{cases}$

$\iff x \in [\frac{1}{3}, \frac{1}{2}[$ car $4 \notin [\frac{1}{3}, \frac{1}{2}[$.

$\mathcal{D}_f = \left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right[$

(b) Les fonctions puissances sont continues sur leur ensemble de définition respectif.

Chacune des quatre fonctions affines $x \mapsto 3x-1$, $x \mapsto 1-2x$, $x \mapsto 4-x$ et $x \mapsto x+1$ est continue sur $[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}[$. Par ailleurs, la première est positive sur $[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}[$, la deuxième est strictement positive et la troisième ne s'annule pas donc, par composition et somme, la fonction f est continue sur $\mathcal{D}_f$.

On en déduit que f admet une primitive sur $[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}[$.

$$f(x) = (3x-1)^{\frac{1}{2}} + (1-2x)^{-\frac{1}{2}} + (4-x)^{-3} + (x+1)^5$$

$$= \frac{1}{3} u_1'(x) (u_1(x))^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} u_2'(x) (u_2(x))^{-\frac{1}{2}} - u_3'(x) (u_3(x))^{-3} + u_4'(x) (u_4(x))^5$$

avec $u_1(x) = 3x-1$, $u_2(x) = 1-2x$, $u_3(x) = 4-x$ et $u_4(x) = x+1$.

Sur $[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}[$, f admet comme primitive $x \mapsto \frac{1}{3} \frac{(u_1(x))^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} \frac{(u_2(x))^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} - \frac{(u_3(x))^{-2}}{-2} + \frac{(u_4(x))^6}{6}$.

Sachant que $x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$ et $x^{\frac{3}{2}} = x\sqrt{x}$, on en déduit après simplifications que

Sur $[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}[$, f admet comme primitive :

$$x \mapsto \frac{2}{9} (3x-1) \sqrt{3x-1} - \sqrt{1-2x} + \frac{1}{2(4-x)^2} + \frac{(x+1)^6}{6}.$$

3. (a) $x \in \mathcal{D}_g \iff \begin{cases} x \in \mathcal{D}_{\tan} \\ \tan x > 0 \end{cases}$

On sait que $\mathcal{D}_{\tan}$ est la réunion de tous les intervalles $]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$ lorsque k parcourt $\mathbb{Z}$.

On sait également que $\tan$ est périodique de période π donc pour connaître son signe il suffit de connaître son signe sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Si $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ alors $\tan x > 0 \iff x \in]0, \frac{\pi}{2}[$.

Par π -périodicité de $\tan$, on obtient : $\tan x > 0 \iff x \in]k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$ pour un certain $k \in \mathbb{Z}$.

$$\mathcal{D}_g = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}}]k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$$

(b) On remarque que $]0, \frac{\pi}{2}[\subset \mathcal{D}_g$. La fonction g est continue sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ par composition et produit donc g admet sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ une primitive.

On pose $u(x) = \cos(2x)$ et $V(x) = \ln(\tan x)$. On a $g = uV$.

Par composition, la fonction V est dérivable sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ et admet pour dérivée la fonction $v : x \mapsto \frac{\tan' x}{\tan x} = \frac{1}{\cos^2 x \tan x} = \frac{1}{\cos^2 x \frac{\sin x}{\cos x}} = \frac{1}{\cos x \sin x} = \frac{1}{\frac{1}{2} \sin(2x)} = \frac{2}{\sin(2x)}$.

La fonction u peut s'écrire $u(x) = \frac{1}{2} h'(x) \cos(h(x))$ avec $h(x) = 2x$ donc u admet comme primitive sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ la fonction $U : x \mapsto \frac{1}{2} \sin(h(x)) = \frac{1}{2} \sin(2x)$.

$U(x)v(x) = \frac{1}{2} \frac{\sin(2x)}{\frac{2}{\sin(2x)}} = 1$ donc la fonction Uv a pour primitive $H : x \mapsto x$.

En primitivant par parties, on peut affirmer que $UV - H$ est une primitive de g .

Sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, la fonction g admet comme primitive :

$$x \mapsto \frac{1}{2} \sin(2x) \ln(\tan x) - x.$$

4. $\varphi(x) = e^{2x} e^x \cos(e^x) = f(x)G(x)$ avec $f(x) = e^x \cos(e^x)$ et $G(x) = e^{2x}$.

La fonction f est de la forme $u' \cos(u)$ avec $u(x) = e^x$ donc elle admet comme primitive la fonction $F : x \mapsto \sin(e^x)$.

La fonction G est dérivable et elle admet comme dérivée la fonction $g : x \mapsto 2e^{2x}$.

En primitivant par parties on peut dire que φ admet comme primitive la fonction $FG - H$ où H est une primitive de Fg .

Déterminons H à l'aide d'une nouvelle PPP.

$F(x)g(x) = 2e^x e^x \sin(e^x) = f_1(x)G_1(x)$ avec $f_1(x) = e^x \sin(e^x)$ et $G_1(x) = 2e^x$.

La fonction f_1 est de la forme $u' \sin(u)$ avec $u(x) = e^x$ donc elle admet comme primitive la fonction $F_1 : x \mapsto -\cos(e^x)$.

La fonction G_1 est dérivable et elle admet comme dérivée la fonction $g_1 : x \mapsto 2e^x$.

La fonction $F_1g_1 : x \mapsto -2e^x \cos(e^x)$ est de la forme $-2u' \cos(u)$ avec $u(x) = e^x$ donc elle admet comme primitive la fonction $H_1 : x \mapsto -2 \sin(e^x)$.

En primitivant par parties on peut dire que $H = F_1G_1 - H_1$.

Par report, φ admet comme primitive $FG - F_1G_1 + H_1$.

Sur $\mathbb{R}$, φ admet comme primitive la fonction :
 $x \mapsto e^{2x} \sin(e^x) + 2e^x \cos(e^x) - 2 \sin(e^x)$.

Exercice 3.

1. (a) L'équation homogène associée $y' + y = 0$ a pour solutions toutes les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda e^{-x}$ avec λ un paramètre réel.

Cherchons une solution particulière sous la forme $y_p(x) = \lambda(x)e^{-x}$; cela revient à :

$$\lambda(x) = \int \cos(x)e^x dx$$

Calculons à l'aide de 2 primitivations par partie une primitive $I =$

$\int \cos(x)e^x dx :$

$$\begin{aligned} I &= \underbrace{\int \cos(x)e^x dx}_{u=\cos x \quad v'=e^x} \\ &= \cos(x)e^x + \underbrace{\int \sin(x)e^x dx}_{u=\sin x \quad v'=e^x} \\ &= \cos(x)e^x + \sin(x)e^x - \underbrace{\int \cos(x)e^x dx}_{=I} \end{aligned}$$

$$\implies 2I = \cos(x)e^x + \sin(x)e^x$$

$$\implies I = \frac{1}{2} (\cos(x) + \sin(x)) e^x$$

D'où la solution particulière : $\boxed{y_p(x) = \frac{1}{2} (\cos(x) + \sin(x))}$.

- (b) Les solutions de l'équation homogène associée $y' + y = 0$ sont les fonctions $x \mapsto \lambda e^{-x}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

D'après la question précédente, les solutions de (E) sont :

$$\mathcal{S}_E = \left\{ x \mapsto \frac{1}{2} (\cos(x) + \sin(x)) + \lambda e^{-x} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$

- (c) Soit y_1 et y_2 deux solutions distinctes de (E). Notons $y_1(x) = \frac{1}{2} (\cos(x) + \sin(x)) + \lambda_1 e^{-x}$ et $y_2(x) = \frac{1}{2} (\cos(x) + \sin(x)) + \lambda_2 e^{-x}$ avec $\lambda_1 \neq \lambda_2$.

Or :

$$\begin{aligned} y_1(x_0) &= y_2(x_0) \\ \implies \frac{1}{2} (\cos(x_0) + \sin(x_0)) + \lambda_1 e^{-x_0} &= \frac{1}{2} (\cos(x_0) + \sin(x_0)) + \lambda_2 e^{-x_0} \\ \implies \lambda_1 e^{-x_0} &= \lambda_2 e^{-x_0} \\ \implies \lambda_1 &= \lambda_2 \end{aligned}$$

ce qui est contradictoire. Ainsi, deux solutions distinctes de (E) ne peuvent pas avoir des courbes qui se coupent.

- (d) Puisque s'il existe une solution de (E) vérifiant $y(0) = y_0$, d'après la question précédente cette solution est unique, il suffit de montrer que pour tout $y_0 \in \mathbb{R}$ il existe une solution de (E) vérifiant $y(0) = y_0$.

Soit y_0 un réel quelconque. Une solution de (E) est de la forme $y(x) = \frac{1}{2}(\cos(x) + \sin(x)) + \lambda e^{-x}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$y(0) = \frac{1}{2} + \lambda e^0 = y_0 \iff \lambda = y_0 - \frac{1}{2}$$

Ainsi pour tout $y_0 \in \mathbb{R}$, $y(x) = \frac{1}{2}(\cos(x) + \sin(x)) + (y_0 - \frac{1}{2})e^{-x}$ est l'unique solution de (E) vérifiant $y(0) = y_0$.

- (e) En particulier, pour $y_0 = \frac{1}{2}$, l'unique solution f de (E) vérifiant $f(0) = y_0$ est : $f : x \mapsto \frac{1}{2}(\cos(x) + \sin(x))$.

- (f) Simplifions $f(x)$:

$$f(x) = \frac{1}{2}(\cos(x) + \sin(x)) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos(x) + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(x) \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$$

- (g) D'où le tableau de variation et le tracé de f sur $[-\pi, \pi]$:

x	$-\pi$	$-\frac{3\pi}{4}$	$\frac{\pi}{4}$	$+\pi$
f	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$

- (h) Tracé sur $[-\pi, \pi]$:

2. (a) On cherche une solution particulière sous la forme $y_{1p}(x) = a \cos x + b \sin x$ (i n'étant pas solution de l'équation caractéristique $r^2 + 4 = 0$). On a alors $y'_{1p}(x) = -a \sin(x) + b \cos(x)$ et $y''_{1p}(x) = -a \cos(x) - b \sin(x)$. Ainsi : y_{1p} est solution de $y'' + 4y = 3 \sin(x) \iff 3a \cos(x) + 3b \sin(x) = 3 \sin(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. En choisissant $a = 0$ et $b = 1$, $y_{1p}(x) = \sin x$ est solution particulière de (E₁).

$y_{1p} : x \mapsto \sin(x)$ est une solution particulière de $y'' + 4y = 3 \sin(x)$.

- (b) On cherche une solution particulière sous la forme $y_{2p}(x) = ax \cos(2x) + bx \sin(2x)$ (puisque $2i$ est solution de l'équation caractéristique). On a alors :

$$y'_{2p}(x) = a \cos 2x - 2ax \sin 2x + b \sin 2x + 2bx \cos 2x$$

$$y''_{2p}(x) = -4a \sin 2x + 4b \cos 2x - 4ax \cos 2x - 4bx \sin 2x$$

Ainsi y_{2p} est solution de $y'' + 4y = \cos 2x$ si et seulement si pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$-4a \sin 2x + 4b \cos 2x = \cos 2x$$

il suffit de poser $a = 0$ et $b = \frac{1}{4}$.

$y_{2p} : x \mapsto \frac{1}{4}x \sin(2x)$ est une solution particulière de $y'' + 4y = \cos(2)x$.

D'après le principe de superposition,

$y_p = y_{1p} + y_{2p} : x \mapsto \sin(x) + \frac{1}{4}x \sin(2x)$ est une solution particulière de (E).

- (c) L'équation homogène associée $y'' + 4y = 0$ a pour équation caractéristique $x^2 + 4 = 0 \iff x^2 - (2i)^2 = 0 \iff (x - 2i)(x + 2i) = 0 \iff x = 2i$ ou $x = -2i$.

Les solutions de $y'' + 4y = 0$ sont les fonctions $x \mapsto \lambda \cos(2)x + \mu \sin(2)x$ avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. Ainsi :

y est une solution de (E) $\iff \exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ tel que $y(x) =$

$$y_p(x) + \lambda \cos(2)x + \mu \sin(2)x$$

D'après la question b),

Les solutions de (E) sont les fonctions

$$y : x \mapsto \sin(x) + \frac{1}{4}x \sin(2x) + \lambda \cos(2x) + \mu \sin(2x) \text{ où } (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

(d) Soit y une solution de (E); il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$y(x) = \sin x + \frac{1}{4}x \sin 2x + \lambda \cos 2x + \mu \sin 2x$$

y est dérivable et

$$y'(x) = \cos x + \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{2}x \cos 2x - 2\lambda \sin 2x + 2\mu \cos 2x$$

Ainsi $y(0) = y'(0) = 1$ si et seulement si :

$$\begin{cases} \lambda = 1 \\ 1 + 2\mu = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda = 1 \\ \mu = 0 \end{cases}$$

Ainsi l'unique solution y de (E) vérifiant $y(0) = y'(0) = 1$ est :

$$y : x \mapsto \sin x + \frac{1}{4}x \sin 2x + \cos 2x$$

Exercice 4.

1. (a) Notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : il existe u_n tel que $A^n = \begin{pmatrix} 2^n & u_n & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Démontrons par récurrence que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation.

Sachant que $A^0 = I_3$ et que $2^0 = 1$, l'égalité a bien lieu au rang 0 en posant $u_0 = 0$ d'où $\mathcal{P}(0)$.

Hérédité.

Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que $\mathcal{P}(n)$ est vraie (HR).

$$A^{n+1} = A^n A \stackrel{\text{HR}}{=} \begin{pmatrix} 2^n & u_n & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} & 2^n + u_n & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} & u_{n+1} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ en posant } u_{n+1} = 2^n + u_n \text{ d'où } \mathcal{P}(n+1).$$

Conclusion.

La propriété est vraie au rang 0 et héréditaire à partir du rang 0 donc elle est vraie pour tout entier naturel n .

(b) On sait que $A^{n+1} = A^n A$ et $A^{n+1} = AA^n$ donc $A^n A = AA^n$ (autrement dit A et A^n commutent).

Effectuons ces deux produits matriciels.

$$\text{D'après la question précédente } A^n A = \begin{pmatrix} 2^{n+1} & 2^n + u_n & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$AA^n = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & u_n & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} & 2u_n + 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

En identifiant les coefficients de ces deux matrices produit à la première ligne et à la deuxième colonne, on trouve $2^n + u_n = 2u_n + 1$ d'où $u_n = 2^n - 1$.

(c) En reportant la valeur de u_n trouvée à la question précédente, on obtient :

$$A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 2^n - 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. (a) Par le calcul on trouve $U^2 = U$.

Démontrons que $\forall k \in \mathbb{N}^*, U^k = U$.

La propriété est vraie au rang 1.

Soit $k \in \mathbb{N}^*$, supposons que $U^k = U$ (HR).

$U^{k+1} = U^k U = U U = U^2 = U$ d'où la propriété au rang $k+1$.

On en déduit que $U^k = U$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

(b) I_3 et U commutent donc par la formule du binôme de Newton, $(I_3 + U)^n =$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} I_3^{n-k} U^k$$

(c) $(I_3 + U)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} U^k = I_3 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} U^k = I_3 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} U$
 $= I_3 + \left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \right) U = I_3 + \left(-1 + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \right) U = I_3 + (-1 + 2^n) U$

$$(I_3 + U)^n = I_3 + (2^n - 1) U$$

(d) Sachant que $A = I_3 + U$, on retrouve, après calcul,

$$A^n = (I_3 + U)^n = \begin{pmatrix} 2^n & 2^n - 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$3. (a) A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } A - I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{On trouve } (A - 2I_3)(A - I_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{(A - 2I_3)(A - I_3) = O_3}$$

$$(b) O_3 = (A - 2I_3)(A - I_3) = A^2 - 2I_3A - AI_3 + 2I_3^2 = A^2 - 3A + 2I_3 \text{ d'où}$$

$$\boxed{A^2 = 3A - 2I_3}$$

(c) Démontrons cette propriété par récurrence pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation.

$A^0 = I_3$ et $a_0A + b_0I_3 = I_3$ en posant $a_0 = 0$ et $b_0 = 1$ donc la propriété est vérifiée au rang 0.

Hérédité.

Supposons qu'il existe deux réels a_n et b_n tels que $A^n = a_nA + b_nI_3$. (HR)

$$A^{n+1} = AA^n \stackrel{\text{HR}}{=} A(a_nA + b_nI_3) = a_nA^2 + b_nAI_3 \stackrel{2.(b)}{=} a_n(3A - 2I_3) + b_nA = (3a_n + b_n)A - 2a_nI_3.$$

On peut écrire $A^{n+1} = a_{n+1}A + b_{n+1}I_3$ avec $a_{n+1} = 3a_n + b_n$ et $b_{n+1} = -2a_n$ d'où la propriété au rang $n + 1$.

Conclusion.

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \exists (a_n, b_n) \in \mathbb{R}^2, A^n = a_nA + b_nI_3}.$$

(d) D'après la question précédente, on a les relations $a_{n+1} = 3a_n + b_n$ et $b_{n+1} = -2a_n$. Remplaçons n par $n + 1$ dans la première relation :

$$a_{n+2} = 3a_{n+1} + b_{n+1}. \text{ Avec la deuxième relation on obtient alors}$$

$$\boxed{a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n}.$$

(e) (a_n) est une SRL2 d'équation caractéristique $x^2 - 3x + 2 = 0$. $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 = 1 = 1^2$, $x_1 = \frac{3-1}{2} = 1$ et $x_2 = \frac{3+1}{2} = 2$. Il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ tels que $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n = \lambda 1^n + \mu 2^n = \lambda + \mu 2^n$.

$$\begin{cases} \lambda + \mu 2^0 = a_0 = 0 \\ \lambda + \mu 2^1 = a_1 = 3a_0 + b_0 = 3 \times 0 + 1 = 1 \end{cases}$$

On reporte $\mu = -\lambda$ dans la deuxième équation : $-\lambda = 1$ donc $\lambda = -1$. On a alors $\mu = 1$ et $\boxed{a_n = 2^n - 1}$.

Si $n \geq 0$, $b_{n+1} = -2a_n$ donc si $n \geq 1$, $b_n = -2a_{n-1} = -2(2^{n-1} - 1) = -2^n + 2$.

On a $\boxed{b_n = 2 - 2^n}$ y compris pour $n = 0$.

$$\begin{aligned} A^n &= (2^n - 1)A + (2 - 2^n)I_3 \\ &= \begin{pmatrix} 2 \times 2^n - 2 & 2^n - 1 & 0 \\ 0 & 2^n - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^n - 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 - 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 2 - 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 2 - 2^n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2^n & 2^n - 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\boxed{A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 2^n - 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$