Exercice 1.

a) Fonction `moyenne()` ; il suffit de sommer les éléments de la liste, avant de diviser par le nombre d'éléments.

```
## Exo 1. a)
def moyenne(X):
    S = 0
    for k in range(len(X)):
        S += X[k]
    return S/len(X)
```

ou encore, en utilisant le fait que les listes sont **itérables** :

```
def moyenne(X):
    S = 0
    for x in X:
        S += x
    return S/len(X)
```

b) Vérifions que lorsque le nombre d'éléments augmente, la moyenne a tendance à se rapprocher de 5 :

```
## Exo 1. b)
from random import random

X1 = [10 * random() for k in range(10) ]
X2 = [10 * random() for k in range(100) ]
X3 = [10 * random() for k in range(1000) ]
X4 = [10 * random() for k in range(10000) ]
X5 = [10 * random() for k in range(100000) ]
print(len(X1), "éléments : moyenne =", moyenne(X1))
print(len(X2), "éléments : moyenne =", moyenne(X2))
print(len(X3), "éléments : moyenne =", moyenne(X3))
print(len(X4), "éléments : moyenne =", moyenne(X4))
print(len(X5), "éléments : moyenne =", moyenne(X5))
```

ou mieux, à l'aide d'une boucle **for** :

```
from random import random
for k in range(1,6):
    X = [10 * random() for boucle in range(10**k) ]
    print(len(X), "éléments : moyenne =", moyenne(X))
```

ce qui produit :

```
In [2]: (executing lines 11 to 22 of "Untitled.py")
10 éléments : moyenne = 4.486206047389738
```

```
100 éléments : moyenne = 4.949375651731299
1000 éléments : moyenne = 5.133744153051188
10000 éléments : moyenne = 5.03306948994417
100000 éléments : moyenne = 5.002069502162295
```

Exercice 2. a) Vérifions que la moyenne de $Y = X - \bar{X}$ est nulle :

```
# 2. a)
for k in range(1,6):
    X = [10 * random() for boucle in range(10**k) ]
    m = moyenne(X)
    Y = [ x-m for x in X ]
    print("Moyenne de Y =", moyenne(Y))
```

On obtient :

```
In [4]: (executing lines 25 to 31 of "Untitled.py")
Moyenne de Y = 3.552713678800501e-16
Moyenne de Y = -4.574118861455645e-16
Moyenne de Y = 2.6014745913016667e-15
Moyenne de Y = 3.3521452280638185e-14
Moyenne de Y = 2.2066717342283937e-14
```

La moyenne obtenue n'est pas nulle, mais très proche de l'être (de l'ordre de 10^{-15}); en fait mathématiquement elles sont toutes nulles, et ces valeurs non nulles ne sont dues qu'aux erreurs d'arrondi dans les calculs de moyenne.

A cause des limitations dans la représentation des nombres à virgule dans la mémoire de l'ordinateur, souvent une valeur calculée de l'ordre de 10^{-15} correspond à un résultat qui sans erreurs d'approximation serait égal à zéro.

b) Démonstration mathématique que :

$$\overline{(X - \bar{X})} = 0$$

Soit n l'effectif de la série statistique $X = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_i$ sa moyenne.

$$\begin{aligned} \overline{(X - \bar{X})} &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_i - \bar{X}) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_i - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \bar{X} \\ &= \bar{X} - \frac{1}{n} \times n \times \bar{X} \\ &= 0 \end{aligned}$$

c) Fonction `variance()` ; le mieux est d'utiliser la fonction `moyenne()`.

Première solution, en n'appelant qu'une fois la fonction `moyenne()` :

```
def variance(X):
    m = moyenne(X)
    S = 0
    for x in X:
        S += (x-m)**2
    return S/len(X)
```

Deuxième solution, en appelant deux fois la fonction `moyenne()` :

```
def variance(X):
    m = moyenne(X)
    X2 = [(x-m)**2 for x in X]
    return moyenne(X2)
```

d) Vérifions que la variance est toujours positive :

```
for k in range(1,6):
    X = [10 * random() for boucle in range(10**k) ]
    print("variance de X =", variance(X))
```

ce qui produit :

```
In [8]: (executing lines 34 to 49 of "Untitled.py")
variance de X = 9.81157149640175
variance de X = 9.572585725856692
variance de X = 8.562261782201826
variance de X = 8.390590663430379
variance de X = 8.335409443213269
```

La variance se rapproche de $\frac{10^2}{12} \approx 8,333..$ à mesure que le nombre d'éléments augmente.

Exercice 3. Fonction `minimum()` et `maximum()` :

À l'aide d'une parcour de la liste par indice :

```
def minimum(X):
    m = X[0]
    for k in range(1, len(X)):
        if X[k] < m:
            m = X[k]
    return m
```

```
def maximum(X):
    M = X[0]
    for k in range(1, len(X)):
        if X[k] > M:
            M = X[k]
    return M
```

À l'aide d'une parcour de la liste par élément :

```
def minimum(X):
    m = X[0]
    for x in X:
        if x < m:
            m = x
    return m
```

```
def maximum(X):
    M = X[0]
    for x in X:
        if x > M:
            M = x
    return M
```

Exercice 3.

a) Fonction `covariance()` :

Première méthode : en définissant $(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$ par compréhension de liste :

```
def covariance(X, Y):
    mX = moyenne(X)
    mY = moyenne(Y)
    XY = [ (X[k]-mX)*(Y[k]-mY) for k in range(len(X)) ]
    return moyenne(XY)
```

Deuxième méthode : en calculant la somme $\sum(x_k - \bar{X})(y_k - \bar{Y})$.

```
def covariance(X, Y):
    mX = moyenne(X) # Xbar
    mY = moyenne(Y) # Ybar
    n = len(X)
    S = 0 # somme (x_k - Xbar) * (y_k - Ybar)
    for k in range(n):
        S = S + (X[k]-mX)*(Y[k]-mY)
    return S/n
```

b) Fonction `droiteRegression()`; elle appelle les fonctions `covariance()`, `moyenne()` et `variance()` :

```
def droiteRegression(X,Y):
    a = covariance(X,Y)/variance(X)
    b = moyenne(Y) - a*moyenne(X)
    return [a,b]
```

c) Fonction `coefCorrelation()`; elle nécessite d'écrire une fonction renvoyant l'écart-type d'une série statistique :

```
def ecartType(X):
    return variance(X)**0.5

def coefCorrelation(X,Y):
    return covariance(X,Y)/(ecartType(X)*ecartType(Y))
```

Exercice 4.

a) La réaction chimique est d'ordre 1 si et seulement si :

$$\begin{aligned} C(t) &= C_0 \exp(-\lambda t) \\ \Leftrightarrow \ln(C(t)) &= \ln(C_0) - \lambda t \\ \Leftrightarrow Y(t) &= -\lambda t + \ln(C_0) \end{aligned}$$

b) La réaction chimique est d'ordre 2 si et seulement si :

$$\begin{aligned} C(t) &= \frac{C_0}{1 + \lambda C_0 t} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{C(t)} &= \frac{1 + \lambda C_0 t}{C_0} \\ \Leftrightarrow Z(t) &= \frac{1}{C_0} + \lambda t \end{aligned}$$

c) Déclaration des listes T et C :

```
T = [0, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 23, 25]
C = [34.97, 17.52, 13.23, 10.13, 8.16, 6.55, 5.78, 5.22, 4.66,
     4.15, 3.86]
```

d) Déclaration des listes Y et Z :

```
from math import log
Y = [ log(x) for x in C ]
Z = [ 1/x for x in C ]
```

e) On compare les coefficients de corrélation de (T, Y) et de (T, Z)

```
print("Ordre 1 :",coefCorrelation(T,Y))
print("Ordre 2 :",coefCorrelation(T,Z))
```

On obtient :

```
In [22]: (executing lines 2 to 42 of "<tmp 2>")
Ordre 1 : -0.9465919256586861
Ordre 2 : 0.9983509845709143
```

Le coefficient de corrélation est bien meilleur pour l'ordre 2, il est très proche de 1. On choisit donc cette modélisation.

f) Ainsi, avec (a, b) les coefficients de la droite de régression linéaire $y = a \cdot x + b$ calculés :

$$\frac{1}{C(t)} = a \cdot t + b \quad \Leftrightarrow \quad C(t) = \frac{1}{a \cdot t + b}$$

Tracé graphique :

```
# Calculs nécessaires
a,b = droiteRegression(T,Z)
tMin, tMax = 0, 30
N = 1000
X = [tMin + (tMax-tMin)*k/(N-1) for k in range(N)]
Y = [ 1/(a*x+b) for x in X ]

# Tracé
from matplotlib.pyplot import *
figure(1)
axhline(color='black')
axvline(color='black')
grid()
axis([-0.5,30,-0.5,36]) # Fenêtre [xMin, xMax, yMin, Ymax]
plot(T,C,marker='o',linestyle='None',color='black',
      label='Mesures')
plot(X,Y,label="Modèle Théorique")
legend()
title("Modélisation par une réaction d'ordre 2")
xlabel("Temps(s)")
ylabel("Concentration (Mol/l)")
show()
```

On obtient la figure graphique :