Un peu de théorie de la démonstration

Lionel Vaux Auclair

I2M, université d'Aix-Marseille

Logique et calculabilité

M1 Mathématiques et applications, 2020–2021

Trois niveaux d'implication

- ▶ Dans les formules : $A \Rightarrow B$ (*si A alors B*) est une formule comme les autres.
- ▶ Dans les séquents : $\Gamma \vdash A$ représente un état courant dans une démonstration (A se déduit des hypothèses de Γ).
- ▶ Dans les règles :

$$\frac{\Gamma_1 \vdash A_1 \quad \dots \quad \Gamma_n \vdash A_n}{\Gamma \vdash A} (R)$$

dit qu'on peut déduire $\Gamma \vdash A$ des $\Gamma_i \vdash A_i$.

Trois niveaux d'implication

- ▶ Dans les formules : $A \Rightarrow B$ (si A alors B) est une formule comme les autres.
- ▶ Dans les séquents : $\Gamma \vdash A$ représente un état courant dans une démonstration (A se déduit des hypothèses de Γ).
- ▶ Dans les règles :

$$\frac{\Gamma_1 \vdash A_1 \quad \cdots \quad \Gamma_n \vdash A_n}{\Gamma \vdash A} (R)$$

dit qu'on peut déduire $\Gamma \vdash A$ des $\Gamma_i \vdash A_i$.

$A \Rightarrow B$ est une tautologie ssi le séquent $A \vdash B$ est valide
ssi la règle $\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B}$ est correcte
ssi la règle $\frac{\Gamma, B \vdash C}{\Gamma, A \vdash C}$ est correcte

Arbres de démonstration

Un **système logique** $\mathcal{L}$ est un ensemble fini (ou au moins *calculable*) de règles.

Un **argument** (ou une **démonstration ouverte**) dans $\mathcal{L}$ est un arbre dont les nœuds sont des séquents, muni d'un étiquetage partiel des nœuds par des règles de sorte que :

- ▶ si un nœud n'est pas étiqueté alors c'est une feuille (c'est une **prémisse** de l'argument) ;
- ▶ pour chaque nœud étiqueté par la règle (R) , il y a une instance de (R) dont ce nœud est la conclusion, et ses fils sont les hypothèses.

Une **démonstration** est un argument sans prémisse.

On dit que $\Gamma \vdash A$ est **dérivable** (ou **démontrable**) dans $\mathcal{L}$ s'il existe une démonstration dont la racine est de conclusion $\Gamma \vdash A$.

On écrit alors $\Gamma \vdash_{\mathcal{L}} A$.

Correction

Soit $\mathcal{L}$ un système logique correct (c'est-à-dire que toutes les règles sont correctes).

Théorème

Si $\vdash_{\mathcal{L}} A$ alors A est une tautologie.

Démonstration: On montre par induction sur un arbre de démonstration quelconque que son séquent conclusion est valide. Soit π un arbre de démonstration de conclusion $\Gamma \vdash A$, et

$$\frac{\Gamma_1 \vdash A_1 \quad \cdots \quad \Gamma_n \vdash A_n}{\Gamma \vdash A} (R)$$

la règle dont la racine de π est une instance. Par hypothèse d'induction appliquée aux sous-arbres de π , on obtient que chaque séquent $\Gamma_i \vdash A_i$ est valide. Comme (R) est correcte, on en déduit que $\Gamma \vdash A$ est valide. □

Correction

Soit $\mathcal{L}$ un système logique correct (c'est-à-dire que toutes les règles sont correctes).

Théorème

Si $\vdash_{\mathcal{L}} A$ alors A est une tautologie.

Démonstration: On montre par induction sur un arbre de démonstration quelconque que son séquent conclusion est valide. Soit π un arbre de démonstration de conclusion $\Gamma \vdash A$, et

$$\frac{\Gamma_1 \vdash A_1 \quad \cdots \quad \Gamma_n \vdash A_n}{\Gamma \vdash A} (R)$$

la règle dont la racine de π est une instance. Par hypothèse d'induction appliquée aux sous-arbres de π , on obtient que chaque séquent $\Gamma_i \vdash A_i$ est valide. Comme (R) est correcte, on en déduit que $\Gamma \vdash A$ est valide. □

Encore heureux!

Beaucoup mais pas trop

- ▶ Si on cherche à produire une démonstration, on a intérêt à avoir un *maximum* de règles (surtout si on veut une démonstration lisible).

Mais on s'en tient à des règles correctes.

↪ Correction

Beaucoup mais pas trop

- ▶ Si on cherche à produire une démonstration, on a intérêt à avoir un *maximum* de règles (surtout si on veut une démonstration lisible).

Mais on s'en tient à des règles correctes.

↪ Correction

- ▶ Si on veut démontrer une propriété *du système de démonstration* on a intérêt à avoir un *minimum* de règles (et même de connecteurs) pour avoir moins de cas à traiter.

Mais on aimerait pouvoir prouver tout ce qui est vrai.

↪ Complétude

D'autres règles de raisonnement correctes

$$\frac{\Gamma, A \vdash B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \text{ (coup)} \quad \frac{\Gamma, A \vdash C}{\Gamma, A \wedge B \vdash C} \text{ (}\wedge_{gg}\text{)} \quad \frac{\Gamma, \neg A \vdash \perp}{\Gamma \vdash A} \text{ (r.a.)}$$

D'autres règles de raisonnement correctes

$$\frac{\Gamma, A \vdash B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \text{ (coup)} \quad \frac{\Gamma, A \vdash C}{\Gamma, A \wedge B \vdash C} \text{ (}\wedge_{gg}\text{)} \quad \frac{\Gamma, \neg A \vdash \perp}{\Gamma \vdash A} \text{ (r.a.)}$$

Faut-il les ajouter ?

D'autres règles de raisonnement correctes

$$\frac{\Gamma, A \vdash B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \text{ (coup)} \quad \frac{\Gamma, A \vdash C}{\Gamma, A \wedge B \vdash C} \text{ (}\wedge_{gg}\text{)} \quad \frac{\Gamma, \neg A \vdash \perp}{\Gamma \vdash A} \text{ (r.a.)}$$

Faut-il les ajouter ? Inutile :

$$\Gamma, A \vdash B$$

$$\Gamma \vdash A$$

$$\Gamma \vdash B$$

D'autres règles de raisonnement correctes

$$\frac{\Gamma, A \vdash B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \text{ (coup)} \quad \frac{\Gamma, A \vdash C}{\Gamma, A \wedge B \vdash C} \text{ (}\wedge_{gg}\text{)} \quad \frac{\Gamma, \neg A \vdash \perp}{\Gamma \vdash A} \text{ (r.a.)}$$

Faut-il les ajouter ? Inutile :

$$\frac{\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \Rightarrow B} \text{ (}\Rightarrow_i\text{)} \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \text{ (}\Rightarrow_e\text{)}$$

D'autres règles de raisonnement correctes

$$\frac{\Gamma, A \vdash B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \text{ (coup)} \quad \frac{\Gamma, A \vdash C}{\Gamma, A \wedge B \vdash C} \text{ (\wedge_{gg})} \quad \frac{\Gamma, \neg A \vdash \perp}{\Gamma \vdash A} \text{ (r.a.)}$$

Faut-il les ajouter ? Inutile :

$$\frac{\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \Rightarrow B} \text{ (\Rightarrow_i)} \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \text{ (\Rightarrow_e)}$$

$\Gamma, A \vdash C$

$\Gamma, A \wedge B \vdash C$

D'autres règles de raisonnement correctes

$$\frac{\Gamma, A \vdash B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \text{ (coup)} \quad \frac{\Gamma, A \vdash C}{\Gamma, A \wedge B \vdash C} \text{ (\wedge_{gg})} \quad \frac{\Gamma, \neg A \vdash \perp}{\Gamma \vdash A} \text{ (r.a.)}$$

Faut-il les ajouter ? Inutile :

$$\frac{\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \Rightarrow B} \text{ (\Rightarrow_i)} \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \text{ (\Rightarrow_e)}$$

$$\frac{\frac{\Gamma, A \vdash C}{\Gamma, A \wedge B, A \vdash C} \text{ (aff)} \quad \frac{\frac{\Gamma, A \wedge B \vdash A \wedge B}{\Gamma, A \wedge B \vdash A} \text{ (\wedge_{eg})} \text{ (ax)}}{\Gamma, A \wedge B \vdash C} \text{ (coup)}$$

D'autres règles de raisonnement correctes

$$\frac{\Gamma, A \vdash B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \text{ (coup)} \quad \frac{\Gamma, A \vdash C}{\Gamma, A \wedge B \vdash C} \text{ (\wedge_{gg})} \quad \frac{\Gamma, \neg A \vdash \perp}{\Gamma \vdash A} \text{ (r.a.)}$$

Faut-il les ajouter ? Inutile :

$$\frac{\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \Rightarrow B} \text{ (\Rightarrow_i)} \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \text{ (\Rightarrow_e)}$$

$$\frac{\frac{\Gamma, A \vdash C}{\Gamma, A \wedge B, A \vdash C} \text{ (aff)} \quad \frac{\frac{\Gamma, A \wedge B \vdash A \wedge B} \text{ (ax)} \quad \Gamma, A \wedge B \vdash A \text{ (\wedge_{eg})}}{\Gamma, A \wedge B \vdash C} \text{ (coup)}}{\Gamma, A \wedge B \vdash C} \quad \frac{\Gamma, \neg A \vdash \perp}{\Gamma \vdash A}$$

D'autres règles de raisonnement correctes

$$\frac{\Gamma, A \vdash B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \text{ (coup)} \quad \frac{\Gamma, A \vdash C}{\Gamma, A \wedge B \vdash C} \text{ (\wedge_{gg})} \quad \frac{\Gamma, \neg A \vdash \perp}{\Gamma \vdash A} \text{ (r.a.)}$$

Faut-il les ajouter ? Inutile :

$$\frac{\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \Rightarrow B} \text{ (\Rightarrow_i)} \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \text{ (\Rightarrow_e)}$$

$$\frac{\frac{\Gamma, A \vdash C}{\Gamma, A \wedge B, A \vdash C} \text{ (aff)} \quad \frac{\frac{\Gamma, A \wedge B \vdash A \wedge B}{\Gamma, A \wedge B \vdash A} \text{ (\wedge_{eg})} \text{ (ax)}}{\Gamma, A \wedge B \vdash C} \text{ (coup)} \quad \frac{\frac{\Gamma, \neg A \vdash \perp}{\Gamma, \neg A \vdash A} \text{ (\perp_e)} \quad \frac{}{\Gamma, A \vdash A} \text{ (ax)}}{\Gamma \vdash A} \text{ (t.e.)}$$

Règles dérivables

Rappel : un argument = une démonstration ouverte = un arbre de déduction dont les feuilles ne sont pas nécessairement étiquetées par des règles 0-aires.

Définition

La règle

$$\frac{\Gamma_1 \vdash A_1 \quad \cdots \quad \Gamma_n \vdash A_n}{\Gamma \vdash A} (R)$$

est **dérivable** dans $\mathcal{L}$, s'il existe un argument dans $\mathcal{L}$ permettant de dériver $\Gamma \vdash A$, à partir de prémisses parmi $\Gamma_1 \vdash A_1, \dots, \Gamma_n \vdash A_n$.

Règles dérivables

Rappel : un argument = une démonstration ouverte = un arbre de déduction dont les feuilles ne sont pas nécessairement étiquetées par des règles 0-aires.

Définition

La règle

$$\frac{\Gamma_1 \vdash A_1 \quad \cdots \quad \Gamma_n \vdash A_n}{\Gamma \vdash A} (R)$$

est **dérivable** dans $\mathcal{L}$, s'il existe un argument dans $\mathcal{L}$ permettant de dériver $\Gamma \vdash A$, à partir de prémisses parmi $\Gamma_1 \vdash A_1, \dots, \Gamma_n \vdash A_n$.

Exemple

Les règles (*coup*), ($\wedge_g$) et (*r.a.*) sont dérivables dans *DN*
(= les règles d'introduction et d'élimination + (*ax*) + (*t.e.*) + les règles structurelles)

Règles admissibles

Définition

Une règle (R) est **admissible** dans $\mathcal{L}$, si $\mathcal{L}$ et $\mathcal{L} \cup \{R\}$ démontrent les mêmes séquents.
Une règle de $\mathcal{L}$ est **superflue** si elle est admissible dans $\mathcal{L} \setminus \{R\}$.

Une règle dérivable est évidemment admissible.

Exemple

Les règles d'affaiblissement et contraction sont superflues dans DN .

Démonstration: Il suffit de démontrer, par induction sur les arbres de $DN \setminus \{aff, cont\}$, que pour tout arbre de conclusion $\Gamma \vdash B$ (respectivement $\Gamma, A, A \vdash B$) il existe un arbre de conclusion $\Gamma, A \vdash B$. □

Attention : ces règles ne sont pas pour autant dérivables dans $DN \setminus \{aff, cont\}$.

Règles réversibles

Définition

La règle

$$\frac{\Gamma_1 \vdash A_1 \quad \dots \quad \Gamma_n \vdash A_n}{\Gamma \vdash A} (R)$$

est **réversible** si chacune des règles $\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma_i \vdash A_i}$ est admissible.

Autrement dit, appliquer (R) ne « coûte » rien : la conclusion est équivalente aux hypothèses.

Exemple

$(\Rightarrow_i)$ est réversible :

$$\frac{\frac{\Gamma \vdash A \Rightarrow B}{\Gamma, A \vdash A \Rightarrow B} (aff) \quad \frac{}{\Gamma, A \vdash A} (ax)}{\Gamma, A \vdash B} (\Rightarrow_e)$$

$(\Rightarrow_e)$ ne l'est pas : de B on peut déduire $A \Rightarrow B$ mais pas A en général

Règles gauches

Les règles suivantes sont dérivables dans DN :

$$\frac{\Gamma, A, B \vdash C}{\Gamma, A \wedge B \vdash C} (\wedge_g) \quad \frac{\Gamma, A \vdash C \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma, A \vee B \vdash C} (\vee_g)$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma, A \Rightarrow B \vdash C} (\Rightarrow_g) \quad \frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma, \neg A \vdash \perp} (\neg_g) \quad \frac{}{\Gamma, \perp \vdash C} (\perp_g)$$

Règles gauches

Les règles suivantes sont dérivables dans DN :

$$\frac{\Gamma, A, B \vdash C}{\Gamma, A \wedge B \vdash C} (\wedge_g) \quad \frac{\Gamma, A \vdash C \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma, A \vee B \vdash C} (\vee_g)$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma, A \Rightarrow B \vdash C} (\Rightarrow_g) \quad \frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma, \neg A \vdash \perp} (\neg_g) \quad \frac{}{\Gamma, \perp \vdash C} (\perp_g)$$

Démonstration: On s'en sort facilement avec (*coup*) et les règles d'élimination.

↪ Exercice.

Raisonnement sur la vérité

Les règles suivantes sont dérivables dans DN :

$$\frac{\Gamma, \neg A \vdash \perp}{\Gamma \vdash A} \text{ (r.a.)}$$

$$\frac{\Gamma, \neg A \vdash A}{\Gamma \vdash A} \text{ (Peirce)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \neg\neg A}{\Gamma \vdash A} \text{ (}\neg\neg_e\text{)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \neg B \Rightarrow \neg A}{\Gamma \vdash A \Rightarrow B} \text{ (contrap)}$$

Raisonnement sur la vérité

Les règles suivantes sont dérivables dans DN :

$$\frac{\Gamma, \neg A \vdash \perp}{\Gamma \vdash A} \text{ (r.a.)}$$

$$\frac{\Gamma, \neg A \vdash A}{\Gamma \vdash A} \text{ (Peirce)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \neg\neg A}{\Gamma \vdash A} \text{ (}\neg\neg_e\text{)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \neg B \Rightarrow \neg A}{\Gamma \vdash A \Rightarrow B} \text{ (contrap)}$$

Démonstration: On a déjà vu (r.a.). Pour le reste...

↪ Exercice.

Trois niveaux d'implication

Rappel :

$A \Rightarrow B$ est une tautologie ssi le séquent $A \vdash B$ est valide

ssi la règle $\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B}$ ($A \downarrow B$) est correcte

ssi la règle $\frac{\Gamma, B \vdash C}{\Gamma, A \vdash C}$ ($A \uparrow B$) est correcte

Trois niveaux d'implication

Rappel :

- $A \Rightarrow B$ est une tautologie ssi le séquent $A \vdash B$ est valide
- ssi la règle $\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B}$ ($A \downarrow B$) est correcte
- ssi la règle $\frac{\Gamma, B \vdash C}{\Gamma, A \vdash C}$ ($A \uparrow B$) est correcte

Dans *DN* :

- $A \Rightarrow B$ est prouvable ssi le séquent $A \vdash B$ est dérivable
- ssi la règle $\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B}$ ($A \downarrow B$) est dérivable
- ssi la règle $\frac{\Gamma, B \vdash C}{\Gamma, A \vdash C}$ ($A \uparrow B$) est dérivable

↪ Exercice.

Lois de De Morgan

Les règles suivantes sont dérivables dans *DN* :

$$\frac{\Gamma \vdash \neg A \vee \neg B}{\Gamma \vdash \neg(A \wedge B)}$$

$$\frac{\Gamma, \neg A \vee \neg B \vdash C}{\Gamma, \neg(A \wedge B) \vdash C}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \neg A \wedge \neg B}{\Gamma \vdash \neg(A \vee B)}$$

$$\frac{\Gamma, \neg A \wedge \neg B \vdash C}{\Gamma, \neg(A \vee B) \vdash C}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \wedge \neg B}{\Gamma \vdash \neg(A \Rightarrow B)}$$

$$\frac{\Gamma, A \wedge \neg B \vdash C}{\Gamma, \neg(A \Rightarrow B) \vdash C}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash \neg\neg A}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash C}{\Gamma, \neg\neg A \vdash C}$$

Lois de De Morgan

Les règles suivantes sont dérivables dans *DN* :

$$\frac{\Gamma \vdash \neg A \vee \neg B}{\Gamma \vdash \neg(A \wedge B)} \quad \frac{\Gamma, \neg A \vee \neg B \vdash C}{\Gamma, \neg(A \wedge B) \vdash C} \quad \frac{\Gamma \vdash \neg A \wedge \neg B}{\Gamma \vdash \neg(A \vee B)} \quad \frac{\Gamma, \neg A \wedge \neg B \vdash C}{\Gamma, \neg(A \vee B) \vdash C}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \wedge \neg B}{\Gamma \vdash \neg(A \Rightarrow B)} \quad \frac{\Gamma, A \wedge \neg B \vdash C}{\Gamma, \neg(A \Rightarrow B) \vdash C} \quad \frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash \neg\neg A} \quad \frac{\Gamma, A \vdash C}{\Gamma, \neg\neg A \vdash C}$$

Démonstration: Toutes les implications correspondantes étaient en exercice. □

Raisonner modulo l'équivalence

On note $C[X := A]$ la formule obtenue à partir de C en remplaçant toutes les occurrences de la variable propositionnelle X par la formule A .

Théorème

Pour toute formule C , la règle
$$\frac{\Gamma \vdash A \Leftrightarrow B}{\Gamma \vdash C[X := A] \Leftrightarrow C[X := B]}$$
 est dérivable dans DN.

Démonstration: Il suffit de prouver par récurrence sur C qu'on peut dériver $\Gamma, C[X := A] \vdash C[X := B]$ à partir de $\Gamma \vdash A \Rightarrow B$ et $\Gamma \vdash B \Rightarrow A$. Exemples de cas :

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma, D[X := B] \vdash D[X := A] \end{array}}{\Gamma, \neg D[X := A], D[X := B] \vdash \perp} \quad \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma, D[X := A] \vdash D[X := B] \end{array}}{\Gamma, D[X := A] \vdash D[X := B] \vee E[X := B]} \quad \frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma, E[X := A] \vdash E[X := B] \end{array}}{\Gamma, E[X := A] \vdash D[X := B] \vee E[X := B]} \quad \square$$

$$\frac{\Gamma, \neg D[X := A], D[X := B] \vdash \perp}{\Gamma, \neg D[X := A] \vdash \neg D[X := B]} \quad \frac{\Gamma, D[X := A] \vdash D[X := B] \vee E[X := B] \quad \Gamma, E[X := A] \vdash D[X := B] \vee E[X := B]}{\Gamma, D[X := A] \vee E[X := A] \vdash D[X := B] \vee E[X := B]}$$

Raisonner modulo l'équivalence

Le théorème précédent nous autorise par exemple à écrire $A \wedge B \wedge C$ plutôt que $A \wedge (B \wedge C)$ ou $(A \wedge B) \wedge C$ n'importe où dans une preuve dès qu'on sait montrer :

$$\vdash A \wedge (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \wedge C.$$

De même, on peut raisonner comme suit

$$\frac{\vdash \neg\neg A \Rightarrow C}{\vdash A \Rightarrow C}$$

dès qu'on sait montrer

$$\vdash A \Leftrightarrow \neg\neg A$$