MATHÉMATIQUES. Devoir surveillé n°2 (1H30')

Remarques- Un très grand soin devra être apporté à la rédaction. Pas de téléphone portable.

Tout résultat non justifié ne sera pas pris en considération.
Le barème est noté sur 23 points, la note maximale sera de 20.

Exercice 1 : 3 points

1 °) On doit avoir $t > 0$. Donc $\mathcal{D}_f =]0; +\infty[$.

2 °) $\lim_0 \frac{\ln t}{t} = -\infty$ par quotient de limites.

$\lim_{+\infty} \frac{\ln t}{t} = 0$ par les croissances comparées.

3 °) a) On a $f(t) = \frac{u(t)}{v(t)}$ donc :

$$f'(t) = \frac{u'(t)v(t) - v'(t)u(t)}{v(t)^2} = \frac{\frac{1}{t} \cdot t - \ln t}{t^2} = \frac{1 - \ln t}{t^2}.$$

b) $f'(t)$ est du signe de $1 - \ln t$ qui est positif si et seulement si $t < e$. On déduit que f est strictement croissante sur $]0; e]$ et strictement décroissante sur $[e; +\infty[$. Son maximum est atteint en $t = e$ et vaut $f(e) = \frac{1}{e}$.

Exercice 2 : 4 points

1 °)

$$F_\alpha(X) = \frac{AX + B}{X^2 + \alpha^2} + \frac{C}{X - 2} + \frac{D}{(X - 2)^2} + \frac{E}{X + 1}.$$

2 °) On a, après simplification par X : $F_0(X) = \frac{X^2 - 3X}{(X^2)(X - 2)^2(X + 1)} = \frac{X - 3}{X(X - 2)^2(X + 1)}$.

La décomposition formelle devient :

$$F_0(X) = \frac{A}{X} + \frac{B}{X - 2} + \frac{C}{(X - 2)^2} + \frac{D}{X + 1}.$$

On a par les techniques habituelles :

$$A = \frac{-3}{(-2)^2} = \frac{-3}{4}.$$

$$C = \frac{2 - 3}{2 \times (2 + 1)} = \frac{-1}{6}.$$

$$D = \frac{-1-3}{-1 \times (-1-2)^2} = \frac{4}{9}.$$

Pour trouver B , on peut remplacer X par 1 : on obtient $F_0(1) = A - B + C + \frac{1}{2}D$ ce qui donne $-1 = \frac{-3}{4} - B - \frac{1}{6} + \frac{2}{9}$. On en tire $D = \frac{11}{36}$.

Exercice 3 : 3 points

Argument 1 : La partie entière est obtenue par quotient de la division euclidienne de $P(X)$ par $X^5 + 3X^4 + 2X^3 - 2X^2 - 3X - 1$. Son degré vaut $\deg(P) - 5 = 1$. Or dans la décomposition proposée, la partie entière est la constante 1, qui est de degré 0.

Argument 2 : Le polynôme $X^2 - 1$ n'est pas irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ donc la fraction $\frac{3}{X^2 - 1}$ n'est pas un élément simple de première espèce.

Argument 3 : La fraction $\frac{X}{(X+1)^3}$ n'est pas un élément simple de première espèce : son numérateur devrait être une constante.

Exercice 4 : 5 points

1 °) a) On a $1 > 0$ donc $\arg(1 + j(x+3)) = \arctan\left(\frac{x+3}{1}\right) = f(x)$. Même raisonnement pour $g(x)$.

b) On a, d'après la question précédente, à 2π près :

$$f(x) + g(x) = \arg(1 + j(x+3)) + \arg\left(1 + j\left(\frac{1}{x+3}\right)\right) = \arg\left((1 + j(x+3))\left(1 + j\left(\frac{1}{x+3}\right)\right)\right),$$

En développant, on trouve $(1 + j(x+3))\left(1 + j\left(\frac{1}{x+3}\right)\right) = j\left(x+3 + \frac{1}{x+3}\right)$ qui est un imaginaire pur de partie imaginaire strictement positive car $x \in]-3, +\infty[$.

On a donc $f(x) + g(x) = \arg\left(j\left(x+3 + \frac{1}{x+3}\right)\right) = \frac{\pi}{2}$.

NB : rigoureusement parlant, on n'a prouvé cette égalité qu'à 2π près. Mais puisque la fonction $\arctan$ est comprise entre $-\frac{\pi}{2}$ et $+\frac{\pi}{2}$, $f(x) + g(x)$ est compris entre $-\pi$ et $+\pi$, donc l'égalité à 2π près est en fait une égalité tout court.

c) Fait dans la question précédente.

2 °)

a) On a : $f'(x) = \frac{1}{(x+3)^2 + 1}$

$$g'(x) = \frac{\frac{-1}{(x+3)^2}}{\frac{1}{(x+3)^2} + 1} = \frac{-1}{1 + (x+3)^2}, \text{ en utilisant la formule de dérivation de } \arctan(u(x)).$$

Donc $(f(x) + g(x))' = 0$ quel que soit $x \in]-3, +\infty[$.

b) Puisque $(f(x) + g(x))' = 0$ quel que soit $x \in]-3, +\infty[$, on en déduit que la fonction $f+g$ est constante sur $] -3, +\infty[$. On a donc $f(x) + g(x) = f(-2) + g(-2) = \arctan(1) + \arctan(1) = \frac{\pi}{2}$.

Exercice 5 : 3 points

1 °) $f(x) = e^{\frac{2}{x} \ln(x^2 - x + 1)}$.

Cette expression n'a de sens que si $x^2 - x + 1 > 0$ et $x \neq 0$. Or $x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$ quel que soit x réel. Donc cette fonction est définie sur tout $\mathbb{R}^*$.

2 °)

Par les croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} \ln(x^2 - x + 1) = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e^0 = 1$

$$\begin{aligned}
& \mathbf{3} \text{ °) } f(x) = 1 \\
& \Leftrightarrow e^{\frac{2}{x} \ln(x^2 - x + 1)} = 1 \\
& \Leftrightarrow \frac{2}{x} \ln(x^2 - x + 1) = 0 \\
& \Leftrightarrow \ln(x^2 - x + 1) = 0 \\
& \Leftrightarrow x^2 - x + 1 = 1 \\
& \Leftrightarrow x^2 - x = 0 \\
& \Leftrightarrow x(x - 1) = 0
\end{aligned}$$

Il faut enlever la valeur interdite $x = 0$. On trouve donc l'unique solution $x = 1$.

Exercice 6 : 5 points

1 °)

$$4P(X) - XP'(X) = 4(X^4 + 18X^2 + 216X + 405) - X(4X^3 + 36X + 216) = 36X^2 + 648X + 1620 = 36(X^2 + 18X + 45).$$

2 °)

a)

Soit x_0 la racine double de $P(X)$ (l'énoncé admet son existence et unicité). Alors, on sait que $P(x_0) = P'(x_0) = 0$.

Donc, puisque $4P(X) - XP'(X) = 36(X^2 + 18X + 45)$, on a en remplaçant X par x_0 : $0 = 36(x_0^2 + 18x_0 + 45)$ c'est à dire $x_0^2 + 18x_0 + 45 = 0$.

Ensuite, en résolvant cette dernière équation du second degré, on trouve : $x_0 = -3$ ou $x_0 = -15$.

b) On teste avec -3 et 15. On trouve que $P(-3) = P'(-3) = 0$ donc que $x_0 = -3$.

3 °) Puisque -3 est racine double de $P(X)$, $(X + 3)^2$ divise ce dernier. Après division euclidienne, on trouve :

$$P(X) = (X + 3)^2(X^2 - 6X + 45).$$

Le discriminant de $X^2 - 6X + 45$ vaut -144 : il est négatif donc $X^2 - 6X + 45$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$. **Conclusion** : $P(X) = (X + 3)^2(X^2 - 6X + 45)$ est la factorisation de $P(X)$ en produit de polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$.

← ~~~~~→