

Mathématiques Générales I

PLANCHE 8

POLYNÔMES. FRACTIONS RATIONNELLES.

Polynômes

Exercice 1. Soient a, b des réels, et $P(X) = X^4 + 2aX^3 + bX^2 + 2X + 1$. Pour quelles valeurs de a et b le polynôme P est-il le carré d'un polynôme de $\mathbb{R}[X]$?

Exercice 2. Déterminer $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ pour que $X^2 + 2$ divise $X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2$.

Exercice 3. Trouver les racines dans \mathbb{C} des polynômes suivants:

i) $X^2 + X + 1$

ii) $X^3 - 7X^2 + 14X - 8$

iii) $X^6 + 1$

iv) $X^4 + X^2 + 1$.

v) $X^3 + X^2 + X + 1$

vi) $X^3 + c$, pour $c \in \mathbb{R}$.

Ecrire la décomposition en polynômes irréductibles dans \mathbb{C} des polynômes ci-dessus. En déduire leur décomposition en polynômes irréductibles dans \mathbb{R} .

Exercice 4. Considérons le polynôme $X^2 + bX + c$, et ses deux racines λ_1 et λ_2 .

1) Exprimez en fonction b et c la somme des racines $\lambda_1 + \lambda_2$. Faire de même pour le produit des racines $\lambda_1 \lambda_2$.

2) On cherche à résoudre le système d'équations
$$\begin{cases} u + v = 3 \\ uv = -2 \end{cases}$$

a) Montrer que u et v sont les deux racines du polynôme $X^2 - 3X - 2$.

b) Résoudre le système d'équations.

3) Appliquer la même méthode pour le système
$$\begin{cases} u + v = 1 + i \\ uv = i \end{cases}$$

Exercice 5. Polynômes bi-carrés

Voici un exemple de polynôme de degré 4 dont on sait trouver les racines. Ce sont les polynômes bi-carrés qui sont de la forme:

$$P(X) = X^4 + bX^2 + c$$

4) Poser $Y = X^2$. Trouver un polynôme Q de degré deux tel que $Q(Y) = P(X)$. Quelles sont les racines de Q ?

5) En déduire les racines de P .

6) Applications: Quelles sont les racines de $X^4 - 3X^2 + 1$? Et celles de $X^6 - 3X^2 + 2$?

Exercice 6. Division euclidienne

7) Effectuer la division euclidienne de P par Q pour les polynômes P et Q suivants:

i) $P = X^3 + 1, Q = X^2 + 1$ ii) $P = X^4 - 1, Q = X^2 - 1$

iii) $P = X^3 + 3X^2 + 3X + 1, Q = X^2 - 1$

8) Les polynômes P et Q ci-dessus sont-ils premiers entre eux dans $\mathbb{R}[X]$?

9) Pour les polynômes ci-dessus qui sont premiers entre eux, trouver U et $V \in \mathbb{R}[X]$ tels que $U P + V Q = 1$.

Exercice 7. Trouver les restes des divisions euclidiennes de

$$(X - 3)^{2n} + (X - 2)^n - 2$$

par $(X - 3)(X - 2), (X - 3)^3, (X - 2)^2$ et $(X - 3)^2(X - 2)^2$.

Exercice 8. Quelles sont les racines du polynôme :

$$1 - \frac{X}{1} + \frac{X(X - 1)}{2!} - \frac{X(X - 1)(X - 2)}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{X(X - 1) \dots (X - n + 1)}{n!}.$$

Exercice 9. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré n . On note, pour $p < n$, u_p la somme des racines de $P^{(p)}$. Démontrer que u_0, \dots, u_{n-1} forme une progression arithmétique.

Exercice 10. Soit, pour $n \geq 0, P_n(X) = \sum_{k=0}^n \frac{X^k}{k!}$.

1. Démontrer que P_n admet n racines simples.
2. Démontrer que, si n est impair, une et une seule de ces racines est réelle, et que si n est pair, aucune des racines n'est réelle.

Exercice 11. Polynômes de Chebyshev

Les polynômes de Chebyshev sont définis par récurrence de la manière suivante:

$$\begin{cases} P_0 = 1, & P_1 = X \\ \forall n \geq 1, & P_{n+1} = 2X P_n - P_{n-1} \end{cases}$$

- 10) Calculer P_2, P_3, P_4 .
- 11) Déterminer (par récurrence) le degré de P_n , et son coefficient dominant.
- 12) Rappeler la formule permettant d'exprimer $\cos(2\theta)$ en fonction $\cos(\theta)$. Comparer avec $P_2(\cos(\theta))$.
- 13) Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall \theta \in \mathbb{R}, P_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$.

Fractions rationnelles

Exercice 12. Décomposer en éléments simples les fractions rationnelles suivantes :

1. $\frac{1}{X^3 - X}$	2. $\frac{X^2 + 2X + 5}{X^2 - 3X + 2}$	3. $\frac{X^3}{(X - 1)(X - 2)(X - 3)}$
4. $\frac{2X^2 + 1}{(X^2 - 1)^2}$	5. $\frac{X^3 + 1}{(X - 1)^3}$	6. $\frac{X^4 + 1}{(X + 1)^2(X^2 + 1)}$

Exercice 13.

- Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle $\frac{1}{X(X+1)(X+2)}$.
- En déduire la limite de la suite (S_n) suivante : $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$.

Exercice 14. Donner une primitive des fonctions suivantes :

- $x \mapsto \frac{3x+2}{x^2+x+1}$
- $x \mapsto \frac{1}{x^2+4x+5}$
- $x \mapsto \frac{x^3+2x}{x^2+x+1}$
- $x \mapsto \frac{2x-1}{(x+1)^2}$

CALCUL DE LA SOMME DES $\frac{1}{k^2}$.

On se propose de calculer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2},$$

en suivant un raisonnement original de Carl Friedrich Gauss, mathématicien allemand du début du XIX^{ème} siècle.

Soit donc $n \in \mathbb{N}^*$.

- Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin(2n+1)x = \text{Im}(\cos x + i \sin x)^{2n+1}$.

En déduire que

$$\sin(2n+1)x = \sum_{k=0}^n C_{2n+1}^{2k+1} (-1)^k \sin^{2k+1} x \cos^{2n-2k} x.$$

- On pose, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$, $\cotan x = \frac{1}{\tan x}$.

Soit P_n le polynôme défini par

$$P_n(X) = \sum_{k=0}^n C_{2n+1}^{2k+1} (-1)^k X^{n-k}.$$

Montrez que, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$,

$$\frac{\sin(2n+1)x}{\sin^{2n+1} x} = P_n(\cotan^2 x).$$

- Montrez que les nombres $\cotan^2 \frac{k\pi}{2n+1}$ pour $k = 1, \dots, n$ sont tous distincts et sont les racines de P_n .
- Si un polynôme de degré n qui possède n racines distinctes s'écrit

$$P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0,$$

exprimez la somme de ses racines en fonction de a_n et a_{n-1} .

En déduire la valeur de

$$\sum_{k=1}^n \cotan^2 \frac{k\pi}{2n+1}.$$

5. Montrez que

$$\forall x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[, \quad \cotan^2 x \leq \frac{1}{x^2} \leq 1 + \cotan^2 x.$$

6. En déduire un encadrement de

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}.$$

7. Calculer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}.$$