

Exercice I. On considère les suites de fonctions définies sur $[0, 1]$ par

$$f_n(x) = x^n, \quad g_n(x) = \frac{x^n}{n}, \quad h_n(x) = \begin{cases} 1 - nx, & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ 0, & \text{si } \frac{1}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

1. Étudier la convergence simple et la convergence uniforme de ces suites de fonctions sur $[0, 1]$.
2. Étudier la dérivée de g_n . Que pouvez-vous en conclure ?

Exercice II. La suite de fonctions (f_n) est définie sur $] -\infty, +\infty[$ par son terme général

$$f_n(x) = \frac{x^{2n}}{1 + x^{2n}}.$$

1. Montrer que cette suite converge simplement vers une fonction f que l'on déterminera.
2. Montrer que la convergence est uniforme sur tous les intervalles du type $[a, b]$ avec $|a| < 1$ et $|b| < 1$, ou bien $a > 1$, ou bien $b < -1$.
3. Montrer qu'il n'y a pas convergence uniforme sur des intervalles contenant 1 ou -1 .

Exercice III. Étudier la convergence simple et la convergence uniforme de la suite de fonctions définies sur $[0, 1]$ par $f_n(x) = x^n \sin(\pi x)$.

Exercice IV. Étudier la convergence simple et la convergence uniforme de la suite de fonctions $f_n(x) = \frac{nx^3}{1 + nx}$ définies sur l'intervalle $[0, 100]$. Que dire de cette convergence sur l'intervalle $[0, +\infty[$?

Exercice V. On donne la suite de fonctions $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{nx}$, $x \in]0, 1[$.

Étudier la convergence simple et la convergence uniforme de cette suite sur l'intervalle de définition.

Exercice VI. Déterminer la limite suivante : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{ne^x}{n+x} dx$.

Exercice VII. Soit la suite de fonctions (f_n) définies sur $[0, +\infty[$ par $f_n(x) = \frac{n}{(x-n)^2 + n^2}$

1. Montrer que la suite (f_n) converge uniformément sur $[0, +\infty[$ vers une fonction f que l'on déterminera.
2. Montrer que les deux intégrales généralisées $\int_0^{+\infty} f_n(x) dx$ et $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ convergent et que pourtant, on ne peut pas passer aux limites :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx \neq \int_0^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx.$$

Expliquer.

Exercice VIII. Soit la suite de fonctions (f_n) définies sur $[-1, +1]$ par

$$f_n(x) = \frac{x}{1 + n^2 x^2}$$

1. Montrer qu'elle converge uniformément sur $[-1, +1]$ vers une fonction f que l'on déterminera.
2. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(x) = f'(x)$, dans tout intervalle de la forme suivante : $[-1, b]$, $b < 0$ ou $[a, 1]$, $a > 0$.
3. Montrer que cette dernière propriété n'est pas vraie sur $[-1, +1]$. (Le théorème sur dérivation des suites de fonctions terme à terme ne s'applique pas ici sur $[-1, +1]$).

Exercice IX. Montrer que la limite simple d'une suite de fonctions convexes est convexe

Exercice X. Soit α un nombre réel positif ou nul, et (f_n) la suite de fonctions définies sur $[0, 1]$ par $f_n(x) = \frac{nx}{1 + n^2 x^\alpha}$.

1. Déterminer les valeurs de α pour lesquelles la suite (f_n) converge uniformément vers une fonction f sur $[0, 1]$.

2. Dans les deux cas $\alpha = 2$ et $\alpha = 4$, étudier la convergence de la suite $\left(\int_0^1 f_n(x) dx \right)_{n \in \mathbb{N}}$.

Cette suite converge-t-elle vers $\int_0^1 f(x) dx$?

Exercice XI. Soit $(f_n)_n$ définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f_n(x) = \begin{cases} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n & \text{si } x \in [0, n] \\ 0 & \text{si } x > n \end{cases}$

Montrer que $(f_n)_n$ converge simplement, puis uniformément sur $\mathbb{R}^+$.

Exercice XII. Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions croissantes réelles, continues et définies sur un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$. Si $(f_n)_n$ converge simplement vers une fonction f continue sur $[a, b]$, montrer que la convergence est uniforme.

Exercice XIII. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(t) = \sqrt{t}$, $t \in [0, 1]$. On définit sur $[0, 1]$ la suite de fonctions $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$p_0(t) = 0, \quad p_{n+1}(t) = p_n(t) + \frac{1}{2}(t - p_n(t)^2), \quad t \in [0, 1], \quad n \in \mathbb{N}.$$

1. **a.** Calculer p_1 et p_2 .
- b.** Montrer que les applications p_n , $n \in \mathbb{N}$, sont polynômes.
2. **a.** Montrer que pour tout $t \in [0, 1]$ et tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\sqrt{t} - p_{n+1}(t) = (\sqrt{t} - p_n(t)) \left(1 - \frac{1}{2}(\sqrt{t} + p_n(t)) \right).$$

- b.** En déduire que $0 \leq p_n(t) \leq \sqrt{t}$ pour tout $t \in [0, 1]$ et tout $n \in \mathbb{N}$.
3. **a.** Soit $t \in [0, 1]$ fixé. Montrer que la suite $(p_n(t))_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
- b.** En déduire que la suite de fonctions $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers une limite que l'on déterminera.
4. **a.** En utilisant la relation du 2.(a), montrer que pour tout $t \in [0, 1]$ et tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$0 \leq \sqrt{t} - p_n(t) \leq \sqrt{t} \left(1 - \frac{1}{2}\sqrt{t} \right)^n.$$

- b.** Soit $n \geq 1$ fixé. En étudiant la fonction $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(x) = x(1 - \frac{x}{2})^n$, montrer que

$$|p_n(t) - f(t)| \leq \frac{2}{n+1} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n, \quad \text{pour tout } t \in [0, 1].$$

5. Montrer que la suite de fonctions $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur $[0, 1]$.

Exercice XIV. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle qu'il existe $k > 0$ avec

$$|f(x+y) - f(x) - f(y)| \leq k, \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

À tout $n \in \mathbb{N}$, on associe la fonction g_n définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \frac{1}{2^n} f(2^n x)$.

1. En écrivant $2^{n+1} = 2^n + 2^n$, montrer que

$$|g_{n+1}(x) - g_n(x)| \leq \frac{k}{2^{n+1}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

2. Montrer alors que pour tout $p \in \mathbb{N}$ et tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$|g_{n+p}(x) - g_n(x)| \leq \frac{k}{2^n}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

3. En déduire que $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers une fonction continue $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
4. Montrer que g vérifie

$$g(x+y) = g(x) + g(y), \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

5. En déduire que $g(x) = xg(1)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Indication : on pourra d'abord montrer que $g\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{p}{q} g(1)$ pour $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}$, $q \geq 1$.