

**Université de Marseille**  
**Licence de Mathématiques, 1ere année,**  
**Analyse (2eme semestre)**

T. Gallouët pour les chapitres 1-5 et 7. A. Benabdallah pour le chapitre 6

May 3, 2010

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Limites</b>	<b>3</b>
1.1	Définition et propriétés . . . . .	3
1.2	Opérations sur les limites . . . . .	8
1.3	Fonctions monotones . . . . .	10
1.4	Exercices . . . . .	11
1.4.1	Quelques rappels (Parties majorées et minorées, Suites...)	11
1.4.2	Limites . . . . .	13
1.5	Exercices corrigés . . . . .	15
<b>2</b>	<b>Continuité</b>	<b>18</b>
2.1	Définition et propriétés . . . . .	18
2.2	Théorème des valeurs intermédiaires . . . . .	19
2.3	Fonction continue sur un intervalle fermé borné . . . . .	20
2.4	Fonction strictement monotone et continue . . . . .	22
2.5	Exercices . . . . .	23
2.6	Exercices corrigés . . . . .	26
<b>3</b>	<b>Dérivée</b>	<b>37</b>
3.1	Définitions . . . . .	37
3.2	Opérations sur les dérivées . . . . .	38
3.3	Théorème des Accroissements Finis . . . . .	41
3.4	Fonctions de classe $C^n$ . . . . .	42
3.5	Exercices . . . . .	43
3.6	Exercices corrigés . . . . .	46
<b>4</b>	<b>Formules de Taylor et développements limités</b>	<b>63</b>
4.1	Taylor-Lagrange . . . . .	63
4.2	Taylor-Young . . . . .	64
4.3	Fonctions analytiques (hors programme...) . . . . .	66
4.4	Développements limités . . . . .	68
4.5	Exemples (formules de Taylor, $DL$ ) . . . . .	73
4.6	Equivalents . . . . .	76
4.7	Exercices . . . . .	77
4.8	Exercices corrigés . . . . .	83

<b>5</b>	<b>Intégrale et primitives</b>	<b>101</b>
5.1	Objectif . . . . .	101
5.2	Intégrale des fonctions en escalier . . . . .	102
5.3	Intégrale des fonctions continues . . . . .	105
5.4	Primitives . . . . .	110
5.5	Intégration par parties, formule de Taylor . . . . .	112
5.6	Théorème de convergence . . . . .	113
5.7	Exercices . . . . .	114
<b>6</b>	<b>Courbes planes</b>	<b>121</b>
6.1	Fonctions d'une variable réelle à valeur vectorielle . . . . .	121
6.1.1	Limites et continuité . . . . .	121
6.1.2	Dérivée et formule de Taylor-Young . . . . .	122
6.2	Courbes paramétrées planes . . . . .	122
6.3	Etude de courbes planes . . . . .	124
6.3.1	Domaine d'étude . . . . .	124
6.3.2	Tangente en un point à une courbe pararamétrée . . . . .	124
6.3.3	Position de la courbe par rapport à la tangente . . . . .	126
6.3.4	Branches infinies . . . . .	127
6.3.5	Points multiples . . . . .	128
6.3.6	Plan d'étude d'une courbe plane paramétrée . . . . .	128
6.4	Courbes en coordonnées polaires . . . . .	129
6.4.1	Tangente en un point . . . . .	129
6.4.2	Branches infinies . . . . .	130
6.4.3	Etude des points multiples . . . . .	130
6.4.4	Plan d'étude d'une courbe polaire . . . . .	130
6.5	Exercices . . . . .	131
<b>7</b>	<b>Fonctions réelles de plusieurs variables</b>	<b>134</b>
7.1	Limite, continuité . . . . .	134
7.2	Différentielle, dérivées partielles . . . . .	135
7.3	Recherche d'un extremum . . . . .	142
7.4	Exercices . . . . .	142

# Chapitre 1

## Limites

### 1.1 Définition et propriétés

Dans tout ce document, on utilisera indifféremment le terme “fonction” et le terme “application”. Une application (ou une fonction)  $f$  de  $D$  dans  $E$  est la donnée pour tout  $x \in D$  de son image par  $f$ , notée  $f(x)$ . (Le domaine de définition de  $f$  est donc ici l’ensemble  $D$ .) lorsque nous parlerons d’une fonction de  $\mathbb{R}$  de  $\mathbb{R}$ , le domaine de définition de  $f$  sera donc  $\mathbb{R}$  tout entier.

**Définition 1.1 (Limite finie en un point de  $\mathbb{R}$ )** Soit  $f$  une application de  $D \subset \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ ,  $a \in \mathbb{R}$  et  $l \in \mathbb{R}$ . On suppose qu’il existe  $b, c \in \mathbb{R}$  t.q.  $b < a < c$  et  $D \supset ]b, a[ \cup ]a, c[$ . On dit que  $l$  est limite de  $f$  en  $a$  si pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q. :

$$x \in D, x \neq a, |x - a| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon.$$

**Proposition 1.1 (Unicité de la limite)** Soit  $f$  une application de  $D \subset \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ . On suppose qu’il existe  $b, c \in \mathbb{R}$  t.q.  $b < a < c$  et  $D \supset ]b, a[ \cup ]a, c[$ . Soit  $l, m \in \mathbb{R}$ . On suppose que  $l$  est limite de  $f$  en  $a$  et que  $m$  est aussi limite de  $f$  en  $a$ . Alors,  $l = m$ .

DÉMONSTRATION : Soit  $\varepsilon > 0$ . Comme  $l$  est limite de  $f$  en  $a$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q.

$$x \in D, x \neq a, |x - a| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon.$$

Comme  $m$  est limite de  $f$  en  $a$ , il existe  $\beta > 0$  t.q.

$$x \in D, x \neq a, |x - a| \leq \beta \Rightarrow |f(x) - m| \leq \varepsilon.$$

On choisit maintenant  $x = \min(a + \alpha, a + \beta, \frac{a+\varepsilon}{2})$ . On a alors  $x \neq a$ ,  $x \in D$  (car  $a < x < c$ ),  $|x - a| \leq \alpha$  et  $|x - a| \leq \beta$ . On a donc  $|f(x) - l| \leq \varepsilon$  et  $|f(x) - m| \leq \varepsilon$ . On en déduit  $|l - m| \leq 2\varepsilon$ .

On a ainsi montré que  $|l - m| \leq 2\varepsilon$ , pour tout  $\varepsilon > 0$ . On en déduit que  $l = m$ . En effet, si  $l \neq m$  on a  $|l - m| > 0$ . On choisit alors  $\varepsilon = \frac{|l-m|}{4}$  et on obtient

$$2\varepsilon = \frac{|l - m|}{2} \leq \varepsilon,$$

et donc  $2 \leq 1$  (car  $\varepsilon > 0$ ). Ce qui est absurde. On a donc bien, nécessairement,  $l = m$ . ■

**Notation :** Si  $l$  est limite de  $f$  en  $a$ , on note  $l = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ .

**Proposition 1.2 (Caractérisation séquentielle de la limite)** Soit  $f$  une application de  $D \subset \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ ,  $a \in \mathbb{R}$  et  $l \in \mathbb{R}$ . On suppose qu'il existe  $b, c \in \mathbb{R}$  t.q.  $b < a < c$  et  $D \supset ]b, a[ \cup ]a, c[$ . Alors,  $l$  est la limite en  $a$  de  $f$  si et seulement si  $f$  transforme toute suite convergente vers  $a$  (et prenant ses valeurs dans  $D \setminus \{a\}$ ) en suite convergente vers  $l$ , c'est-à-dire :

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l.$$

DÉMONSTRATION : On suppose tout d'abord que  $l = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$  et on va montrer que  $f$  transforme toute suite convergente vers  $a$  (et prenant ses valeurs dans  $D \setminus \{a\}$ ) en suite convergente vers  $l$ .

Soit  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D \setminus \{a\}$  t.q.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ . On veut montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l$ , c'est-à-dire (par définition de la limite d'une suite) que pour tout  $\varepsilon > 0$  il existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  t.q.

$$n \geq n_0 \Rightarrow |f(x_n) - l| \leq \varepsilon. \quad (1.1)$$

Soit donc  $\varepsilon > 0$ . On cherche à montrer l'existence de  $n_0$  donnant (1.1). On commence par remarquer que, comme  $l = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q.

$$x \in D, x \neq a, |x - a| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon. \quad (1.2)$$

Puis, comme  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ , il existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  t.q.

$$n \geq n_0 \Rightarrow |x_n - a| \leq \alpha.$$

On a donc pour  $n \geq n_0$ ,  $x_n \in D$ ,  $x_n \neq a$  (car la suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  prend ses valeurs dans  $D \setminus \{a\}$ ) et  $|x_n - a| \leq \alpha$ . Ce qui donne, par (1.2),  $|f(x_n) - l| \leq \varepsilon$ . On a donc bien

$$n \geq n_0 \Rightarrow |f(x_n) - l| \leq \varepsilon.$$

On a donc bien montré que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l$ . Ce qui termine la première partie de la démonstration (c'est-à-dire que  $l = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$  implique que  $f$  transforme toute suite convergente vers  $a$  (et prenant ses valeurs dans  $D \setminus \{a\}$ ) en suite convergente vers  $l$ .)

On montre maintenant la réciproque. On suppose que  $f$  transforme toute suite convergente vers  $a$  (et prenant ses valeurs dans  $D \setminus \{a\}$ ) en suite convergente vers  $l$ . On veut montrer que  $l = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ . Pour cela, on va raisonner par l'absurde. On suppose que  $l$  n'est pas la limite en  $a$  de  $f$  (la fonction  $f$  peut alors avoir une limite en  $a$  différente de  $l$  ou bien ne pas avoir de limite en  $a$ ) et on va construire une suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  prenant ses valeurs dans  $D \setminus \{a\}$ , t.q.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$  et  $l$  n'est pas limite de  $f(x_n)$  quand  $n \rightarrow +\infty$  (en contradiction avec l'hypothèse).

Comme  $l$  n'est pas la limite en  $a$  de  $f$ , il existe  $\varepsilon > 0$  t.q. pour tout  $\alpha > 0$  il existe  $x$  t.q.

$$x \in D, x \neq a, |x - a| \leq \alpha \text{ et } |f(x) - l| > \varepsilon. \quad (1.3)$$

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . En prenant  $\alpha = \frac{1}{n+1}$  dans (1.3), on peut donc choisir un réel  $x_n$  t.q.

$$x_n \in D, x_n \neq a, |x_n - a| \leq \frac{1}{n+1} \text{ et } |f(x_n) - l| > \varepsilon. \quad (1.4)$$

On a ainsi construit une suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  t.q.  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D \setminus \{a\}$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$  (car  $|x_n - a| \leq \frac{1}{n+1}$  pour tout  $n$ ) et  $l$  n'est pas limite de  $f(x_n)$  quand  $n \rightarrow +\infty$  (car  $|f(x_n) - l| > \varepsilon$  pour tout  $n$ ). Ce qui est bien en contradiction avec l'hypothèse que  $f$  transforme toute suite convergente vers  $a$  (et prenant ses valeurs dans  $D \setminus \{a\}$ ) en suite convergente vers  $l$ . Ce qui termine la démonstration de la proposition 1.2. ■

**Définition 1.2 (Limite finie à droite (ou à gauche) en un point de  $\mathbb{R}$ )** Soit  $f$  une application de  $D \subset \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ ,  $a \in \mathbb{R}$  et  $l \in \mathbb{R}$ .

1. On suppose qu'il existe  $c \in \mathbb{R}$  t.q.  $a < c$  et  $D \supset ]a, c[$ . On dit que si  $l$  est limite à droite de  $f$  en  $a$  si pour tout  $\varepsilon > 0$  il existe  $\alpha > 0$  t.q. :

$$x \in D, a < x \leq a + \alpha \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon.$$

2. On suppose qu'il existe  $b \in \mathbb{R}$  t.q.  $b < a$  et  $D \supset ]b, a[$ . On dit que  $l$  est limite à gauche de  $f$  en  $a$  si pour tout  $\varepsilon > 0$  il existe  $\alpha > 0$  t.q. :

$$x \in D, a - \alpha \leq x < a \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon.$$

**Proposition 1.3 (Unicité de la limite à droite (ou à gauche))** Soit  $f$  une application de  $D \subset \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ .

1. On suppose qu'il existe  $c \in \mathbb{R}$  t.q.  $a < c$  et  $D \supset ]a, c[$ . Si  $f$  admet une limite (finie) à droite en  $a$ , cette limite est unique.
2. On suppose qu'il existe  $b \in \mathbb{R}$  t.q.  $b < a$  et  $D \supset ]b, a[$ . Si  $f$  admet une limite (finie) à gauche en  $a$ , cette limite est unique.

DÉMONSTRATION : La démonstration de l'unicité de la limite à droite est très voisine de la démonstration de l'unicité de la limite faite pour la proposition 1.1. On reprend ici cette démonstration. On suppose que  $l$  est limite à droite de  $f$  en  $a$  et que  $m$  est aussi limite à droite de  $f$  en  $a$ . Soit  $\varepsilon > 0$ . Comme  $l$  est limite à droite de  $f$  en  $a$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q.

$$x \in D, a < x \leq a + \alpha \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon.$$

Comme  $m$  est limite à droite de  $f$  en  $a$ , il existe  $\beta > 0$  t.q.

$$x \in D, a < x \leq a + \beta \Rightarrow |f(x) - m| \leq \varepsilon.$$

On choisit maintenant  $x = \min(a + \alpha, a + \beta, \frac{a+c}{2})$ . On a alors  $x \in D$ ,  $a < x \leq a + \alpha$  et  $a < x \leq a + \beta$ . On a donc  $|f(x) - l| \leq \varepsilon$  et  $|f(x) - m| \leq \varepsilon$ . On en déduit  $|l - m| \leq 2\varepsilon$ .

On a ainsi montré que  $|l - m| \leq 2\varepsilon$ , pour tout  $\varepsilon > 0$ . Comme dans la proposition 1.1, on en déduit que  $l = m$ . Ce qui donne l'unicité de la limite à droite de  $f$  en  $a$ .

La démonstration de l'unicité de la limite à gauche est semblable et est laissée en exercice. ■

**Notation :** Si  $l$  est limite à droite de  $f$  en  $a$ , on note  $l = \lim_{x \rightarrow a, x > a} f(x)$ . Si  $l$  est limite à gauche de  $f$  en  $a$ , on note  $l = \lim_{x \rightarrow a, x < a} f(x)$ .

**Proposition 1.4 (Limite=limite à droite et à gauche)** Soit  $f$  une application de  $D \subset \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ ,  $a \in \mathbb{R}$  et  $l \in \mathbb{R}$ . On suppose qu'il existe  $b, c \in \mathbb{R}$  t.q. que  $b < a < c$  et  $D \supset ]b, a[ \cup ]a, c[$ . Alors,  $f$  admet  $l$  comme limite en  $a$  si et seulement si  $f$  admet  $l$  comme limite à droite et à gauche en  $a$ .

DÉMONSTRATION : Cette démonstration (dans le cas  $D = \mathbb{R} \setminus \{a\}$ ) est laissé en exercice (exercice 1.9). ■

**Proposition 1.5 (Caractérisation séquentielle de la limite à droite)**

Soit  $f$  une application de  $D \subset \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ ,  $a \in \mathbb{R}$  et  $l \in \mathbb{R}$ . On suppose qu'il existe  $c \in \mathbb{R}$  t.q.  $a < c$  et  $D \supset ]a, c[$ . On a alors :

1.  $l$  est la limite à droite en  $a$  de  $f$  si et seulement si  $f$  transforme toute suite convergente vers  $a$ , prenant ses valeurs dans  $D \setminus \{a\}$  et "supérieure" à  $a$ , en suite convergente vers  $l$ , c'est-à-dire :

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D, x_n > a \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l.$$

2.  $l$  est la limite à droite en  $a$  de  $f$  si et seulement si  $f$  transforme toute suite convergente vers  $a$ , prenant ses valeurs dans  $D \setminus \{a\}$  et décroissante, en suite convergente vers  $l$ , c'est-à-dire :

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D, a < x_{n+1} \leq x_n \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l.$$

DÉMONSTRATION :

La démonstration du premier item est très voisine de celle faite pour la proposition 1.2. On reprend donc ici la démonstration de la proposition 1.2.

On suppose tout d'abord que  $l = \lim_{x \rightarrow a, x > a} f(x)$  et on va montrer que  $f$  transforme toute suite convergente vers  $a$ , prenant ses valeurs dans  $D \setminus \{a\}$  et "supérieure" à  $a$ , en suite convergente vers  $l$ .

Soit  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D$  t.q.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$  et  $a < x_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

On veut montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l$ , c'est-à-dire (par définition de la limite d'une suite) que pour tout  $\varepsilon > 0$  il existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  t.q.

$$n \geq n_0 \Rightarrow |f(x_n) - l| \leq \varepsilon. \quad (1.5)$$

Soit donc  $\varepsilon > 0$ . On cherche à montrer l'existence de  $n_0$  donnant (1.5). On commence par remarquer que, comme  $l = \lim_{x \rightarrow a, x > a} f(x)$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q.

$$x \in D, a < x \leq a + \alpha \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon. \quad (1.6)$$

Puis, comme  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$  (et que  $x_n > a$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ), il existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  t.q.

$$n \geq n_0 \Rightarrow a < x_n \leq a + \alpha.$$

On a donc pour  $n \geq n_0$ ,  $x_n \in D$  (car la suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  prend ses valeurs dans  $D$ ) et  $a < x_n \leq a + \alpha$ . Ce qui donne, par (1.6),  $|f(x_n) - l| \leq \varepsilon$ . On a donc bien

$$n \geq n_0 \Rightarrow |f(x_n) - l| \leq \varepsilon.$$

On a donc bien montré que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l$ . Ce qui termine la première partie de la démonstration (c'est-à-dire que  $l = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$  implique que  $f$  transforme toute suite convergente vers  $a$ , prenant ses valeurs dans  $D \setminus \{a\}$  et "supérieure" à  $a$ , en suite convergente vers  $l$ .)

On montre maintenant la réciproque. On suppose que  $f$  transforme toute suite convergente vers  $a$ , prenant ses valeurs dans  $D \setminus \{a\}$  et "supérieure" à  $a$ , en suite convergente vers  $l$ . On veut montrer que  $l = \lim_{x \rightarrow a, x > a} f(x)$ . Pour cela, on va raisonner par l'absurde. On suppose que  $l$  n'est pas la limite à droite en  $a$  de  $f$  (la fonction  $f$  peut alors avoir une limite à droite en  $a$  différente de  $l$  ou bien ne pas avoir de limite à droite en  $a$ ) et on va construire une suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  prenant ses valeurs dans  $D \setminus \{a\}$ , "supérieure" à  $a$ , t.q.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$  et t.q.  $l$  n'est pas limite de  $f(x_n)$  quand  $n \rightarrow +\infty$  (en contradiction avec l'hypothèse).

Comme  $l$  n'est pas la limite à droite en  $a$  de  $f$ , il existe  $\varepsilon > 0$  t.q. pour tout  $\alpha > 0$  il existe  $x$  t.q.

$$x \in D, a < x \leq a + \alpha \text{ et } |f(x) - l| > \varepsilon. \quad (1.7)$$

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . En prenant dans (1.7)  $\alpha = \frac{1}{n+1}$ , on peut donc choisir  $x_n$  t.q.

$$x_n \in D, a < x_n \leq a + \frac{1}{n+1} \text{ et } |f(x_n) - l| > \varepsilon.$$

on obtient ainsi une suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D \setminus \{a\}$ , "supérieure" à  $a$ , tendant vers  $a$ , quand  $n \rightarrow +\infty$ , et dont l'image par  $f$  ne tend vers  $l$ . Ce qui est bien en contradiction avec l'hypothèse que  $f$  transforme toute suite convergente vers  $a$ , prenant ses valeurs dans  $D \setminus \{a\}$  et "supérieure" à  $a$ , en suite convergente vers  $l$ . Ce qui termine la démonstration du premier item de la proposition 1.5.

On montre maintenant le deuxième item. La première partie est immédiate. Si  $l = \lim_{x \rightarrow a, x > a}$ , la fonction  $f$  transforme toute suite convergente vers  $a$ , prenant ses valeurs dans  $D \setminus \{a\}$  et décroissante, en suite convergente vers  $l$  (car une telle suite est nécessairement "supérieure" à  $a$ ). Pour montrer la réciproque, on raisonne une nouvelle fois par l'absurde. On suppose que  $l$  n'est pas la limite à droite en  $a$  de  $f$ . La démonstration du premier item a permis de montrer qu'il existait  $\varepsilon > 0$  et une suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  vérifiant

$$a < x_n, x_n \in D, |f(x_n) - l| > \varepsilon \text{ pour tout } n \in \mathbb{N} \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a.$$

Il suffit de modifier légèrement cette suite pour la rendre décroissante. Pour  $n \in \mathbb{N}$  on pose  $y_n = \min(x_0, \dots, x_n)$ . La suite  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  vérifie alors (en remarquant que  $y_n$  est l'un des  $x_p$  pour  $p \leq n$  et que  $a < y_n \leq x_n$ )

$$a < y_{n+1} \leq y_n, y_n \in D, |f(y_n) - l| > \varepsilon \text{ pour tout } n \in \mathbb{N} \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = a.$$

la suite  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  prend donc ses valeurs dans  $D \setminus \{a\}$ , est décroissante, converge vers  $a$  et la suite  $(f(y_n))_{n \in \mathbb{N}}$  ne converge pas vers  $l$ . Ceci est en contradiction avec l'hypothèse. La démonstration de la proposition 1.5 est terminée. ■

Bien sûr, une caractérisation analogue est possible pour la limite à gauche. Dans le premier item, on remplace "supérieure" par "inférieure" et dans le deuxième item, on remplace "décroissante" par "croissante", voir l'exercice 1.9.

**Exemple 1.1** On prend ici  $D = ]0, \infty[$  et on cherche la limite à droite de  $f$  en 0 dans les deux exemples suivants :

1. Pour  $x \in D$ ,  $f(x) = \sin(\frac{1}{x})$ . Pour cet exemple,  $f$  n'admet pas de limite à droite en 0.
2. Pour  $x \in D$ ,  $f(x) = x \sin(\frac{1}{x})$ . Pour cet exemple,  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} f(x) = 0$ .

**Définition 1.3 (Limite infinie en 1 point, limites en  $\pm\infty$ )**

Soit  $f$  une application de  $D \subset \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ .

1. Soit  $a \in \mathbb{R}$ . On suppose qu'il existe  $b, c \in \mathbb{R}$  t.q.  $D \supset ]b, a[ \cup ]a, c[$  et  $b < a < c$ . On dit que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$  si pour tout  $A \in \mathbb{R}$  il existe  $\alpha > 0$  t.q. :

$$x \in D, x \neq a, |x - a| \leq \alpha \Rightarrow f(x) \geq A.$$

2. Soit  $l \in \mathbb{R}$ . On suppose qu'il existe  $b \in \mathbb{R}$  t.q.  $D \supset ]b, +\infty[$ . On dit que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$  si pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe  $M > 0$  t.q. :

$$x \in D, x \geq M \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon.$$

3. On suppose qu'il existe  $b \in \mathbb{R}$  t.q.  $D \supset ]b, +\infty[$ . On dit que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  si pour tout  $A \in \mathbb{R}$  il existe  $M > 0$  t.q. :

$$x \in D, x \geq M \Rightarrow f(x) \geq A.$$

Bien sûr, des définitions analogues existent avec  $-\infty$  au lieu de  $+\infty$  et, dans le cas du premier item, il est aussi possible de définir des limites infinies à droite et à gauche. Il est suggéré d'écrire de telles définitions.

**Exemple 1.2** On prend ici  $D = ]0, \infty[$   $f(x) = \frac{1}{x^2}$  pour  $x \in D$ . On a alors ;

1.  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} f(x) = +\infty$ ,
2.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

## 1.2 Opérations sur les limites

**Proposition 1.6 (Limite d'une somme, d'un produit et d'un quotient)**

Soit  $f, g$  deux applications de  $D \subset \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a, b, c \in \mathbb{R}$  t.q.  $b < a < c$  et  $D \supset ]b, a[ \cup ]a, c[$ . Soit  $l, m \in \mathbb{R}$  t.q.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$  et  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = m$ . Alors :

1.  $\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) = l + m$ ,
2.  $\lim_{x \rightarrow a} fg(x) = lm$ ,
3. Si  $m \neq 0$ , il existe  $\beta > 0$  t.q.  $]a - \beta, a[ \cup ]a, a + \beta[ \subset D$  et  $g(x) \neq 0$  pour tout  $x \in ]a - \beta, a[ \cup ]a, a + \beta[$  (de sorte que  $f/g$  est bien définie sur  $]a - \beta, a[ \cup ]a, a + \beta[$ ) et on a :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f}{g}(x) = \frac{l}{m}.$$

DÉMONSTRATION : Les items 1 et 3 sont laissés en exercice (exercice 1.10). On montre ici le deuxième item.

On veut montrer que  $\lim_{x \rightarrow a} fg(x) = lm$ , c'est-à-dire que pour tout  $\varepsilon > 0$  il existe  $\alpha > 0$  t.q.

$$x \in D, x \neq a, |x - a| \leq \alpha \Rightarrow |fg(x) - lm| \leq \varepsilon. \quad (1.8)$$

Soit  $\varepsilon > 0$ . On cherche donc  $\alpha > 0$  vérifiant (1.8). Pour  $x \in D$ , on rappelle que  $fg(x) = f(x)g(x)$ . On commence par remarquer que  $fg(x) - lm = fg(x) - lg(x) + lg(x) - lm$ , de sorte que

$$|fg(x) - lm| \leq |f(x) - l||g(x)| + |l||g(x) - m|. \quad (1.9)$$

Comme  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = m$ , il existe  $\alpha_1 > 0$  t.q.

$$x \in D, x \neq a, |x - a| \leq \alpha_1 \Rightarrow |g(x) - m| \leq \frac{\varepsilon}{2(|l| + 1)},$$

de sorte que

$$x \in D, x \neq a, |x - a| \leq \alpha_1 \Rightarrow |l||g(x) - m| \leq \frac{\varepsilon}{2}. \quad (1.10)$$

Il existe aussi  $\alpha_2 > 0$  t.q.

$$x \in D, x \neq a, |x - a| \leq \alpha_2 \Rightarrow |g(x) - m| \leq 1 \Rightarrow |g(x)| \leq |m| + 1,$$

de sorte que

$$x \in D, x \neq a, |x - a| \leq \alpha_2 \Rightarrow |f(x) - l||g(x)| \leq |f(x) - l|(|m| + 1). \quad (1.11)$$

Enfin, comme  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ , il existe  $\alpha_3 > 0$  t.q.

$$x \in D, x \neq a, |x - a| \leq \alpha_3 \Rightarrow |f(x) - l| \leq \frac{\varepsilon}{2(|m| + 1)}. \quad (1.12)$$

On pose maintenant  $\alpha = \min(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) > 0$  et on obtient, grâce aux inégalités (1.9)-(1.12),

$$x \in D, x \neq a, |x - a| \leq \alpha \Rightarrow |fg(x) - lm| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Ce qui est (1.8) et conclut la démonstration. ■

Des résultats analogues à ceux donnés dans la proposition 1.6 sont possibles si  $l = \pm\infty$  et (ou) si  $m = \pm\infty$ .

**Proposition 1.7 (passage à limite dans une inégalité)** Soit  $f, g$  deux applications de  $D \subset \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a, b, c \in \mathbb{R}$  t.q.  $D \supset ]b, a[ \cup ]a, c[$  avec  $b < a < c$ . Soit  $l, m \in \mathbb{R}$  t.q.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$  et  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = m$ . On suppose que  $f(x) \leq g(x)$  pour tout  $x \in D$ . On a alors  $l \leq m$ .

DÉMONSTRATION : On commence par montrer que  $l - m \leq 2\varepsilon$ , pour tout  $\varepsilon > 0$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ . Comme  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ , il existe  $\alpha_1 > 0$  t.q.

$$x \in D, x \neq a, |x - a| \leq \alpha_1 \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon \Rightarrow l - \varepsilon \leq f(x) \leq l + \varepsilon.$$

Comme  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = m$ , il existe  $\alpha_2 > 0$  t.q.

$$x \in D, x \neq a, |x - a| \leq \alpha_2 \Rightarrow |g(x) - m| \leq \varepsilon \Rightarrow m - \varepsilon \leq g(x) \leq m + \varepsilon.$$

On choisit maintenant  $x = a + \alpha$  avec  $\alpha = \min(\alpha_1, \alpha_2, \frac{a+c}{2})$  (de sorte que  $\alpha \leq \alpha_1$ ,  $\alpha \leq \alpha_2$ ,  $x \neq a$  et  $x \in D$ ). On a alors

$$l - \varepsilon \leq f(x) = g(x) \leq m + \varepsilon.$$

On a donc bien montré que  $l - m \leq 2\varepsilon$  pour tout  $\varepsilon > 0$ .

On en déduit que  $l - m \leq 0$ . En effet, si  $l - m > 0$ , on pose  $\varepsilon = \frac{l-m}{4}$  et on obtient  $4\varepsilon = l - m \leq 2\varepsilon$ , ce qui est absurde car  $\varepsilon > 0$ .

Finalement, on a bien montré que  $l \leq m$ . ■

On donne maintenant un résultat (malheureusement un peu compliqué à énoncer) sur la composition de limites.

**Proposition 1.8 (Composition de limites)** Soit  $f, g$  deux applications de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a, b, c \in \mathbb{R}$ . On suppose que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$  et  $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = c$ . On suppose aussi que  $f(x) \neq b$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . Alors,  $\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = c$

DÉMONSTRATION : Soit  $\varepsilon > 0$ . On cherche  $\alpha > 0$  t.q.

$$x \neq a, |x - a| \leq \alpha \Rightarrow |g(f(x)) - c| \leq \varepsilon.$$

On commence par utiliser le fait que  $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = c$ . Ceci donne l'existence de  $\eta > 0$  t.q.

$$y \neq b, |y - b| \leq \eta \Rightarrow |g(y) - c| \leq \varepsilon. \quad (1.13)$$

Puis, comme  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q.

$$x \neq a, |x - a| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - b| \leq \eta.$$

Comme  $f(x) \neq b$  (pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ), on a donc avec (1.13)

$$x \neq a, |x - a| \leq \alpha \Rightarrow |g(f(x)) - c| \leq \varepsilon.$$

On a bien montré que  $\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = c$ . ■

**Remarque 1.1** Dans la proposition 1.8, nous avons pris (pour simplifier l'énoncé) des applications de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . Mais, cette proposition reste vraie si  $f$  est définie que  $D \subset \mathbb{R}$  et  $g$  définie sur  $E \subset \mathbb{R}$  en supposant qu'il existe  $\gamma > 0$  t.q.  $D \supset ]a - \gamma, a[ \cup ]a, a + \gamma[$  et  $E \supset ]b - \gamma, b[ \cup ]b, b + \gamma[$ . Il faut alors commencer par remarquer que  $g \circ f$  est définie sur ensemble qui contient  $]a - \delta, a[ \cup ]a, a + \delta[$  pour un certain  $\delta > 0$ .

## 1.3 Fonctions monotones

### Définition 1.4 (fonctions croissantes)

Soit  $-\infty \leq a < b \leq +\infty$  et  $f$  une application de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$ .

1. On dit que  $f$  est croissante (ou monotone croissante) si :

$$x, y \in ]a, b[, x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y).$$

2. On dit que  $f$  est strictement croissante (ou strictement monotone croissante) si :

$$x, y \in ]a, b[, x < y \Rightarrow f(x) < f(y).$$

De manière analogue, on définit les fonctions décroissantes.

**Proposition 1.9 (Limites d'une fonction monotone)** Soit  $-\infty \leq a < b \leq +\infty$  et  $f$  une application croissante de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$ . On a alors :

1. L'application  $f$  admet en tout point  $c \in ]a, b[$  une limite à droite et une limite à gauche, encadrant  $f(c)$  (c'est-à-dire  $\lim_{x \rightarrow c, x < c} f(x) \leq f(c) \leq \lim_{x \rightarrow c, x > c} f(x)$ ).
2. L'application  $f$  admet une limite (à gauche) finie ou égale à  $+\infty$  en  $b$ , et l'application  $f$  admet une limite (à droite) finie ou égale à  $-\infty$  en  $a$ .

DÉMONSTRATION : Soit  $c \in ]a, b[$ . On va montrer que  $f$  admet une limite à gauche en  $c$  et que cette limite est inférieure ou égale à  $f(c)$ .

On pose  $A = \{f(x), x < c\}$ . L'ensemble  $A$  est une partie non vide de  $\mathbb{R}$ , majorée par  $f(c)$  (car  $f$  est croissante), il admet donc une borne supérieure, que l'on note  $l$ . On a  $l \leq f(c)$  (car  $f(c)$  est un majorant de  $A$ ). On montre maintenant que  $l = \lim_{x \rightarrow c, x < c} f(x)$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ . Comme  $l - \varepsilon$  n'est pas un majorant de  $A$  (puisque  $l$  est le plus petit des majorants de  $A$ ), il existe  $b \in A$  t.q.  $b > l - \varepsilon$ . Il existe donc  $x_0 < c$  t.q.  $f(x_0) = b > l - \varepsilon$ . On pose  $\alpha = c - x_0$ . On a donc  $\alpha > 0$  et, grâce à la croissance de  $f$ ,

$$x_0 \leq x \Rightarrow f(x_0) \leq f(x),$$

et donc, comme  $x_0 = c - \alpha$  et  $f(x_0) = b > l - \varepsilon$ ,

$$c - \alpha \leq x \Rightarrow l - \varepsilon < f(x).$$

Par définition de  $l$  on a aussi

$$x < c \Rightarrow f(x) \leq l.$$

On a donc, finalement,

$$c - \alpha \leq x < c \Rightarrow l - \varepsilon < f(x) \leq l.$$

Ceci prouve que  $l = \lim_{x \rightarrow c, x < c} f(x)$ . On a donc bien montré que  $f$  admet une limite à gauche en  $c$  et que cette limite est inférieure ou égale à  $f(c)$ .

Un raisonnement semblable (non fait ici) permet de montrer que  $f$  admet une limite à droite en  $c$  et que cette limite est supérieure ou égale à  $f(c)$ .

Pour montrer que  $f$  admet une limite à gauche, finie ou égale à  $+\infty$ , en  $b$ , on pose  $\text{Im}(f) = \{f(x), x \in ]a, b[ \}$ .

Si  $\text{Im}(f)$  est majorée, on note  $\beta$  la borne supérieure de  $\text{Im}(f)$ . La croissance de  $f$  permet alors de montrer que  $\beta = \lim_{x \rightarrow b, x < b} f(x)$ . Cette démonstration est laissée ici en exercice.

Si  $\text{Im}(f)$  n'est pas majorée, la croissance de  $f$  permet de montrer que  $\lim_{x \rightarrow b, x < b} f(x) = +\infty$ . Cette démonstration est aussi laissée ici en exercice.

Bien sûr, les démonstrations pour trouver la limite à droite en  $a$  sont très voisines. ■

**Remarque 1.2** Soit  $-\infty \leq a < b \leq +\infty$  et  $f$  une application croissante de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$ . On pose  $\alpha = \lim_{x \rightarrow a, x > a} f(x)$  et  $\beta = \lim_{x \rightarrow b, x < b} f(x)$  (on rappelle que  $\alpha \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$  et  $\beta \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ ). Si  $f$  n'a pas de saut (c'est-à-dire  $\lim_{x \rightarrow c, x < c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c, x > c} f(x)$  pour tout  $c \in ]a, b[$ ), l'application  $f$  est alors une bijection de  $]a, b[$  dans  $] \alpha, \beta [$ . Nous démontrerons cette propriété au chapitre 2, section 2.4.

## 1.4 Exercices

### 1.4.1 Quelques rappels (Parties majorées et minorées, Suites...)

#### Exercice 1.1

Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ . Montrer les implications suivantes :

1.  $(\forall \varepsilon > 0, |a| < \varepsilon) \Rightarrow a = 0$ .

2.  $(\forall \varepsilon > 0, a < b + \varepsilon) \Rightarrow a \leq b$ .
3.  $(\forall \varepsilon > 0, |a - b| < \varepsilon) \Rightarrow a = b$ .

Pour les exercices suivants, on rappelle que si  $A$  est une partie non vide majorée de  $\mathbb{R}$ , il existe un nombre réel, noté  $\sup(A)$ , qui est le plus petit des majorants de  $A$ . De même, si  $A$  est une partie non vide minorée de  $\mathbb{R}$ , il existe un nombre réel, noté  $\inf(A)$ , qui est le plus grand des minorants de  $A$ .

### Exercice 1.2

Soit  $A$  est une partie non vide majorée de  $\mathbb{R}$ . On pose  $-A = \{-a, a \in A\}$ . Montrer que  $-A$  est une partie non vide minorée  $\mathbb{R}$ . Comparer  $\inf(-A)$  et  $\sup(A)$ .

### Exercice 1.3

Soit  $A$  et  $B$  deux parties non vides de  $\mathbb{R}$  t.q.  $A \subset B$ . On suppose que  $B$  est majorée. Montrer que  $A$  est majorée et que  $\sup(A) \leq \sup(B)$ . Cette dernière inégalité est-elle nécessairement stricte si l'inclusion de  $A$  dans  $B$  est stricte ?

### Exercice 1.4

Soit  $A$  et  $B$  deux parties non vides majorées de  $\mathbb{R}$ . On pose  $A + B = \{a + b, a \in A \text{ et } b \in B\}$ . Montrer que  $A + B$  est majorée et comparer  $\sup(A + B)$  et  $\sup(A) + \sup(B)$ .

### Exercice 1.5

1. Montrer que toute suite convergente dans  $\mathbb{R}$  est bornée (c'est-à-dire majorée et minorée).
2. Montrer que toute suite croissante majorée est convergente dans  $\mathbb{R}$ .

### Exercice 1.6

Soit  $A$  une partie non vide de  $\mathbb{R}$ .

1. On suppose que  $A$  est majorée et on pose  $a = \sup(A)$ . Montrer qu'il existe une suite d'éléments de  $A$  qui converge vers  $a$ .
2. On suppose que  $A$  n'est pas majorée. Montrer qu'il existe une suite d'éléments de  $A$  qui converge vers l'infini.

### Exercice 1.7 (Moyennes harmonique et arithmétique)

1. Montrer que, pour tout  $a, b \in \mathbb{R}$  t.q.  $0 < a < b$ , on a :

$$a < \frac{2ab}{a+b} < \frac{a+b}{2} < b.$$

2. Soit  $u_0, v_0 \in \mathbb{R}$  t.q.  $0 < u_0 < v_0$ . On définit, par récurrence, les suites  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  par :

$$u_{n+1} = \frac{2u_n v_n}{u_n + v_n}, \quad v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}.$$

- (a) Montrer que les suites  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont bien définies (c'est-à-dire que  $u_n + v_n \neq 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ) et que les suites  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont convergentes (dans  $\mathbb{R}$ ).
- (b) Montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ .
- (c) Vérifier que la suite  $(u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est constante.
- (d) Donner la limite commune au suites  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

## 1.4.2 Limites

### Exercice 1.8

Soit  $l \in \mathbb{R}$ ,  $a \in \mathbb{R}$ ,  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite et  $f$  une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . Ecrire à l'aide des quantificateurs les phrases suivantes :

1. La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ne tend pas vers  $l$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .
2. La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  tend vers  $+\infty$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .
3.  $f(x)$  ne tend pas vers  $l$  quand  $x$  tend vers  $a$ .
4.  $f(x)$  ne tend pas vers  $l$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$ .

### Exercice 1.9 (Limite, limite à droite et limite à gauche)

Soit  $a \in \mathbb{R}$  et  $l \in \mathbb{R}$ . Soit  $f$  une application définie sur  $A = \mathbb{R} \setminus \{a\}$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ .

1. Montrer que  $f$  admet  $l$  comme limite en  $a$  si et seulement si  $f$  admet (en  $a$ )  $l$  comme limite à droite et comme limite à gauche.
2. Montrer que  $f$  admet  $l$  comme limite à gauche en  $a$  si et seulement si  $f$  vérifie la condition suivante :  
Pour toute suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de points de  $A$ ,

$$x_n \uparrow a, \text{ quand } n \rightarrow +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l,$$

où " $x_n \uparrow a$  quand  $n \rightarrow +\infty$ " signifie " $a = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$  et  $x_{n+1} \geq x_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ".

3. Reprendre les questions 1 et 2 avec  $l = \infty$  et avec  $l = -\infty$ .

### Exercice 1.10 (Opérations sur les limites)

Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  et  $I = ]a, b[$ . Soit  $f$  et  $g$  deux applications de  $I$  dans  $\mathbb{R}$  et  $l, m \in \mathbb{R}$ . On suppose que  $l = \lim_{x \rightarrow a, x > a} f(x)$  et  $m = \lim_{x \rightarrow a, x > a} g(x)$ .

1. Montrer que  $l + m = \lim_{x \rightarrow a, x > a} (f + g)(x)$ .
2. On suppose que  $m \neq 0$ . Montrer qu'il existe  $c \in ]a, b[$  t.q.  $g(x) \neq 0$  pour tout  $x \in J = ]a, c[$ . Montrer que  $\frac{l}{m} = \lim_{x \rightarrow a, x > a} \frac{f(x)}{g(x)}$ .
3. On suppose que  $m = 0$ ,  $l > 0$  et que  $g(x) > 0$  pour tout  $x \in I$ . Montrer que  $\lim_{x \rightarrow a, x > a} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$ .
4. On prend ici  $a = 0$ ,  $b = 1$ ,  $f(x) = \sin(\frac{1}{x})$  et  $g(x) = x$ . Les applications  $fg$  et  $f/g$  (qui est bien définie sur  $I$ ) ont-elles une limite à droite en 0 ?

### Exercice 1.11 (Quelques exemples...)

Pour les exemples suivants, la fonction  $f$  est définie sur  $I = \mathbb{R}$ .

1. On définit  $f$  par  $f(x) = x + \frac{\sqrt{x^2}}{x}$  pour  $x \neq 0$  et  $f(0) = 1$ . L'application  $f$  a-t-elle une limite en 0 ? une limite à droite en 0 ? une limite à gauche en 0 ?

2. On définit  $f$  par  $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1} - (x + 1)$  pour tout  $x$ . Quelle la limite de  $f$  en  $+\infty$  ?
3. On définit  $f$  par  $f(x) = \frac{\sin(\sqrt{x^2})}{x}$  pour  $x \neq 0$  et  $f(0) = 1$ . L'application  $f$  a-t-elle une limite en 0 ? une limite à droite en 0 ? une limite à gauche en 0 ?
4. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on note  $E(x) = \sup\{n \in \mathbb{Z}; n \leq x\}$ . On définit  $f$  par  $f(x) = x - \sqrt{x - E(x)}$  pour tout  $x \neq 0$ . Soit  $n \in \mathbb{Z}$ , L'application  $f$  a-t-elle une limite en  $n$  ? une limite à droite en  $n$  ? une limite à gauche en  $n$  ?

**Exercice 1.12 (Autres exemples...)**

1.  $f(x) = \frac{\sqrt{x^3 - 3x + 2}}{2x^2 - x - 1}$  pour  $x \in ]0, 1[$ . Quelle est la limite (à gauche) de  $f$  en 1 ?
2.  $f(x) = \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{4x+3}}{\sqrt{x+4} - \sqrt{2x+4}}$  pour  $x \in ]0, 1[$ . Quelle est la limite (à droite) de  $f$  en 0 ?
3. Soit  $a > 0$ . On définit  $f$  par  $f(x) = \frac{(1+x)^a}{x}$  pour  $x \in ]0, 1[$ . Quelle est la limite (à droite) de  $f$  en 0 ?
4.  $f(x) = (1 + \sin x)^{\frac{1}{x}}$  pour  $x \in ]0, 1[$ . Quelle est la limite (à droite) de  $f$  en 0 ?

**Exercice 1.13 (Fonction périodique admettant une limite)**

Soit  $f$  une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . on suppose qu'il existe  $T > 0$  t.q.  $f(x + T) = f(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  (on dit alors que  $f$  est périodique de période  $T$ ). On suppose de plus que  $f$  admet une limite finie, notée  $l$ , en  $+\infty$ . Montrer que  $f$  est une fonction constante.

**Exercice 1.14 (Limite en  $+\infty$ )**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x) = \sin(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . La fonction  $f$  admet-elle une limite en  $+\infty$  ?

**Exercice 1.15 (Point fixe d'une application croissante)**

Soit  $I = [0, 1]$  et  $f$  une application croissante de  $I$  dans  $I$ . On pose  $A = \{x \in I, f(x) \leq x\}$ . Montrer que :

1.  $A \neq \emptyset$ ,
2.  $x \in A \Rightarrow f(x) \in A$ .
3.  $A$  possède une borne inférieure  $a \in I$ .
4.  $f(a) = a$ .

(Toute application croissante de  $[0, 1]$  dans  $[0, 1]$  admet donc un point fixe.)

**Exercice 1.16 (Densité de  $\mathbb{Q}$  dans  $\mathbb{R}$ )**

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et tout  $\varepsilon > 0$ , construire  $x_\varepsilon \in \mathbb{Q}$  tel que  $|x - x_\varepsilon| \leq \varepsilon$ .

**Exercice 1.17 (Moyenne de Cesàro)**

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de nombres complexes. On définit la suite  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  par  $v_n = \frac{u_1 + \dots + u_n}{n}$ .

1. Soit  $l \in \mathbb{C}$ . On suppose (dans cette question) que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ . Montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = l$ .
2. On suppose maintenant que  $u_n \in \mathbb{R}$ , pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
  - (a) Montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$  implique  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ .

(b) On suppose que la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante. Soit  $l \in \overline{\mathbb{R}}_+$ , montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = l \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l.$$

3. (Généralisation) Soit  $(\lambda_n)$  une suite de nombres réels strictement positifs. Soit  $l \in \mathbb{C}$ . On suppose que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$  et que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \sum_{k=1}^{k=n} \lambda_k \right) = +\infty.$$

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose

$$w_n = \frac{\sum_{k=1}^{k=n} \lambda_k u_k}{\sum_{k=1}^{k=n} \lambda_k}.$$

Montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = l$ .

4. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \dots + \sqrt[n]{n}}{n} = 1.$$

5. Soit  $l \in \mathbb{C}$ . On suppose que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_{n+1} - u_n) = l$ . Montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{n} = l$ .

## 1.5 Exercices corrigés

### Exercice 1.18 (Corrigé de l'exercice 1.11)

Pour les exemples suivants, la fonction  $f$  est définie sur  $I = \mathbb{R}$ .

1. On définit  $f$  par  $f(x) = x + \frac{\sqrt{x^2}}{x}$  pour  $x \neq 0$  et  $f(0) = 1$ . L'application  $f$  a-t-elle une limite en 0 ? une limite à droite en 0 ? une limite à gauche en 0 ?

—————  
corrigé  
—————

Pour  $x > 0$ , on a  $f(x) = x + 1$ . On a donc  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} f(x) = 1$ . La fonction  $f$  a donc une limite à droite en 0.

Pour  $x < 0$ , on a  $f(x) = x - 1$  (car  $\sqrt{x^2} = -x$ ). On a donc  $\lim_{x \rightarrow 0, x < 0} f(x) = -1$ . La fonction  $f$  a donc une limite à gauche en 0.

Comme  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0, x < 0} f(x)$ , la fonction  $f$  n'a pas de limite en 0.

2. On définit  $f$  par  $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1} - (x + 1)$  pour tout  $x$ . Quelle la limite de  $f$  en  $+\infty$  ?

—————  
corrigé  
—————

Pour  $x > 0$ , on a :

$$f(x) = \frac{(\sqrt{x^2 + x + 1} - (x + 1))(\sqrt{x^2 + x + 1} + (x + 1))}{\sqrt{x^2 + x + 1} + (x + 1)} = \frac{x^2 + x + 1 - (x + 1)^2}{\sqrt{x^2 + x + 1} + (x + 1)},$$

et donc

$$f(x) = \frac{-x}{\sqrt{x^2 + x + 1} + (x + 1)} = -\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1 + \frac{1}{x}}.$$

On en déduit que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\frac{1}{2}$ .

3. On définit  $f$  par  $f(x) = \frac{\sin(\sqrt{x^2})}{x}$  pour  $x \neq 0$  et  $f(0) = 1$ . L'application  $f$  a-t-elle une limite en 0 ? une limite à droite en 0 ? une limite à gauche en 0 ?

---

**corrigé**

---

Pour  $x > 0$ , on a  $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ . La fonction  $\sin$  est dérivable et sa dérivée est la fonction  $\cos$ . La limite à droite en 0 de  $f$  est donc  $\cos(0)$ , c'est-à-dire  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} f(x) = 1$ . La fonction  $f$  a donc une limite à droite en 0.

Pour  $x < 0$ , on a  $f(x) = \frac{\sin(-x)}{x} = -\frac{\sin(x)}{x}$ . On a donc  $\lim_{x \rightarrow 0, x < 0} f(x) = -1$ . La fonction  $f$  a donc une limite à gauche en 0.

Comme  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0, x < 0} f(x)$ , la fonction  $f$  n'a pas de limite en 0.

---

4. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on note  $E(x) = \sup\{n \in \mathbb{Z}; n \leq x\}$ . On définit  $f$  par  $f(x) = x - \sqrt{x - E(x)}$  pour tout  $x \neq 0$ . Soit  $n \in \mathbb{Z}$ , L'application  $f$  a-t-elle une limite en  $n$  ? une limite à droite en  $n$  ? une limite à gauche en  $n$  ?

---

**corrigé**

---

Pour  $x \in [n - 1, n[$ , on a  $E(x) = n - 1$  et donc  $f(x) = x - \sqrt{x - n + 1}$ . On en déduit que  $\lim_{x \rightarrow n, x < n} f(x) = n - 1$ . La fonction  $f$  a donc une limite à gauche en  $n$ .

Pour  $x \in [n, n + 1[$ , on a  $E(x) = n$  et donc  $f(x) = x - \sqrt{x - n}$ . On en déduit que  $\lim_{x \rightarrow n, x > n} f(x) = n$ . La fonction  $f$  a donc une limite à droite en  $n$ .

Comme  $\lim_{x \rightarrow n, x > n} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow n, x < n} f(x)$ , la fonction  $f$  n'a pas de limite en  $n$ .

---

### Exercice 1.19 (Corrigé de l'exercice 1.13)

Soit  $f$  une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . on suppose qu'il existe  $T > 0$  t.q.  $f(x + T) = f(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  (on dit alors que  $f$  est périodique de période  $T$ ). On suppose de plus que  $f$  admet une limite finie, notée  $l$ , en  $+\infty$ . Montrer que  $f$  est une fonction constante.

---

**corrigé**

---

Soit  $x \in \mathbb{R}$ , on va montrer que  $f(x) = l$ . On commence par montrer, par récurrence sur  $n$ , que  $f(x) = f(x + nT)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ . En effet, pour  $n = 1$ , l'hypothèse sur  $f$  donne bien  $f(x) = f(x + T)$ . Puis, soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On suppose que  $f(x) = f(x + nT)$ . L'hypothèse sur  $f$ , utilisée avec le point  $x + nT$ , donne  $f(x + nT) = f(x + nT + T)$ . On en déduit que  $f(x) = f(x + (n + 1)T)$ . On a bien ainsi montré, par récurrence sur  $n$ , que  $f(x) = f(x + nT)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On remarque maintenant que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x + nT) = +\infty$ . Comme  $f$  admet  $l$  comme limite en  $+\infty$ , on a donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x + nT) = l$ , et donc  $f(x) = l$ . Ce qui prouve que  $f$  est la fonction constante et égale à  $l$ .

---

### Exercice 1.20 (Corrigé de l'exercice 1.14)

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x) = \sin(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . La fonction  $f$  admet-elle une limite en  $+\infty$  ?

---

**corrigé**

---

La fonction  $f$  n'a pas de limite en  $+\infty$ . En effet, supposons que  $f$  ait une limite en  $+\infty$ , notée  $l$  (avec  $l \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$ ). Toute suite convergeant vers  $+\infty$  est alors transformée en une suite ayant  $l$  pour limite. En prenant la suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  avec  $x_n = 2n\pi$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on en déduit que  $l = 0$ . Puis, en prenant la suite  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  avec  $y_n = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$ , on en déduit que  $l = 1$ . Ceci prouve que  $f$  n'a pas de limite en  $+\infty$ .

Une autre démonstration possible consiste à utiliser l'exercice 1.19.

---

# Chapitre 2

## Continuité

### 2.1 Définition et propriétés

**Définition 2.1 (Continuité en un point)** Soit  $f$  une application de  $D \subset \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a \in D$ .

1. On dit que  $f$  est continue en  $a$  si pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe  $\delta > 0$  t.q. :

$$x \in D, |x - a| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon.$$

2. On dit que  $f$  est séquentiellement continue en  $a$  si  $f$  transforme toute suite convergente vers  $a$  en suite convergente vers  $f(a)$ , c'est-à-dire :

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D, \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(a).$$

**Remarque 2.1** Sous les hypothèses de la définition 2.1 et si il existe  $b, c \in \mathbb{R}$  t.q.  $b < a < c$  et  $D \supset ]b, a[ \cup ]a, c[$ , il est facile de voir que  $f$  est continue en  $a$  si et seulement si  $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ .

**Théorème 2.1 (Continuité versus continuité séquentielle)** Soit  $f$  une application de  $D \subset \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a \in D$ . Alors,  $f$  continue en  $a$  si et seulement si  $f$  est séquentiellement continue en  $a$ .

DÉMONSTRATION : La démonstration n'est pas détaillée ici. Il suffit essentiellement de reprendre celle de la proposition 1.2. ■

**Remarque 2.2** La continuité en un point est une propriété locale. En effet, Soit  $f$  une application de  $D \subset \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a \in D$ . Soit  $\gamma > 0$ . On pose  $\tilde{D} = D \cap ]a - \gamma, a + \gamma[$ . On appelle  $\tilde{f}$  la restriction de  $f$  à  $\tilde{D}$  (c'est-à-dire que  $\tilde{f}$  est définie sur  $\tilde{D}$  et  $\tilde{f} = f$  sur  $\tilde{D}$ ). Alors,  $f$  est continue en  $a$  si et seulement si  $\tilde{f}$  est continue en  $a$ .

**Définition 2.2 (Continuité)** Soit  $f$  une application de  $D \subset \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . on dit que  $f$  est continue si  $f$  est continue en tout point de  $D$ .

On donne maintenant la définition de la continuité uniforme, plus forte que la continuité.

**Définition 2.3 (Continuité uniforme)** Soit  $f$  une application de  $D \subset \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . on dit que  $f$  est uniformément continue si pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe  $\delta > 0$  t.q. :

$$x, y \in D, |x - y| \leq \delta \Rightarrow |f(y) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

**Exemple 2.1** On prend ici  $D = ]0, 1[$  et  $f(x) = \frac{1}{x}$  pour  $x \in ]0, 1[$ . L'application  $f$  est continue (c'est-à-dire continue en tout point de  $D$ ) mais n'est pas uniformément continue.

**Proposition 2.1 (Somme, produit et quotient d'applications continues)** Soit  $f, g$  deux applications de  $D \subset \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a \in D$ . On suppose que  $f$  et  $g$  sont continues en  $a$ . Alors :

1. L'application  $f + g$  est continue en  $a$ ,
2. L'application  $fg$  est continue en  $a$ ,
3. Il existe  $\beta > 0$  t.q.  $g(x) \neq 0$  pour  $x \in D \cap ]a - \beta, a + \beta[$  et  $f/g$  (qui est bien définie pour  $x \in D \cap ]a - \beta, a + \beta[$ ) est continue en  $a$ .

DÉMONSTRATION : Ici aussi, il suffit essentiellement de reprendre la démonstration de la proposition 1.6. ■

**Proposition 2.2 (Continuité de la composée)** Soit  $f$  une application de  $D \subset \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $g$  une application de  $E \subset \mathbb{R}$  de  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $\text{Im}(f) = \{f(x), x \in D\} \subset E$  (de sorte que  $g \circ f$  est définie sur  $D$ ). Soit  $a \in D$ . On suppose que  $f$  est continue en  $a$  et  $g$  est continue en  $f(a)$ . Alors,  $g \circ f$  est continue en  $a$ .

DÉMONSTRATION : Ici aussi, il suffit essentiellement de reprendre la démonstration de la proposition 1.8. ■

## 2.2 Théorème des valeurs intermédiaires

**Théorème 2.2 (Théorème des valeurs intermédiaires)** Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ , et  $f$  une application continue de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . Alors, l'application  $f$  prend toutes les valeurs comprises entre  $f(a)$  et  $f(b)$  (c'est-à-dire que pour tout  $\gamma$  appartenant à l'intervalle dont les bornes sont  $f(a)$  et  $f(b)$ , il existe  $c \in [a, b]$  t.q.  $f(c) = \gamma$ ).

DÉMONSTRATION : On distingue deux cas possibles.

**Premier cas.** On suppose que  $f(a) \leq f(b)$ . Soit  $\gamma \in [f(a), f(b)]$ . On pose  $A = \{x \in [a, b] \text{ t.q. } f(x) \leq \gamma\}$ . L'ensemble  $A$  est non vide (car il contient  $a$ ) et est majoré par  $b$ . Il admet donc une borne supérieure que nous notons  $c$ . On a, bien sûr,  $a \leq c \leq b$  ( $a \in A$  et  $b$  est un majorant de  $A$ ). On va montrer que  $f(c) = \gamma$ .

On commence par remarquer qu'il existe une suite  $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de points de  $A$  t.q.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = c$  (voir, par exemple, l'exercice 1.6). Par continuité de  $f$  en  $c$ , on a donc  $f(c) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(c_n)$  et donc, comme  $f(c_n) \leq \gamma$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on en déduit  $f(c) \leq \gamma$ .

On suppose maintenant que  $f(c) < \gamma$  (et on va montrer que ceci est impossible). On a donc  $c < b$  (car  $f(b) \geq \gamma$ ). On pose  $\varepsilon = \gamma - f(c) > 0$ . Par continuité de  $f$  en  $c$ , il existe donc  $\alpha > 0$  t.q.

$$x \in [a, b], |x - c| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - f(c)| \leq \varepsilon.$$

On a donc, en particulier, avec  $\beta = \min(\alpha, b - c) > 0$ ,

$$c \leq x \leq c + \beta \Rightarrow f(x) \leq f(c) + \varepsilon = \gamma.$$

Ceci prouve que (par exemple)  $c + \beta \in A$ , en contradiction avec la définition de  $c$  (qui est  $c = \sup A$ ). On a ainsi montré que  $f(c)$  n'est pas strictement inférieur à  $\gamma$ . On a donc  $f(c) = \gamma$ .

**Deuxième cas.** On suppose que  $f(a) > f(b)$ . Soit  $\gamma \in [f(b), f(a)]$ . On montre alors qu'il existe  $c \in [a, b]$  t.q.  $f(c) = \gamma$  par un raisonnement semblable au précédent en prenant  $A = \{x \in [a, b] \text{ t.q. } f(x) \geq \gamma\}$ . Ce raisonnement n'est pas détaillé ici. ■

**Remarque 2.3** Voici deux conséquences immédiates du théorème des valeurs intermédiaires.

1. Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ , et  $f$  une application continue de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . Alors  $\{f(x), x \in [a, b]\}$  contient l'intervalle dont les bornes sont  $f(a)$  et  $f(b)$ .
2. Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f$  une application continue de  $I$  dans  $\mathbb{R}$ . Alors,  $f$  vérifie la "propriété des valeurs intermédiaires", c'est à dire : Pour tout  $a, b \in I$ ,  $a < b$ ,  $\{f(x), x \in [a, b]\}$  contient l'intervalle dont les bornes sont  $f(a)$  et  $f(b)$ .

**Remarque 2.4** Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f$  une application de  $I$  dans  $\mathbb{R}$ . La remarque précédente montre que la continuité de  $f$  implique que  $f$  vérifie la propriété des valeurs intermédiaires. La réciproque est fautive, c'est-à-dire que le fait que  $f$  vérifie la propriété des valeurs intermédiaires n'implique pas la continuité de  $f$ . (La propriété des valeurs intermédiaires peut être présentée comme une sorte de continuité avec la notion d'ordre dans  $\mathbb{R}$ , alors que la continuité fait plutôt appel à la notion de distance.) Nous verrons au chapitre 3 que si  $f$  est dérivable de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$ , alors  $f'$  vérifie la propriété des valeurs intermédiaires mais n'est pas toujours continue.

## 2.3 Fonction continue sur un intervalle fermé borné

**Théorème 2.3 (fonction continue sur un compact)** Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ , et  $f$  une application continue de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . Alors, l'application  $f$  est bornée et atteint ses bornes. (c'est-à-dire qu'il existe  $m, M \in \mathbb{R}$  et  $c, d \in [a, b]$  t.q.  $f(c) = m$ ,  $f(d) = M$  et, pour tout  $x \in [a, b]$ ,  $m \leq f(x) \leq M$ .)

DÉMONSTRATION :

**Étape 1** On montre tout d'abord que  $f$  est majorée (c'est-à-dire que  $\text{Im}(f) = \{f(x), x \in [a, b]\}$  est majorée). Pour cela, on raisonne par l'absurde. On suppose donc que  $f$  n'est pas majorée.

Soit  $n \in \mathbb{N}$ , comme  $f$  n'est pas majorée, l'ensemble  $A_n = \{x \in [a, b] \text{ t.q. } f(x) \geq n\}$  est non vide. Comme cet ensemble est majoré par  $b$ , il admet une borne supérieure, notée  $x_n$ , et on a  $x_n \in [a, b]$ . On sait aussi que  $x_n$  est limite d'une suite de point de  $A_n$ . Comme  $f$  est continue en  $x_n$ , on a donc  $f(x_n) \geq n$ .

La suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante (car  $A_{n+1} \subset A_n$ ) et minorée (par  $a$ ). Elle est donc convergente dans  $\mathbb{R}$ . On pose  $x = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ . Comme  $a \leq x_n \leq b$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a aussi  $a \leq x \leq b$ , et comme  $f$  est continue en  $x$ , on a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x)$ , ce qui est impossible car  $f(x_n) \geq n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  (et donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = +\infty$ ).

On a donc montré que  $f$  est majorée. Un raisonnement similaire non fait ici permet de montrer que  $f$  est minorée.

**Étape 2** On note  $M = \sup\{\text{Im}(f)\}$ . On montre maintenant qu'il existe  $d \in [a, b]$  t.q.  $f(d) = M$ . Pour cela, on utilise un raisonnement semblable à celui de la première étape.

Soit  $n \in \mathbb{N}$ , On pose  $M_n = M - \frac{1}{n}$  et  $B_n = \{x \in [a, b] \text{ t.q. } f(x) \geq M_n\}$ . Comme  $M_n$  n'est pas un majorant de  $\text{Im}(f)$ , l'ensemble  $B_n$  est non vide. Comme cet ensemble est majoré par  $b$ , il admet une borne supérieure, notée  $y_n$ , et on a  $y_n \in [a, b]$ . Comme  $y_n$  est limite d'une suite de point de  $B_n$  et que  $f$  est continue en  $y_n$ , on a donc  $f(y_n) \geq M_n$ . (On a aussi  $f(y_n) \leq M$  car  $M = \sup\{\text{Im}(f)\}$ .)

La suite  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante (car  $B_{n+1} \subset B_n$ ) et minorée (par  $a$ ). Elle est donc convergente dans  $\mathbb{R}$ . On pose  $d = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$ . Comme  $a \leq y_n \leq b$ , pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a aussi  $a \leq d \leq b$  et, comme  $f$  est continue en  $d$ , on a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(y_n) = f(d)$ . On en déduit que  $f(d) = M$  en passant à la limite sur les inégalités  $M_n = M - \frac{1}{n} \leq f(y_n) \leq M$ .

Un raisonnement similaire non fait ici permet de montrer qu'il existe  $c \in [a, b]$  t.q.  $f(c) = m = \inf(\text{Im}(f))$ . ■

**Exemple 2.2** On prend ici  $I = ]0, 1[$  et  $f(x) = 1/x$  pour  $x \in ]0, 1[$ . Pour cet exemple, l'application  $f$  est non majorée et elle est minorée mais sa borne inférieure est non atteinte.

Le théorème 2.2 permet de montrer que l'image d'un intervalle par une application continue est un intervalle. Avec le théorème 2.3, on a même que l'image par une application continue d'un intervalle fermé borné est un intervalle fermé borné. Ceci est donné dans le théorème 2.4.

### **Théorème 2.4 (Image d'un intervalle par une application continue)**

Soit  $I$  intervalle (non vide) de  $\mathbb{R}$  et  $f$  une application continue de  $I$  dans  $\mathbb{R}$ . On pose  $\text{Im}(f) = \{f(x), x \in I\}$ . Alors :

1. L'ensemble  $\text{Im}(f)$  est un intervalle. (Autrement dit, l'image par une application continue d'un intervalle est un intervalle.)
2. Si  $I = [a, b]$  avec  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ , on a  $\text{Im}(f) = [m, M]$  avec  $m, M \in \mathbb{R}$  (on peut noter que  $m = \inf(\text{Im}(f))$  et  $M = \sup(\text{Im}(f))$ ). (Autrement dit, l'image par une application continue d'un intervalle fermé borné est un intervalle fermé borné.)

DÉMONSTRATION :

On montre tout d'abord le 1er item du théorème. Si  $\text{Im}(f)$  est minorée, on pose  $\alpha = \inf(\text{Im}(f))$ . Si  $\text{Im}(f)$  n'est pas minorée, on pose  $\alpha = -\infty$  (dans ce cas, on pose aussi  $\inf(\text{Im}(f)) = -\infty$ ). De même, si  $\text{Im}(f)$  est majorée, on pose  $\beta = \sup(\text{Im}(f))$ . Si  $\text{Im}(f)$  n'est pas majorée, on pose  $\beta = +\infty$  (dans ce cas, on pose aussi  $\sup(\text{Im}(f)) = +\infty$ ).

La définition de  $\alpha$  et  $\beta$  donne donc immédiatement que  $\text{Im}(f) \subset [\alpha, \beta]$ . Pour montrer que  $\text{Im}(f)$  est un intervalle, il suffit de montrer que  $] \alpha, \beta [ \subset \text{Im}(f)$ .

Soit  $\gamma \in ] \alpha, \beta [$ . Comme  $\gamma$  n'est pas un minorant de  $\text{Im}(f)$ , il existe  $a \in I$  t.q.  $f(a) < \gamma$ . De même, Comme  $\gamma$  n'est pas un majorant de  $\text{Im}(f)$ , il existe  $b \in I$  t.q.  $f(b) > \gamma$ . le nombre  $\gamma$  est donc compris entre  $f(a)$  et  $f(b)$ . Comme  $f$  est continue sur l'intervalle fermé borné dont les bornes sont  $a$  et  $b$ , le théorème des valeurs intermédiaires (théorème 2.2) donne qu'il existe  $x$  entre  $a$  et  $b$  (et donc  $x$  dans  $I$ ) t.q.  $f(x) = \gamma$ . On a donc bien montré que  $] \alpha, \beta [ \subset \text{Im}(f)$  et donc que  $\text{Im}(f)$  est un intervalle (c'est un intervalle dont les bornes sont  $\alpha$  et  $\beta$ ).

On montre maintenant le deuxième item du théorème. Le théorème 2.3 montre qu'il existe  $m, M \in \mathbb{R}$  et  $c, d \in [a, b]$  t.q.  $f(c) = m$ ,  $f(d) = M$  et que  $\text{Im}(f) \subset [m, M]$ . Puis le théorème des valeurs intermédiaires (théorème 2.2) montre que pour tout  $\gamma \in [m, M]$ , il existe  $x$  entre  $c$  et  $d$  (et donc  $x \in [a, b]$ ) t.q.  $f(x) = \gamma$ . On en déduit que  $\text{Im}(f) = [m, M]$ . ■

## 2.4 Fonction strictement monotone et continue

**Théorème 2.5** Soit  $I$  un intervalle (de  $\mathbb{R}$ ) dont les extrémités sont  $a$  et  $b$ , avec  $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ , et  $f$  une application strictement croissante, continue, de  $I$  dans  $\mathbb{R}$ . On pose  $\text{Im}(f) = \{f(x), x \in I\}$ ,  $\alpha = \inf(\text{Im}(f))$  (avec  $\inf(\text{Im}(f)) = -\infty$  si  $\text{Im}(f)$  est non minorée),  $\beta = \sup(\text{Im}(f))$  (avec  $\sup(\text{Im}(f)) = +\infty$  si  $\text{Im}(f)$  est non majorée). Alors :

1.  $\text{Im}(f)$  est un intervalle dont les extrémités sont  $\alpha$  et  $\beta$ . On note  $J$  cet intervalle.
2. Si  $I = ]a, b[$ , on a alors  $J = ]\alpha, \beta[$ .
3. L'application  $f$  est bijective de  $I$  dans  $J$ .
4. On note  $g$  la fonction réciproque de  $f$  (c'est-à-dire  $g$  définie de  $J$  dans  $I$  t.q.  $g \circ f(x) = x$  pour tout  $x \in I$  et  $f \circ g(x) = x$  pour tout  $x \in J$ ). L'application  $g$  est continue et strictement croissante (de  $J$  dans  $I$ ).

DÉMONSTRATION :

1. Le théorème 2.4 donne que  $\text{Im}(f)$  est un intervalle. La définition de  $\alpha$  et  $\beta$  donne alors que les extrémités de cet intervalle sont  $\alpha$  et  $\beta$ .
2. Pour montrer que  $\text{Im}(f) = ]\alpha, \beta[$  (lorsque  $I = ]a, b[$ ), il suffit de montrer que  $\alpha \notin \text{Im}(f)$  et  $\beta \notin \text{Im}(f)$ . Pour cela, on raisonne par l'absurde. On suppose que  $\alpha \in \text{Im}(f)$ . Il existe alors  $c \in ]a, b[$  t.q.  $f(c) = \alpha$  (et donc  $\alpha \in \mathbb{R}$ ). Mais, en prenant  $y \in ]a, c[$ , on a alors, grâce à la stricte croissance de  $f$ ,  $f(y) < f(c) = \alpha$ , ce qui est contradictoire avec la définition de  $\alpha$ . Donc,  $\alpha \notin \text{Im}(f)$ . De manière analogue, on peut montrer que  $\beta \notin \text{Im}(f)$ . On a bien ainsi montré que  $\text{Im}(f) = ]\alpha, \beta[$ .
3. La fonction  $f$  est surjective de  $I$  dans  $J$  (car  $J = \text{Im}(f)$ ). Il reste à montrer que  $f$  est injective, mais ceci est une conséquence simple de la stricte croissance de  $f$ . En effet, soit  $x, y \in I$ ,  $x \neq y$ . Si  $x > y$ , on a  $f(x) > f(y)$ . Si  $x < y$ , on a  $f(x) < f(y)$ . Dans les deux cas, on a donc  $f(x) \neq f(y)$ , ce qui prouve l'injectivité de  $f$ . L'application  $f$  est donc bien une bijection de  $I$  dans  $J$ .
4. On note  $g$  la fonction réciproque de  $f$  ( $g$  est donc définie de  $J$  dans  $I$ ). On remarque tout d'abord que  $g$  est strictement croissante. En effet, soit  $x, y \in J$ ,  $x < y$ . Si  $g(x) \geq g(y)$ , on a, par la croissance de  $f$ ,  $x = f(g(x)) \geq f(g(y)) = y$ , ce qui est impossible. On a donc  $g(x) < g(y)$ , ce qui prouve que  $g$  est strictement croissante. Il reste à montrer que  $g$  est continue en tout point de  $J$ . Soit  $\alpha < \gamma < \beta$ . Comme  $g$  est croissante,  $g$  admet des limites à droite et à gauche en  $\gamma$ , notées  $g_l(\gamma)$  et  $g_r(\gamma)$ , et ces limites encadrent  $g(\gamma)$  (proposition 1.9). Plus précisément :

$$\lim_{x \rightarrow \gamma, x < \gamma} g(x) = \sup\{g(x), x < \gamma\} = g_l(\gamma) \leq g(\gamma) \leq g_r(\gamma) = \inf\{g(x), x > \gamma\} = \lim_{x \rightarrow \gamma, x > \gamma} g(x).$$

Mais, comme  $\text{Im}(g)$  est un intervalle (car  $\text{Im}(g) = I$ ) l'ensemble  $[g_l(\gamma), g_r(\gamma)]$  est inclus dans  $\text{Im}(g)$ , ce qui n'est possible que si  $g_l(\gamma) = g_r(\gamma)$ . On a donc  $g_l(\gamma) = g(\gamma) = g_r(\gamma)$ , ce qui prouve que  $g$  est continue en  $\gamma$ . Un raisonnement analogue prouve que  $g$  est continue en  $\alpha$  si  $\alpha \in J$  (on considère alors la limite à droite de  $g$  en  $\alpha$  et on montre qu'elle est égale à  $a$ ) et que  $g$  est continue en  $\beta$  si  $\beta \in J$  (on considère alors la limite à gauche de  $g$  en  $\beta$  et on montre qu'elle est égale à  $b$ ). Ceci termine la démonstration de ce théorème. ■

## 2.5 Exercices

### Exercice 2.1 (Fonction continue, non nulle en un point)

Soit  $f$  une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est continue en  $a$  et que  $f(a) \neq 0$ . Montrer que  $f$  est non nulle sur un intervalle ouvert contenant  $a$ .

### Exercice 2.2 (Fonction lipschitzienne)

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  et  $k \in \mathbb{R}_+$ . On suppose que  $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$  pour tout  $x, y \in \mathbb{R}$ . Montrer que  $f$  est continue (sur tout  $\mathbb{R}$ ).

### Exercice 2.3

Pour quelle valeur de  $\alpha$  la fonction  $f$ , définie ci-après, est-elle continue sur  $\mathbb{R}$  ?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 8}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ \alpha & \text{si } x = 2. \end{cases}$$

### Exercice 2.4 (Fonctions monotones)

Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  et  $I = ]a, b[$ . Soit  $f$  une application strictement croissante de  $I$  dans  $\mathbb{R}$ . On pose  $A = \{f(x), x \in I\}$ ,  $\alpha = \inf A$  et  $\beta = \sup A$ . (Si  $A$  est non minorée, on pose  $\inf A = -\infty$ . Si  $A$  est non majorée, on pose  $\sup A = +\infty$ .)

1. Montrer que  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$  (on pourra distinguer les cas  $\alpha \in \mathbb{R}$  et  $\alpha = -\infty$ ). Montrer que  $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \beta$ .
2. Soit  $c \in I$ . Montrer que  $f$  admet une limite à droite en  $c$ , notée  $f_d(c)$ , et une limite à gauche en  $c$ , notée  $f_g(c)$ . Montrer que  $f_g(c) \leq f(c) \leq f_d(c)$ .
3. On suppose que  $f_d(c) = f_g(c)$  pour tout  $c \in I$  (avec  $f_d$  et  $f_g$  définies à la question précédente). Montrer que  $f$  est continue et que  $f$  est bijective de  $]a, b[$  dans  $]\alpha, \beta[$ .

### Exercice 2.5 (Polynôme de degré impair)

Montrer que toute fonction polynôme de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , de degré impair, s'annule en au moins un point.

### Exercice 2.6 (Existence d'un maximum)

Soit  $f$  une fonction continue de  $\mathbb{R}_+$  dans  $\mathbb{R}_+$ . On suppose que  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ . Montrer que  $f$  admet un maximum (c'est-à-dire qu'il existe  $a \in \mathbb{R}_+$  t.q., pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $f(x) \leq f(a)$ ).

### Exercice 2.7 (Injectivité et continuité donne monotonie)

Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ , et  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue et injective. Montrer que  $f$  est monotone. [Utiliser le théorème des valeurs intermédiaires.]

### Exercice 2.8 (Prolongement par continuité)

Soit  $f$  l'application de  $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$  dans  $\mathbb{R}$  définie par :

$$f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{1 - |x|}.$$

1. La fonction  $f$  est-elle continue en 0 ?

- Calculer  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ .
- Existe-t-il une fonction  $g$  définie et continue sur  $\mathbb{R}$  et qui est égale à  $f$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$  ?

**Exercice 2.9**

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions de  $[0, 1]$  dans  $\mathbb{R}$ , continues et t.q.  $f(0) = g(1) = 0$  et  $g(0) = f(1) = 1$ . Montrer que :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}_+, \exists x \in [0, 1], f(x) = \lambda g(x).$$

**Exercice 2.10 (Valeur intermédiaire)**

Soit  $f$  une fonction continue de  $[0, 1]$  dans  $\mathbb{R}$ .

- Montrer que pour tout  $t \in [0, 1]$ , l'ensemble  $\{s \in [0, 1] \text{ t.q. } f(s) = \frac{f(0)+f(t)}{2}\}$  est non vide.  
Pour  $t \in [0, 1]$ , on pose  $\varphi(t) = \inf\{s \in [0, 1] \text{ t.q. } f(s) = \frac{f(0)+f(t)}{2}\}$ .
- Soit  $t \in [0, 1]$ , montrer que  $\varphi(t) \in [0, 1]$  et que  $f(\varphi(t)) = \frac{f(0)+f(t)}{2}$ .
- Montrer que si  $f$  est strictement croissante, l'application  $\varphi$  ainsi définie de  $[0, 1]$  dans  $[0, 1]$  est continue.
- Donner un exemple de fonction  $f$  pour lequel la fonction  $\varphi$  n'est pas continue.

**Exercice 2.11 (Fonction dont l'image est discrète)**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue (c'est-à-dire continue en tout point de  $\mathbb{R}$ ). On suppose que  $f(x) \in \{0, 1\}$ , pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . Montrer que  $f$  est constante. [utiliser le théorème des valeurs intermédiaires.]

**Exercice 2.12 (Continuité de "max" et "min")**

- Montrer que, pour tout  $x, y \in \mathbb{R}$ ,  $\max\{x, y\} = \frac{1}{2}(x + y + |x - y|)$  et  $\min\{x, y\} = \frac{1}{2}(x + y - |x - y|)$ .
- Soit  $f$  et  $g$  deux applications de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On définit les applications  $f \top g$  et  $f \perp g$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  par :

$$(f \top g)(x) = \max\{f(x), g(x)\}, (f \perp g)(x) = \min\{f(x), g(x)\}, \text{ pour } x \in \mathbb{R}.$$

Soit  $a \in \mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  et  $g$  sont continues en  $a$ . Montrer que  $f \top g$  et  $f \perp g$  sont continues en  $a$ .

**Exercice 2.13 (Convexe implique continu)**

Soit  $f$  une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est convexe, c'est à dire que  $f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y)$  pour tout  $t \in [0, 1]$  et pour tout  $x, y \in \mathbb{R}$ .

On pose  $\alpha = f(1) - f(0)$ ,  $\beta = f(0) - f(-1)$  et  $\gamma = \max\{|\alpha|, |\beta|\}$ .

- Soit  $x \in ]0, 1[$ . Montrer que  $\beta x \leq f(x) - f(0) \leq \alpha x$ . [Utiliser le fait que  $x = t1 + (1 - t)0$ , avec  $t = x$ , et  $0 = tx + (1 - t)(-1)$ , avec  $t = \frac{1}{1+x}$ .]
- Soit  $x \in ]-1, 1[$ . Montrer que  $|f(x) - f(0)| \leq \gamma|x|$ . En déduire que  $f$  est continue en 0.
- Montrer que  $f$  est continue en tout point de  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 2.14 (Borne supérieure atteinte)**

Soit  $f$  une application continue de  $\mathbb{R}_+$  dans  $\mathbb{R}_+$  (on rappelle que  $\mathbb{R}_+ = [0, \infty[$ ). On suppose que  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ . Montrer que  $\{f(x), x \in \mathbb{R}_+\}$  est majoré est qu'il existe  $a \in \mathbb{R}_+$  t.q.  $f(a) = \sup\{f(x), x \in \mathbb{R}_+\}$ .

**Exercice 2.15 (Exercice sur les valeurs intermédiaires)**

Soit  $f$  une application continue de  $[0, 1]$  dans  $\mathbb{R}$  t.q.  $f(0) = f(1)$ . Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . pour  $x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$ , on pose  $g(x) = f(x + \frac{1}{n}) - f(x)$ .

1. Montrer que  $\sum_{k=0}^{n-1} g(\frac{k}{n}) = 0$ .
2. Montrer qu'il existe  $x_0, x_1 \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$  t.q.  $g(x_0) \leq 0$  et  $g(x_1) \geq 0$ .
3. Montrer qu'il existe  $x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$  t.q.  $f(x + \frac{1}{n}) = f(x)$ .

**Exercice 2.16 (Prolongement par continuité)**

Pour  $x \in ]0, 1[$ , on pose  $f(x) = \frac{x}{\ln(x)}$ . Peut on prolonger  $f$  par continuité en 0 et en 1 ?

**Exercice 2.17 (Point fixe)**

Soit  $f$  une fonction continue de  $[0, 1]$  dans  $[0, 1]$  et vérifiant

$$\forall x_1, x_2 \in [0, 1], |x_1 - x_2| \leq |f(x_1) - f(x_2)|.$$

1. Montrer que  $f$  est injective.
2. Montrer que  $\{f(0), f(1)\} = \{0, 1\}$ .
3. Montrer que  $f$  est surjective.
4. Montrer que  $f$  admet un point fixe.

**Exercice 2.18 (Equation fonctionnelle)**

Soit  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}_+$ , à valeurs dans  $\mathbb{R}$  et vérifiant l'équation fonctionnelle suivante :

$$\text{Pour tout } x, y \in \mathbb{R}_+, f(x + y) = f(x)f(y).$$

1. Montrer que  $f$  est à valeurs positives ou nulles.
2. Montrer que si  $f(0) = 0$  alors  $f$  est identiquement nulle.

*Dans ce qui suit on suppose que  $f$  n'est pas identiquement nulle.*

3. Calculer  $f(0)$ .
4. Soit  $x \in \mathbb{R}_+$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ , exprimer  $f(nx)$  et  $f(\frac{x}{n})$  en fonction de  $f(x)$  et  $n$ .
5. Soit  $x \in \mathbb{R}_+$  et  $p, q$  deux entiers naturels strictement positifs. On pose  $r = \frac{p}{q}$ , En calculant  $f(q(rx))$  de deux manières différentes, exprimer  $f(rx)$  en fonction de  $f(x)$  et  $r$ .
6. *Dans cette question on suppose qu'il existe  $\alpha > 0$  tel que  $f(\alpha) = 0$ .*
  - (a) Construire une suite  $(x_n)$  de réels strictement positifs convergeant vers 0 et telle que  $f(x_n) = 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

(b) Montrer que la fonction  $f$  est nulle sur  $\mathbb{R}^{+*}$ .

Dans ce qui suit on suppose que  $f$  est à valeurs strictement positives.

7. On suppose dans cette question que  $f$  est continue à droite sur  $\mathbb{R}_+$ . Montrer qu'il existe un réel  $a$  tel que  $f(x) = e^{ax}$  pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ .
8. On suppose que  $f$  est continue à droite en 0, montrer que  $f$  est continue à droite en tout point de  $\mathbb{R}_+$  et conclure qu'il existe un réel  $a$  tel que  $f(x) = e^{ax}$  pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ .
9. On suppose qu'il existe deux réels  $A, B$  vérifiant  $0 \leq A < B$  tels que  $f$  soit majorée sur  $[A, B]$ .
  - (a) Montrer que sur  $[0, B - A]$ ,  $f$  est minorée de borne inférieure strictement positive.
  - (b) Montrer que  $f$  est continue à droite de 0.
  - (c) Montrer qu'il existe un réel  $a$  tel que  $f(x) = e^{ax}$  pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ .

### Exercice 2.19 (Croissance et continuité)

Soit  $-\infty \leq a < b \leq +\infty$  et  $f$  une fonction croissante de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$ . Montrer que  $f$  est continue si et seulement si  $\text{Im}(f)$  est un intervalle.

## 2.6 Exercices corrigés

### Exercice 2.20 (Corrigé de l'exercice 2.1)

Soit  $f$  une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est continue en  $a$  et que  $f(a) \neq 0$ . Montrer que  $f$  est non nulle sur un intervalle ouvert contenant  $a$ .

---

corrigé

---

On pose  $\delta = |f(a)|$ . Comme  $\delta > 0$  et que  $f$  est continue en  $a$ , il existe  $\gamma > 0$  t.q. :

$$x \in \mathbb{R}, |x - a| \leq \gamma \Rightarrow |f(x) - f(a)| \leq \frac{\delta}{2} \Rightarrow f(a) - \frac{\delta}{2} \leq f(x) \leq f(a) + \frac{\delta}{2}.$$

Si  $f(a) > 0$ , on a donc  $f(x) \geq \frac{f(a)}{2} > 0$ , pour tout  $x \in ]a - \gamma, a + \gamma[$ .

Si  $f(a) < 0$ , on a  $f(x) \leq \frac{f(a)}{2} < 0$ , pour tout  $x \in ]a - \gamma, a + \gamma[$ .

Dans les deux cas ( $f(a) > 0$  et  $f(a) < 0$ ) on a donc :

$$x \in ]a - \gamma, a + \gamma[ \Rightarrow f(x) \neq 0.$$

ce qui répond à la question car  $]a - \gamma, a + \gamma[$  est un intervalle ouvert contenant  $a$ .

---

### Exercice 2.21 (Corrigé de l'exercice 2.2)

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  et  $k \in \mathbb{R}_+$ . On suppose que  $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$  pour tout  $x, y \in \mathbb{R}$ . Montrer que  $f$  est continue (sur tout  $\mathbb{R}$ ).

---

corrigé

---

Soit  $\varepsilon > 0$ . On choisit  $\eta = \frac{\varepsilon}{k+1}$ . On a donc  $\eta > 0$  et :

$$x, y \in \mathbb{R}, |x - y| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq k\eta = \frac{k\varepsilon}{k+1} \leq \varepsilon.$$

Ceci prouve que  $f$  est uniformément continue sur  $\mathbb{R}$  (et donc, en particulier, continue en tout point de  $\mathbb{R}$ ).

---

**Exercice 2.22 (Corrigé de l'exercice 2.3)**

Pour quelle valeur de  $\alpha$  la fonction  $f$ , définie ci-après, est-elle continue sur  $\mathbb{R}$  ?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-8}{x-2} & \text{si } x \neq 2 \\ \alpha & \text{si } x = 2. \end{cases}$$

---

**corrigé**

---

La fonction  $f$  est continue en tout point différent de 2 (car c'est le quotient de deux fonctions continues et le dénominateur en non nul).

le seul problème est donc la continuité en 2. On remarque que  $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$  et donc, pour  $x \neq 2$ ,  $f(x) = \frac{x^3-8}{x-2} = x^2 + 2x + 4$ . Ceci permet de montrer que  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 12$  et donc que  $f$  est continue en 2 si et seulement si  $\alpha = 12$ .

La fonction  $f$  est donc continue sur  $\mathbb{R}$  si et seulement si  $\alpha = 12$ .

---

**Exercice 2.23 (Corrigé de l'exercice 2.5)**

Montrer que toute fonction polynôme de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , de degré impair, s'annule en au moins un point.

---

**corrigé**

---

Soit  $p$  un polynôme de degré impair et  $n \in \mathbb{N}^*$  le degré de ce polynôme. Il existe donc  $a \neq 0$  et  $q$  polynôme de degré au plus égal à  $n - 1$  t.q.

$$p(x) = ax^n + q(x) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R},$$

et donc

$$p(x) = x^n \left( a + \frac{q(x)}{x^n} \right) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}^*.$$

Comme  $q$  est de degré strictement inférieur à  $n$ , on a  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{q(x)}{x^n} = 0$ . Comme  $n$  est impair, on a donc :

$$\text{Si } a > 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = +\infty.$$

$$\text{Si } a < 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = -\infty.$$

Dans les deux cas ( $a > 0$  et  $a < 0$ ) on a donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x)p(-x) = -\infty$ . On en déduit, en particulier, qu'il existe  $a > 0$  t.q.  $p(a)p(-a) < 0$ . Ceci montre que 0 est entre  $p(a)$  et  $p(-a)$ . Comme  $p$  est une fonction continue sur  $[-a, a]$ , le théorème des valeurs intermédiaires (théorème 2.2) permet d'affirmer qu'il existe  $c \in [-a, a]$  t.q.  $p(c) = 0$ . Donc, le polynôme  $p$  s'annule en au moins un point.

---

**Exercice 2.24 (Corrigé de l'exercice 2.6)**

Soit  $f$  une fonction continue de  $\mathbb{R}_+$  dans  $\mathbb{R}_+$ . On suppose que  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ . Montrer que  $f$  admet un maximum (c'est-à-dire qu'il existe  $a \in \mathbb{R}_+$  t.q., pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $f(x) \leq f(a)$ ).

---

**corrigé**

---

On pose  $\varepsilon = f(0)$ . Comme  $f(0) > 0$  et  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ , il existe  $A \geq 0$  t.q. :

$$x \geq A \Rightarrow |f(x)| \leq \varepsilon \Rightarrow f(x) \leq \varepsilon. \tag{2.1}$$

On remarque maintenant que la fonction  $f$  est continue sur l'intervalle  $[0, A]$ . Comme cet intervalle est fermé borné, on en déduit (théorème 2.3) que  $f$  est bornée sur  $[0, A]$  et atteint ses bornes. Il existe donc  $a \in [0, A]$  t.q. :

$$x \in [0, A] \Rightarrow f(x) \leq f(a).$$

Comme  $0 \in [0, A]$ , on a, en particulier  $\varepsilon = f(0) \leq f(a)$ . Avec (2.1), ceci donne  $f(x) \leq \varepsilon \leq f(a)$  pour tout  $x \geq A$ . On a donc, finalement :

$$x \in \mathbb{R}_+ \Rightarrow f(x) \leq f(a).$$

**Exercice 2.25 (Corrigé de l'exercice 2.7)**

Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ , et  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue et injective. Montrer que  $f$  est monotone. [Utiliser le théorème des valeurs intermédiaires.]

————— corrigé —————

On a  $f(a) \neq f(b)$  (car  $f$  est injective et  $a \neq b$ ). On suppose que  $f(a) < f(b)$  et on va montrer que  $f$  est strictement croissante (si  $f(a) > f(b)$ , un raisonnement analogue donnerait que  $f$  est strictement décroissante).

On montre tout d'abord que  $f$  prend ses valeurs dans l'intervalle  $[f(a), f(b)]$ . Pour cela on raisonne par l'absurde. Soit  $x \in ]a, b[$ . Si  $f(x) \geq f(b)$ , on a alors  $f(b) \in [f(a), f(x)]$ . Le théorème des valeurs intermédiaires (théorème 2.2) appliqué à l'intervalle  $[a, x]$  donne alors l'existence de  $c \in [a, x]$  t.q.  $f(c) = f(b)$ . Ce qui est impossible car  $f$  est injective. On a donc  $f(x) < f(b)$ . Un raisonnement analogue permet de montrer que  $f(x) > f(a)$ .

On montre maintenant que  $f$  est strictement croissante. Soit  $a \leq x < y \leq b$ . On sait déjà que  $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$  et  $f(a) \leq f(y) \leq f(b)$ . Pour montrer que  $f(x) < f(y)$ , on raisonne encore par l'absurde. Si  $f(x) \geq f(y)$ , on a  $f(x) \in [f(y), f(b)]$ . Le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à l'intervalle  $[y, b]$  donne alors l'existence de  $d \in [y, b]$  t.q.  $f(d) = f(x)$ . Comme  $x < y$  on a  $d \neq x$  et ceci est impossible car  $f$  est injective. On a donc  $f(x) < f(y)$ . On a bien montré que  $f$  est strictement croissante.

**Exercice 2.26 (Corrigé de l'exercice 2.8)**

Soit  $f$  l'application de  $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$  dans  $\mathbb{R}$  définie par :

$$f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{1 - |x|}.$$

1. La fonction  $f$  est-elle continue en 0 ?

————— corrigé —————

Oui ! La fonction  $f$  est continue en 0 car c'est le quotient de deux fonctions continues en 0 et que la fonction au dénominateur ne s'annule pas en 0.

2. Calculer  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ .

————— corrigé —————

On remarque que  $x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x - 1)(x^2 - x - 2) = (x - 1)(x + 1)(x - 2)$ .

Pour  $x \geq 0$ ,  $x \neq 1$ , on a donc  $f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{1 - x} = (x + 1)(2 - x)$ . On en déduit que  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ .

Pour  $x \leq 0$ ,  $x \neq -1$ , on a  $f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{1 + x} = (x - 1)(x - 2)$ . On en déduit que  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 6$ .

3. Existe-t-il une fonction  $g$  définie et continue sur  $\mathbb{R}$  et qui est égale à  $f$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$  ?

—————  
**corrigé**  
—————

Oui, une telle fonction  $g$  existe. Pour  $x \geq 0$ , on a  $g(x) = (x + 1)(2 - x)$  et pour  $x < 0$ , on a  $g(x) = (x - 1)(x - 2)$ .

---

**Exercice 2.27 (Corrigé de l'exercice 2.9)**

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions de  $[0, 1]$  dans  $\mathbb{R}$ , continues et t.q.  $f(0) = g(1) = 0$  et  $g(0) = f(1) = 1$ . Montrer que :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}_+, \exists x \in [0, 1], f(x) = \lambda g(x).$$

—————  
**corrigé**  
—————

Soit  $\lambda \in \mathbb{R}_+$ . On définit la fonction  $h$  de  $[0, 1]$  dans  $\mathbb{R}$  en posant :

$$h(x) = f(x) - \lambda g(x) \text{ pour tout } x \in [0, 1].$$

La fonction  $h$  est continue sur  $[0, 1]$  (car  $f$  et  $g$  sont continues sur  $[0, 1]$ ). Comme  $h(0) = f(0) - \lambda g(0) = -\lambda \leq 0$  et  $h(1) = f(1) - \lambda g(1) = f(1) = 1 \geq 0$ , le théorème des valeurs intermédiaires (théorème 2.2) donne qu'il existe  $x \in [0, 1]$  t.q.  $h(x) = 0$ , c'est-à-dire  $f(x) = \lambda g(x)$ . (Bien sûr, le point  $x$  trouvé dépend, en général, de  $\lambda$ .)

---

**Exercice 2.28 (Corrigé de l'exercice 2.10)**

Soit  $f$  une fonction continue de  $[0, 1]$  dans  $\mathbb{R}$ .

1. Montrer que pour tout  $t \in [0, 1]$ , l'ensemble  $\{s \in [0, 1] \text{ t.q. } f(s) = \frac{f(0)+f(t)}{2}\}$  est non vide.

—————  
**corrigé**  
—————

Soit  $t \in [0, 1]$ . La fonction  $f$  est continue sur  $[0, t]$  et  $\frac{f(0)+f(t)}{2}$  est une valeur intermédiaire entre  $f(0)$  et  $f(t)$ . D'après le théorème des valeurs intermédiaires (théorème 2.2), il existe donc  $s \in [0, t]$  (et donc  $s \in [0, 1]$ ) t.q.  $f(s) = \frac{f(0)+f(t)}{2}$ . Ceci prouve que l'ensemble  $\{s \in [0, 1] \text{ t.q. } f(s) = \frac{f(0)+f(t)}{2}\}$  est non vide.

---

Pout  $t \in [0, 1]$ , on pose  $\varphi(t) = \inf\{s \in [0, 1] \text{ t.q. } f(s) = \frac{f(0)+f(t)}{2}\}$ .

2. Soit  $t \in [0, 1]$ , montrer que  $\varphi(t) \in [0, 1]$  et que  $f(\varphi(t)) = \frac{f(0)+f(t)}{2}$ .

—————  
**corrigé**  
—————

On pose  $A_t = \{s \in [0, 1] \text{ t.q. } f(s) = \frac{f(0)+f(t)}{2}\}$ . L'ensemble  $A_t$  est non vide (d'après la 1ere question) et minoré par 0. Il admet donc un borne inférieure, notée  $\varphi(t)$ , et  $0 \leq \varphi(t)$ . D'autre part, comme  $A_t \subset [0, 1]$ , on a aussi  $\varphi(t) \leq 1$ .

Pour montrer que  $f(\varphi(t)) = \frac{f(0)+f(t)}{2}$ , on rappelle qu'il existe une suite  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A_t$  t.q. :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \inf A_t = \varphi(t).$$

Comme  $a_n \in A_t$ , on a  $f(a_n) = \frac{f(0)+f(t)}{2}$ . En passant à limite sur cette égalité, la continuité de  $f$  en  $\varphi(t)$  donne  $f(\varphi(t)) = \frac{f(0)+f(t)}{2}$ .

---

3. Montrer que si  $f$  est strictement croissante, l'application  $\varphi$  ainsi définie de  $[0, 1]$  dans  $[0, 1]$  est continue.

————— corrigé —————

La fonction  $f$  étant strictement croissante, elle est bijective de  $[0, 1]$  dans son image. Comme elle est continue, son image est un intervalle (théorème 2.4) et sa fonction réciproque, notée  $g$ , est également continue (théorème 2.5). On a donc :

$$\varphi(t) = g\left(\frac{f(0) + f(t)}{2}\right) \text{ pour tout } t \in [0, 1].$$

Ceci prouve que  $\varphi$  est continue car composée de fonctions continues.

4. Donner un exemple de fonction  $f$  pour lequel la fonction  $\varphi$  n'est pas continue.

————— corrigé —————

On prend  $f(t) = 0$  pour  $t \in [0, \frac{1}{2}]$  et  $f(t) = t - \frac{1}{2}$  pour  $t \in ]\frac{1}{2}, 1]$ . La fonction  $f$  est bien continue de  $[0, 1]$  dans  $\mathbb{R}$  et on remarque que  $\varphi(t) = 0$  pour  $t \in [0, \frac{1}{2}]$  et que  $\varphi(t) > \frac{1}{2}$  pour  $t > \frac{1}{2}$ . On en déduit que  $\varphi$  n'est pas continue en  $\frac{1}{2}$ .

### Exercice 2.29 (Corrigé de l'exercice 2.11)

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue (c'est-à-dire continue en tout point de  $\mathbb{R}$ ). On suppose que  $f(x) \in \{0, 1\}$ , pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . Montrer que  $f$  est constante. [utiliser le théorème des valeurs intermédiaires.]

————— corrigé —————

On raisonne par l'absurde. On suppose que  $f$  n'est pas constante. Il existe donc  $a, b \in \mathbb{R}$  t.q.  $f(a) = 0$  et  $f(b) = 1$ . Comme  $f$  est continue sur l'intervalle fermé dont les bornes sont  $a$  et  $b$  et que (par exemple)  $\frac{1}{2}$  est une valeur intermédiaire entre 0 et 1, le théorème des valeurs intermédiaires (théorème 2.2) donne l'existence de  $c$  (entre  $a$  et  $b$ ) t.q.  $f(c) = \frac{1}{2}$ , ce qui est impossible car  $f(c) = 0$  ou 1.

### Exercice 2.30 (Corrigé de l'exercice 2.12)

1. Montrer que, pour tout  $x, y \in \mathbb{R}$ ,  $\max\{x, y\} = \frac{1}{2}(x + y + |x - y|)$  et  $\min\{x, y\} = \frac{1}{2}(x + y - |x - y|)$ .

————— corrigé —————

Soit  $x, y \in \mathbb{R}$ . Si  $x \geq y$ , on a alors  $\frac{1}{2}(x + y + |x - y|) = \frac{1}{2}(x + y + x - y) = x = \max\{x, y\}$ . On a aussi  $\frac{1}{2}(x + y - |x - y|) = \frac{1}{2}(x + y - x + y) = y = \min\{x, y\}$ .

Si  $x < y$ , on est ramené au cas précédent en remarquant que  $\max\{x, y\} = \max\{y, x\}$  et  $\min\{x, y\} = \min\{y, x\}$  et  $|x - y| = |y - x|$ .

2. Soit  $f$  et  $g$  deux applications de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On définit les applications  $f \top g$  et  $f \perp g$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  par :

$$(f \top g)(x) = \max\{f(x), g(x)\}, \quad (f \perp g)(x) = \min\{f(x), g(x)\}, \text{ pour } x \in \mathbb{R}.$$

Soit  $a \in \mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  et  $g$  sont continues en  $a$ . Montrer que  $f \top g$  et  $f \perp g$  sont continues en  $a$ .

————— corrigé —————

On note  $\varphi$  l'application (de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ )  $s \mapsto |s|$ . L'application  $\varphi$  est continue. La question 1 nous donne  $f \top g = \frac{1}{2}(f + g + \varphi \circ (f - g))$  et  $f \perp g = \frac{1}{2}(f + g - \varphi \circ (f - g))$ . Comme les fonctions  $f$  et

$g$  sont continues en  $a$ , la fonction  $\varphi \circ (f - g)$  est continue en  $a$  (par composition et différence de fonctions continues). On en déduit que  $f \top g$  et  $f \perp g$  sont continues en  $a$ .

---

**Exercice 2.31 (Corrigé de l'exercice 2.13)**

Soit  $f$  une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est convexe, c'est à dire que  $f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y)$  pour tout  $t \in [0, 1]$  et pour tout  $x, y \in \mathbb{R}$ .

On pose  $\alpha = f(1) - f(0)$ ,  $\beta = f(0) - f(-1)$  et  $\gamma = \max\{|\alpha|, |\beta|\}$ .

1. Soit  $x \in ]0, 1[$ . Montrer que  $\beta x \leq f(x) - f(0) \leq \alpha x$ . [Utiliser le fait que  $x = t1 + (1 - t)0$ , avec  $t = x$ , et  $0 = tx + (1 - t)(-1)$ , avec  $t = \frac{1}{1+x}$ .]

---

**corrigé**

---

Comme  $x = t1 + (1 - t)0$ , avec  $t = x \in ]0, 1[$ , la convexité de  $f$  donne :

$$f(x) \leq tf(1) + (1 - t)f(0) = f(0) + t(f(1) - f(0))$$

et donc :

$$f(x) - f(0) \leq \alpha x.$$

On prend maintenant  $t = \frac{1}{1+x}$ , on a bien  $tx + (1 - t)(-1) = t(x + 1) - 1 = 0$ . Comme  $\frac{1}{1+x} \in ]0, 1[$ , la convexité de  $f$  donne  $f(0) \leq tf(x) + (1 - t)f(-1)$  et donc :

$$tf(0) + (1 - t)f(0) \leq tf(x) + (1 - t)f(-1).$$

On en déduit :

$$t(f(0) - f(x)) \leq (1 - t)(f(-1) - f(0)) = -\beta(1 - t).$$

Comme  $(1 - t) = \frac{x}{1+x} = tx$ , on en déduit bien  $f(0) - f(x) \leq -\beta x$  c'est-à-dire :

$$\beta x \leq f(x) - f(0).$$


---

2. Soit  $x \in ]-1, 1[$ . Montrer que  $|f(x) - f(0)| \leq \gamma|x|$ . En déduire que  $f$  est continue en 0.

---

**corrigé**

---

Soit  $x \in ]0, 1[$ , la question 1 donne  $|f(x) - f(0)| \leq \max\{\alpha x, -\beta x\} \leq \gamma x = \gamma|x|$ .

On suppose maintenant que  $x \in ]-1, 0[$ . On raisonne de manière analogue à la question 1. On remarque d'abord que  $x = t(-1) + (1 - t)0$ , avec  $t = -x \in ]0, 1[$ . la convexité de  $f$  donne donc  $f(x) \leq tf(-1) + (1 - t)f(0) = f(0) - x(f(-1) - f(0))$  et donc :

$$f(x) - f(0) \leq \beta x.$$

Avec  $t = \frac{1}{1-x}$ , on a  $0 = tx + (1 - t)(1)$ . Comme  $\frac{1}{1-x} \in ]0, 1[$ , la convexité de  $f$  donne  $f(0) \leq tf(x) + (1 - t)f(1)$ , on en déduit  $t(f(0) - f(x)) \leq (1 - t)(f(1) - f(0)) = (1 - t)\alpha$ . Enfin, comme  $1 - t = \frac{-x}{1-x} = -xt$ , on obtient :

$$f(0) - f(x) \leq -\alpha x.$$

On a finalement  $\alpha x \leq f(x) - f(0) \leq \beta x$  et on conclut, comme pour le cas  $x \in ]0, 1[$ ,  $|f(x) - f(0)| \leq \max\{\beta x, -\alpha x\} \leq \gamma|x|$ .

Comme le cas  $x = 0$  est trivial, on a bien démontré

$$|f(x) - f(0)| \leq \gamma|x| \text{ pour tout } x \in ]-1, 1[. \quad (2.2)$$

De (2.2), on déduit facilement que  $f$  est continue en 0. En effet, soit  $\varepsilon > 0$ , On prend  $\eta = \min\{\frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{\gamma+1}\} > 0$ , l'inégalité (2.2) donne alors :

$$|x - 0| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - f(0)| \leq \varepsilon,$$

ce qui prouve bien la continuité de  $f$  en 0.

3. Montrer que  $f$  est continue en tout point de  $\mathbb{R}$ .

—————**corrigé**—————

Soit  $a \in \mathbb{R}$ . On définit  $g$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  en posant, pour  $x \in \mathbb{R}$ ,  $g(x) = f(x + a)$ . La fonction  $f$  est continue en  $a$  si (et seulement si) la fonction  $g$  est continue en 0. Pour montrer que  $g$  est continue en 0 (et donc que  $f$  est continue en  $a$ ), il suffit de remarquer que  $g$  est convexe et d'appliquer la question précédente (à la fonction  $g$  au lieu de  $f$ ). Il reste donc à montrer que  $g$  est convexe.

Soit  $x, y \in \mathbb{R}$  et  $t \in [0, 1]$ , on a  $g(tx + (1-t)y) = f(tx + (1-t)y + a) = f(t(x+a) + (1-t)(y+a)) \leq tf(x+a) + (1-t)f(y+a) = tg(x) + (1-t)g(y)$ . Ceci prouve donc que  $g$  est convexe.

On a ainsi montré que  $f$  est continue en  $a$ .

### Exercice 2.32 (Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI))

Soit  $f$  une fonction continue de  $[0, 1]$  dans  $[0, 1]$ .

1. Montrer qu'il existe  $x_2 \in [0, 1]$  tel que  $f(x_2) = (x_2)^2$ . [On pourra considérer la fonction  $g(x) = f(x) - x^2$ .]

—————**corrigé**—————

La fonction  $g$  est continue sur  $[0, 1]$ . On a  $g(0) = f(0) \geq 0$  (car  $f$  prend ses valeurs dans  $[0, 1]$ ) et  $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$  (car  $f$  prend ses valeurs dans  $[0, 1]$ ). Le théorème des valeurs intermédiaires donne alors qu'il existe  $x_2$  t.q.  $g(x_2) = 0$ , c'est-à-dire  $f(x_2) = (x_2)^2$ .

2. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Montrer qu'il existe  $x_n \in [0, 1]$  tel que  $f(x_n) = (x_n)^n$ .

—————**corrigé**—————

Pour  $x \in [0, 1]$ , on pose  $h_n(x) = f(x) - x^n$ . La fonction  $h_n$  est continue sur  $[0, 1]$  et on a, comme à la question précédente,  $h_n(0) = f(0) \geq 0$  et  $h_n(1) = f(1) - 1 \leq 0$ . Le théorème des valeurs intermédiaires donne alors qu'il existe  $x_n$  t.q.  $h_n(x_n) = 0$ , c'est-à-dire  $f(x_n) = (x_n)^n$ .

3. On suppose maintenant que  $f$  est strictement décroissante. Pour  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $x \in [0, 1]$ , on pose  $h_n(x) = f(x) - x^n$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Montrer que  $h_n$  est strictement décroissante sur  $[0, 1]$  et qu'il existe un unique  $x_n \in [0, 1]$  tel que  $f(x_n) = (x_n)^n$ .

Montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $h_{n+1}(x_n) > 0$ . En déduire  $x_{n+1} > x_n$ .

Montrer que la suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est convergente et que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$ . Quelle est la limite de  $(x_n)^n$  quand  $n \rightarrow +\infty$  ?

————— corrigé —————

La fonction  $x \mapsto -x^n$  est aussi strictement décroissante sur  $[0, 1]$ . La fonction  $h_n$  est donc strictement décroissante comme somme de deux fonctions strictement décroissantes. L'existence de  $x_n \in [0, 1]$  t.q.  $h_n(x_n) = 0$  est donnée par la question précédente. L'unicité de  $x_n$  vient de la stricte décroissance de  $h_n$  car si  $x_n \in [0, 1]$  est t.q.  $h_n(x_n) = 0$ , on a, pour tout  $x \in [0, 1] \setminus \{x_n\}$ ,  $h_n(x) > 0$  si  $x < x_n$  et  $h_n(x) < 0$  si  $x > x_n$ , et donc  $h_n(x) \neq 0$ . Le point  $x_n$  est donc le seul élément de  $[0, 1]$  pour lequel  $h_n$  s'annule.

Comme  $f$  est strictement décroissante, on  $f(1) < f(0)$ . Puis, comme  $f(0), f(1) \in [0, 1]$ , on a donc  $f(0) > 0$  et  $f(1) < 1$ . On en déduit  $x_n \neq 0$  (car  $h_n(0) = f(0) > 0$ ) et  $x_n \neq 1$  (car  $h_n(1) = f(1) - 1 < 0$ ). Ce qui montre que  $0 < x_n < 1$ . On a donc  $h_{n+1}(x_n) = f(x_n) - (x_n)^{n+1} = h_n(x_n) + (x_n)^n - (x_n)^{n+1} = (x_n)^n(1 - x_n) > 0$ . Comme  $h_{n+1}(x_{n+1}) = 0 < h_{n+1}(x_n)$  et que  $h_{n+1}$  est strictement décroissante, on a nécessairement  $x_{n+1} > x_n$ .

La suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est croissante majorée (par 1), elle est donc convergente. On note  $a$  la limite de cette suite. Comme  $0 < x_n < 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a donc  $a \in [0, 1]$ . On remarque maintenant que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(a)$  (car  $f$  est continue en  $a$ ). Si  $a \in [0, 1[$ , on a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n)^n = 0$  et donc  $f(a) = 0$ , ce qui est impossible car la décroissance strict de  $f$  donne  $f(a) > f(1) \geq 0$ . On a donc nécessairement  $a = 1$  (et donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$ ). Enfin, on a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(1)$ .

### Exercice 2.33 (Borne supérieure d'une fonction)

On définit la fonction  $f$  de  $]0, \infty[$  dans  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -\frac{1}{x} \cos(x)$  pour  $x \in ]0, \infty[$ . On pose  $A = \{f(x), x \in ]0, \infty[\}$ .

1. Calculer les limites de  $f$  en 0 et  $+\infty$ .

————— corrigé —————

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0.$$

2. Montrer que la fonction  $f$  n'est pas minorée (i.e. la partie  $A$  n'est pas minorée).

————— corrigé —————

La fonction  $f$  n'est pas minorée car  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ .

3. (a) Montrer qu'il existe  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ,  $0 < \alpha < \beta$ , t.q., pour tout  $x \in ]0, \infty[$ ,  $f(x) \leq \sup B$  avec  $B = \{f(y); y \in [\alpha, \beta]\}$ .

————— corrigé —————

On prend  $\alpha = \frac{\pi}{2}$  et  $\beta = \pi$ . La fonction  $f$  est continue sur  $[\alpha, \beta]$  qui est un intervalle fermé borné. La fonction  $f$  est donc bornée sur  $[\alpha, \beta]$  et atteint ses bornes. il existe donc  $c \in [\alpha, \beta]$  t.q.  $f(c) = \sup B$  (et donc, pour tout  $x \in [\alpha, \beta]$ ,  $f(c) \geq f(x)$ ).

On a, en particulier,  $f(c) \geq f(\beta) = f(\pi) = \frac{1}{\pi}$ .

Pour  $x \in ]0, \frac{\pi}{2}[$ , on a  $f(x) \leq 0 < \frac{1}{\pi} \leq f(c)$ .

Pour  $x > \pi$ , on a  $f(x) \leq |f(x)| \leq \frac{1}{x} < \frac{1}{\pi} \leq f(c)$ .

On a donc bien, pour tout  $x \in ]0, \infty[$ ,  $f(x) \leq f(c) = \sup B$  (ce qui donne  $\sup A = \sup B$ ).

- (b) En déduire que la fonction  $f$  est majorée (i.e. la partie  $A$  est majorée) et que la borne supérieure de  $f$  est atteinte.

—————**corrigé**—————

La démonstration précédente donne que  $f(c) = \sup A$ . La fonction  $f$  est donc majorée (i.e. la partie  $A$  est majorée) et la borne supérieure de  $f$  est atteinte.

Soit  $a \in ]0, \infty[$  t.q.  $f(a) = \sup A$  (c'est-à-dire  $f(a) \geq f(x)$  pour tout  $x \in ]0, \infty[$ ).

4. Montrer que  $f(a) > 0$  et que  $a < 2\pi$ .

—————**corrigé**—————

On a, en particulier,  $f(a) \geq f(\pi) = \frac{1}{\pi} > 0$ .

La démonstration de la question 3(a) donne que  $a \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$  (car  $f(x) < \sup B$  si  $x \notin [\frac{\pi}{2}, \pi]$  et  $f(a) = \sup B$ ). On a donc  $a \leq \pi < 2\pi$ . Mais on peut aussi démontrer que  $a < 2\pi$  en utilisant la périodicité de la fonction  $x \mapsto \cos(x)$ . En effet, on remarque que d'abord que  $f(2\pi) < 0$ , donc  $a \neq 2\pi$ . Puis, si  $a > 2\pi$ , on a  $f(a - 2\pi) = \frac{-\cos(a)}{a - 2\pi} > \frac{-\cos(a)}{a}$  car  $\cos(a) > 0$ . On en déduit  $f(a - 2\pi) > f(a)$ , en contradiction avec la définition de  $a$ . On a donc bien montré que  $a < 2\pi$ .

5. Montrer que  $\frac{\pi}{2} < a < \frac{3\pi}{2}$  et que  $f'(a) = 0$ .

—————**corrigé**—————

On sait déjà que  $a \in ]0, 2\pi[$ . Comme  $f(a) > 0$  et que  $f(x) \leq 0$  si  $x \in ]0, \frac{\pi}{2}] \cup [\frac{3\pi}{2}, 2\pi[$ , on en déduit que  $a \in ]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$ .

Le fait que  $f'(a) = 0$  a été vu en cours (il suffit de remarquer que  $f(a + h) - f(a) \leq 0$  pour tout  $h \neq 0$  t.q.  $a + h > 0$  et d'utiliser la définition de  $f'(a)$ ).

6. Pour  $x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ , on pose  $g(x) = x \sin(x) + \cos(x)$ . Montrer qu'il existe un unique  $b \in ]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$  t.q.  $g(b) = 0$ . Montrer que  $b \in ]\frac{\pi}{2}, \pi[$ . Montrer que  $a = b$  et en déduire que  $f$  atteint son maximum en un unique point.

—————**corrigé**—————

Pour  $x \in ]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$ , on a  $g'(x) = x \cos(x) < 0$ . La fonction  $g$  est donc continue et strictement décroissante (ceci a été vu en cours) sur  $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ . Comme  $g(\frac{\pi}{2}) > 0$  et  $g(\frac{3\pi}{2}) < 0$ , il existe un unique  $b \in ]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$  t.q.  $g(b) = 0$  (l'existence de  $b$  découle du théorème des valeurs intermédiaires et l'unicité de  $b$  découle de la stricte décroissance de  $g$ ).

Comme  $g(\pi) < 0$ , le théorème des valeurs intermédiaires (appliqué avec l'intervalle  $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ ) permet de dire que cet unique  $b$  appartient à l'intervalle  $] \frac{\pi}{2}, \pi[$ .

Comme  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ , pour tout  $x \in ]0, \infty[$ , et comme l'on sait que  $a \in ]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$  et  $f'(a) = 0$ , on a nécessairement  $a = b$ . Ceci prouve que  $b$  est l'unique point de  $]0, \infty[$  pour lequel  $f$  atteint son maximum.

### Exercice 2.34 (Valeur intermédiaire)

Soit  $\alpha > 0, \beta > 0$ .

Soit  $f$  une fonction continue de  $]0, \alpha[$  dans  $\mathbb{R}$ , t.q.  $f(0) < 0$  et  $\lim_{x \rightarrow \alpha, x < \alpha} f(x) = +\infty$ .

Soit  $g$  une fonction continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , t.q.  $g(0) < 0$  et  $g(\beta) > 0$ .

Montrer qu'il existe  $x \in ]0, \min(\alpha, \beta)[$  t.q.  $f(x)(x - \beta) - g(x) = 0$ . [On pourra distinguer les cas  $\beta < \alpha$ ,  $\beta > \alpha$  et  $\beta = \alpha$ .]

---

**corrigé**

---

Pour  $x \in [0, \alpha[$ , on pose  $\varphi(x) = f(x)(x - \beta) - g(x)$ . La fonction  $\varphi$  est donc continue sur  $[0, \alpha[$ .

**Cas  $\beta < \alpha$ .** Dans ce cas, la fonction  $\varphi$  est continue sur  $[0, \beta]$ . On remarque que  $\varphi(0) > 0$  et  $\varphi(\beta) < 0$ . Le théorème des valeurs intermédiaires donne donc l'existence de  $x \in ]0, \beta[$  t.q.  $\varphi(x) = 0$ .

**Cas  $\beta > \alpha$ .** Dans ce cas, on a  $\lim_{x \rightarrow \alpha, x < \alpha} \varphi(x) = -\infty$ . Il existe donc, par exemple,  $\eta > 0$  t.q. :

$$x \in [0, \alpha[, x \geq \alpha - \eta \Rightarrow \varphi(x) < 0.$$

On en déduit l'existence de  $\gamma \in ]0, \alpha[$  t.q.  $\varphi(\gamma) < 0$ . Comme  $\varphi(0) > 0$ , le théorème des valeurs intermédiaires donne donc l'existence de  $x \in ]0, \gamma[ \subset ]0, \alpha[$  t.q.  $\varphi(x) = 0$ .

**Cas  $\beta = \alpha$ .** On modifie légèrement le raisonnement précédent. Comme  $\lim_{x \rightarrow \alpha, x < \alpha} f(x) = +\infty$ . Il existe  $\eta > 0$  t.q. :

$$x \in [0, \alpha[, x \geq \alpha - \eta \Rightarrow f(x) > 0.$$

Comme  $x - \beta < 0$  si  $x < \alpha = \beta$ , on a donc

$$x \in [0, \alpha[, x \geq \alpha - \eta \Rightarrow \varphi(x) < 0.$$

On conclut alors comme dans le cas précédent.

---

### Exercice 2.35

Soit  $f$  une application continue d'un intervalle  $I \subset \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  ne s'annule pas sur  $I$ . Montrer que  $f$  garde un signe constant sur  $I$ .

---

**corrigé**

---

On raisonne par contraposée. Si  $f$  ne garde pas un signe constant sur l'intervalle  $I$  (qui n'est pas nécessairement fermé ni borné), cela signifie qu'il existe  $a, b \in I$  t.q.  $f(a) < 0$  et  $f(b) > 0$ . Comme 0 est une valeur intermédiaire entre  $f(a)$  et  $f(b)$ , il existe donc  $x$  entre  $a$  et  $b$  t.q.  $f(x) = 0$ . Comme  $I$  est un intervalle contenant  $a$  et  $b$ , il contient aussi  $x$ . Donc,  $f$  s'annule sur  $I$ .

On a bien ainsi montré que si  $f$  ne s'annule pas sur l'intervalle  $I$ , alors  $f$  est de signe constant sur  $I$ .

---

### Exercice 2.36

Montrer que le polynôme  $x^{30} + 14x^{17} - 7x^5 - 7$  admet au moins une racine dans l'intervalle  $]0, 1[$ .

---

**corrigé**

---

On pose  $f(x) = x^{30} + 14x^{17} - 7x^5 - 7$ . Le polynôme  $f$  est une fonction continue sur  $[0, 1]$ . On remarque que  $f(0) = -7$  et  $f(1) = 1$ . Comme 0 est une valeur intermédiaire entre  $f(0)$  et  $f(1)$ , il existe donc  $x \in ]0, 1[$  t.q.  $f(x) = 0$ .

---

**Exercice 2.37**

Montrer que  $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}$ , pour tout  $x, y \in \mathbb{R}_+$ . En déduire que l'application  $x \mapsto \sqrt{x}$  est uniformément continue sur  $\mathbb{R}_+$ . Montrer que l'application  $x \mapsto \frac{1}{x}$  n'est pas uniformément continue sur  $]0, 1]$ .

---

**corrigé**

---

Soit  $x, y \in \mathbb{R}^+$ , avec  $x \geq y$ . Le plus rapide est de remarquer que  $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 = x + y - 2\sqrt{x}\sqrt{y} \leq x + y - 2\sqrt{y}\sqrt{y}$  (car  $\sqrt{y} \leq \sqrt{x}$ ). On en déduit que  $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \leq x - y$ , c'est-à-dire  $\sqrt{x} - \sqrt{y} \leq \sqrt{x - y}$ . Le cas  $y \geq x$  est similaire. On a donc, pour tout  $x, y \in \mathbb{R}^+$ ,  $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ . On prend  $\alpha = \varepsilon^2$ . On obtient ainsi :

$$x, y \in \mathbb{R}^+, |x - y| \leq \alpha \Rightarrow |\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|} \leq \sqrt{\alpha} = \varepsilon.$$

Ceci prouve bien que l'application  $x \mapsto \sqrt{x}$  est uniformément continue sur  $\mathbb{R}_+$ .

Pour montrer que  $x \mapsto \frac{1}{x}$  n'est pas uniformément continue sur  $]0, 1]$ , on raisonne par l'absurde. On suppose donc que  $f$  est uniformément continue sur  $]0, 1]$ . Il existe alors (en particulier)  $\alpha > 0$  t.q. :

$$x, y \in ]0, 1], |x - y| \leq \alpha \Rightarrow \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| \leq 1. \quad (2.3)$$

On prend alors  $\beta = \min\{\frac{1}{4}, \alpha\}$ ,  $x = 2\beta$  et  $y = \beta$ . On a bien  $x, y \in ]0, 1]$  et  $|x - y| = \beta \leq \alpha$ . Pourtant, on a  $|\frac{1}{x} - \frac{1}{y}| = \frac{\beta}{2\beta^2} = \frac{1}{2\beta} \geq 2 > 1$ , en contradiction avec (2.3). Ce qui prouve que  $f$  n'est pas uniformément continue sur  $]0, 1]$ .

**Exercice 2.38**

soit  $f$  l'application de  $[-1, \infty[$  dans  $\mathbb{R}$  définie par  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}}$ , pour tout  $x \geq -1$ . Montrer que  $f$  est bijective de  $[-1, \infty[$  dans  $]0, 1]$  et donner une formule explicite pour sa fonction réciproque.

---

**corrigé**

---

La fonction  $h : x \mapsto (x^2 + 2x + 2)$  est continue et strictement croissante sur  $[-1, \infty[$  (car sa dérivée est strictement positive sur  $] -1, \infty[$ ). Comme  $h(-1) = 1$ , elle est aussi strictement positive. On en déduit que la fonction  $f$  (définie par  $f = 1/\sqrt{h}$ ) est bien définie, continue et strictement décroissante sur  $[-1, \infty[$ . Le théorème 2.5 (appliqué à la fonction  $-f$  pour se ramener au cas d'une fonction strictement croissante) donne alors qu'elle est bijective de  $[-1, \infty[$  sur son image et que cette image est l'intervalle  $]0, 1]$  car  $f(-1) = 1$  et  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ . La fonction réciproque de  $f$ , notée  $g$ , est donc une fonction continue strictement décroissante de  $]0, 1]$  dans  $[-1, \infty[$ .

Soit  $y \in ]0, 1]$ . On calcule maintenant explicitement  $g(y)$ . On pose  $x = g(y)$  de sorte que  $x \in [-1, \infty[$  et  $y = f(x)$ . On a donc  $x^2 + 2x + 2 = \frac{1}{y^2}$ . Ceci donne  $(x + 1)^2 = \frac{1}{y^2} - 1$ . Comme  $x \in [-1, \infty[$ , on a  $x + 1 \geq 0$  et donc  $x + 1 = \sqrt{\frac{1}{y^2} - 1}$ , c'est-à-dire :

$$x = -1 + \frac{\sqrt{1 - y^2}}{y}.$$


---

# Chapitre 3

## Dérivée

### 3.1 Définitions

**Définition 3.1** Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$ ,  $f$  une application de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$  et  $x \in ]a, b[$ . Pour  $h \in ]a - x, b - x[$ ,  $h \neq 0$ , on pose  $\varphi(h) = \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ . On dit que  $f$  est dérivable en  $x$  si  $\varphi$  a une limite finie en 0 (cette limite est alors unique, d'après la proposition 1.1, chapitre 1). On note alors  $f'(x)$  cette limite (on a donc  $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h)$ ).

**Remarque 3.1** On reprend les hypothèses de la définition précédente. Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$ .  $f$  une application de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$  et  $x \in ]a, b[$ . Pour  $h \in ]a - x, b - x[$ ,  $h \neq 0$  on pose  $\varphi(h) = \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ . On suppose que  $\varphi$  a une limite finie en 0. Cette limite est notée  $f'(x)$ . En posant  $\varphi(0) = f'(x)$ , la fonction  $\varphi$  est alors continue en 0.

Nous donnons maintenant une autre manière de définir la dérivée. L'intérêt de cette seconde définition est qu'elle sera généralisable pour des applications de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^p$  si  $n > 1$ .

**Définition 3.2** Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$ ,  $f$  une application de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$  et  $x \in ]a, b[$ . On dit  $f$  est différentiable en  $x$  si il existe  $A \in \mathbb{R}$  t.q.

$$f(x+h) = f(x) + Ah + hg(h), \text{ pour } h \text{ t.q. } x+h \in ]a, b[,$$

avec  $\lim_{h \rightarrow 0} g(h) = 0$  (et donc  $g$  continue en 0 si on pose  $g(0) = 0$ ). La différentielle de  $f$  en  $x$  est alors l'application linéaire de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R} : h \mapsto Ah$ . (La proposition 3.1 montre que  $A$  est unique.)

Voici le lien entre ses deux définitions.

**Proposition 3.1** Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$ ,  $f$  une application de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$  et  $x \in ]a, b[$ . On a alors :

1. L'application  $f$  est dérivable en  $x$  si et seulement si elle est différentiable en  $x$ .
2. Si  $f$  est dérivable, la différentielle de  $f$  est l'application linéaire de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R} : h \mapsto f'(x)h$ .

DÉMONSTRATION :

Pour  $h \in ]a - x, b - x[$ ,  $h \neq 0$ , on pose  $\varphi(h) = \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ .

Si  $f$  est dérivable en  $x$ , on a  $\lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h) = f'(x)$ , c'est-à-dire  $\varphi(h) = f'(x) + g(h)$  avec  $\lim_{h \rightarrow 0} g(h) = 0$ . On en déduit donc que  $f(x+h) = f(x) + hf'(x) + hg(h)$  avec  $\lim_{h \rightarrow 0} g(h) = 0$ . Ceci montre que  $f$  est

différentiable en  $x$  et que la différentielle de  $f$  en  $x$  est l'application linéaire de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  qui à  $h$  associe  $f'(x)h$ .

Réciproquement, on suppose maintenant que  $f$  est différentiable en  $x$ . Il existe donc  $A \in \mathbb{R}$  t.q.  $f(x+h) = f(x) + Ah + hg(h)$  (pour  $h$  t.q.  $x+h \in ]a, b[$ ) et  $\lim_{h \rightarrow 0} g(h) = 0$ . On en déduit que  $\varphi(h) = A + g(h)$  et donc, comme  $\lim_{h \rightarrow 0} g(h) = 0$ , que  $f$  est dérivable en  $x$  et  $f'(x) = A$ .

On a donc bien montré les deux assertions de la proposition 3.1. ■

**Définition 3.3 (Tangente à la courbe)** Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$ ,  $f$  une application de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$  et  $x \in ]a, b[$ . On suppose que  $f$  est dérivable en  $x$ . La tangente à la courbe de  $f$  au point  $(x, f(x))$  est la droite d'équation  $y \mapsto f(x) + f'(x)(y - x)$ .

**Remarque 3.2** Soit  $f$  une application continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $x \in \mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est dérivable en  $x$ . En général (c'est à dire en dehors de certains points particuliers que nous appellerons "points d'inflexion"), la droite de pente  $f'(x)$  et passant par le point  $(x, f(x))$  est la seule, parmi toutes les droites passant par le point  $(x, f(x))$ , à ne pas traverser le courbe de  $f$  au point  $(x, f(x))$ .

**Remarque 3.3** Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$ ,  $f$  une application de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$  et  $x \in ]a, b[$ . Le fait que  $f$  soit dérivable en  $x$  implique que  $f$  est continue en  $x$ . La réciproque est fautive comme le montre l'exemple  $f(x) = |x|$  pour  $x \in \mathbb{R}$  ( $f$  est continue en 0 mais non dérivable en 0).

## 3.2 Opérations sur les dérivées

**Proposition 3.2** Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$ .  $f$  et  $g$  deux applications de  $I = ]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$  et  $x \in ]a, b[$ . On suppose que  $f$  et  $g$  sont dérivables en  $x$ . Alors :

1. L'application  $f + g$  est dérivable en  $x$  et  $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$ .
2. L'application  $fg$  est dérivable en  $x$  et  $(fg)'(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x)$ .
3. On suppose  $g(y) \neq 0$  pour tout  $y \in I$ . L'application  $f/g$  est alors définie sur  $I$ ,  $f/g$  est dérivable en  $x$  et :

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)}{g(x)} - \frac{f(x)g'(x)}{g^2(x)} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}.$$

DÉMONSTRATION :

Pour simplifier les écritures (cela ne change pas les raisonnements), on se limite au cas  $I = \mathbb{R}$ .

1. Pour  $h \neq 0$ , on remarque que

$$\frac{(f(x+h) + g(x+h)) - (f(x) + g(x))}{h} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{g(x+h) - g(x)}{h}.$$

Comme les deux termes de droite ont une limite quand  $h \rightarrow 0$ , on en déduit que le terme de gauche a aussi une limite quand  $h \rightarrow 0$ . Cette limite est  $f'(x) + g'(x)$ . Ceci prouve bien que  $f + g$  est dérivable en  $x$  et que  $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$ .

2. la démonstration est un peu plus longue pour ce deuxième item. Pour  $h \neq 0$ , on a :

$$\frac{fg(x+h) - fg(x)}{h} = \frac{(f(x+h) - f(x))g(x+h)}{h} + \frac{f(x)(g(x+h) - g(x))}{h}.$$

Comme  $f$  est dérivable en  $x$  et que  $g$  est continue en  $x$  (car  $g$  est dérivable en  $x$ ), le premier terme du membre de droite tend vers  $f'(x)g(x)$  quand  $x$  tend vers 0. Comme  $g$  est dérivable en  $x$ , le second terme du membre de droite tend vers  $f(x)g'(x)$  quand  $x$  tend vers 0. On obtient bien, finalement, que  $fg$  est dérivable en  $x$  et que  $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ .

3. Pour ce troisième item, on commence par montrer que la fonction  $1/g$  (qui est bien définie sur  $I$  car  $g$  ne s'annule pas) est dérivable et par calculer sa dérivée. Pour  $h \neq 0$ , on a :

$$\frac{1}{h} \left( \frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)} \right) = \frac{g(x) - g(x+h)}{hg(x+h)g(x)} = -\frac{g(x+h) - g(x)}{h} \frac{1}{g(x+h)g(x)}.$$

Comme  $g$  est continue et dérivable en  $x$ , on en déduit que  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left( \frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)} \right) = -\frac{g'(x)}{g^2(x)}$  et donc que  $\frac{1}{g}$  est dérivable en  $x$  et que sa dérivée est  $-\frac{g'(x)}{g^2(x)}$ .

Pour conclure on utilise maintenant le deuxième item en remarquant que  $\frac{f}{g} = f \left( \frac{1}{g} \right)$ . On obtient que  $\frac{f}{g}$  est dérivable en  $x$  et que

$$\left( \frac{f}{g} \right)'(x) = \frac{f'(x)}{g(x)} - \frac{g'(x)f(x)}{g^2(x)}.$$

■

**Proposition 3.3 (Dérivée d'une fonction composée)** Soit  $I$  et  $J$  deux intervalles ouverts de  $\mathbb{R}$ ,  $g$  une application de  $I$  dans  $\mathbb{R}$  et  $f$  application de  $J$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $\text{Im}(g) \subset J$ . Soit  $x \in I$ . On suppose que  $g$  est dérivable en  $x$  et  $f$  dérivable en  $g(x)$ . Alors,  $f \circ g$  est dérivable en  $x$  et  $(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x)$ .

DÉMONSTRATION : Ici aussi, on suppose, pour simplifier les écritures, que  $I = J = \mathbb{R}$ . On va raisonner ici en utilisant plutôt la notion de différentiabilité (équivalente, par la proposition 3.1, à la notion de dérivabilité).

Comme  $g$  est différentiable en  $x$ , on a pour tout  $h \in \mathbb{R}$ ,

$$g(x+h) = g(x) + g'(x)h + hr(h),$$

avec  $\lim_{h \rightarrow 0} r(h) = 0$  (et donc  $r$  continue en 0 en posant  $r(0) = 0$ , comme cela est dit dans la définition 3.2). Pour tout  $h \in \mathbb{R}$ , on a donc :

$$f \circ g(x+h) = f(g(x+h)) = f(g(x) + g'(x)h + hr(h)). \quad (3.1)$$

On utilise maintenant le fait que  $f$  est différentiable en  $g(x)$ , on a donc pour tout  $k \in \mathbb{R}$ ,

$$f(g(x) + k) = f(g(x)) + f'(g(x))k + ks(k), \quad (3.2)$$

avec  $\lim_{k \rightarrow 0} s(k) = 0$  (et donc  $s$  continue en 0 en posant  $s(0) = 0$ ). Dans (3.2), on prend  $k = g'(x)h + hr(h)$ , on obtient, avec (3.1), pour tout  $h \in \mathbb{R}$  :

$$f \circ g(x+h) = f \circ g(x) + f'(g(x))g'(x)h + f'(g(x))hr(h) + (g'(x)h + hr(h))s(g'(x)h + hr(h)),$$

que l'on peut aussi écrire

$$f \circ g(x+h) = f \circ g(x) + f'(g(x))g'(x)h + hR(h),$$

avec  $R(h) = f'(g(x))r(h) + g'(x)s(g'(x)h + hr(h)) + r(h)s(g'(x)h + hr(h))$ . Par composition de fonctions continues (les fonctions  $s$  et  $r$  sont continues en 0), on a  $\lim_{h \rightarrow 0} s(g'(x)h + hr(h)) = 0$  et donc  $\lim_{h \rightarrow 0} R(h) = 0$ . Ce qui prouve que  $f \circ g$  est différentiable, et donc dérivable, en  $x$  et que sa dérivée est  $f'(g(x))g'(x)$ . ■

**Proposition 3.4 (Fonction réciproque)** Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$  et  $f$  une application de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est strictement croissante et continue. On rappelle (théorème 2.5) que  $f$  est alors une bijection de  $]a, b[$  dans  $] \alpha, \beta[$  (avec  $\alpha = \inf(\text{Im}(f))$  et  $\beta = \sup(\text{Im}(f))$ ). On note  $g$  la fonction réciproque de  $f$ . Soit  $x \in ]a, b[$ . on suppose que  $f$  dérivable en  $x$  et  $f'(x) \neq 0$ . Alors  $g$  est dérivable en  $f(x)$  et  $g'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$ .

DÉMONSTRATION : Le théorème 2.5 donne que  $g$  est continue (sur tout l'intervalle  $] \alpha, \beta[$ ) et donc continue en  $f(x)$  (c'est-à-dire au point  $f(x)$ ). On montre maintenant que  $g$  est dérivable en  $f(x)$ . On pose  $y = f(x)$ , de sorte que  $x = g(y)$ . Soit  $h \neq 0$  t.q.  $y+h \in ] \alpha, \beta[$  (noter que  $y \in ] \alpha, \beta[$ ). On a, comme  $f \circ g(z) = z$  pour tout  $z \in ] \alpha, \beta[$  :

$$\frac{g(y+h) - g(y)}{h} = \frac{g(y+h) - g(y)}{(y+h) - y} = \frac{g(y+h) - g(y)}{f \circ g(y+h) - f \circ g(y)}.$$

Mais  $g(y) = x$  et  $g(y+h) = g(y) + k(h) = x + k(h)$  avec  $\lim_{h \rightarrow 0} k(h) = 0$  car  $g$  est continue en  $y$  (noter d'ailleurs que  $k(h) \neq 0$  car  $h \neq 0$  et  $g$  injective). On a donc :

$$\frac{g(y+h) - g(y)}{h} = \frac{x + k(h) - x}{f(x+k(h)) - f(x)} = \frac{k(h)}{f(x+k(h)) - f(x)}$$

Par composition de limite (proposition 1.8) ou composition de fonctions continues (en posant  $k(0) = 0$ ), on en déduit :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(y+h) - g(y)}{h} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k}{f(x+k) - f(x)} = \frac{1}{f'(x)},$$

ce qui montre bien que  $g$  est dérivable en  $y$  et  $g'(y) = \frac{1}{f'(x)}$ . ■

**Remarque 3.4** Dans la proposition 3.4, si on admet que  $g$  est dérivable en  $f(x)$ , la formule donnant  $g'$  au point  $f(x)$  est facile à retrouver en écrivant que  $g \circ f(y) = y$ , pour tout  $y$ , et en dérivant la fonction composée  $g \circ f$  (proposition 3.3) en  $x$ . En effet, en supposant que  $g$  est dérivable en  $f(x)$ , la proposition 3.3 donne que  $g \circ f$  est dérivable en  $x$  et  $(g \circ f)'(x) = g'(f(x))f'(x)$ . Comme  $g \circ f(y) = y$  pour tout  $y$ , on a aussi  $(g \circ f)'(x) = 1$  et donc, puisque l'on a supposé que  $f'(x) \neq 0$ ,  $g'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$ .

### Exemple 3.1

1. On note  $\ln$  l'application de  $]0, +\infty[$  dans  $\mathbb{R}$  dont la dérivée est l'application  $x \mapsto 1/x$  et qui s'annule en 1 (nous verrons au chapitre 5 que cette application existe, c'est la primitive s'annulant en 1 de l'application  $x \mapsto 1/x$  définie sur  $]0, +\infty[$ ). L'application  $\ln$  est strictement croissante et continue (car dérivable) et son image est égale  $\mathbb{R}$ . La fonction réciproque de la fonction  $\ln$  existe donc et est strictement croissante continue de  $\mathbb{R}$  dans  $]0, +\infty[$  (théorème 2.5). Cette fonction réciproque s'appelle la fonction exponentielle, c'est l'application  $x \mapsto e^x$ . En appliquant la proposition 3.4, avec  $f = \ln$  et  $g$  la fonction réciproque, on obtient pour tout  $x \in ]0, \infty[$ ,  $g'(\ln(x)) = x$  (car  $f'(x) = 1/x \neq 0$ ) et donc, pour tout  $y \in \mathbb{R}$ ,  $g'(y) = g(y)$  (car  $x = g(\ln(x))$ ). On a ainsi montré que la dérivée de la fonction exponentielle est la fonction exponentielle elle-même.

2. On définit ici l'application  $f$  de  $]0, \infty[$  dans  $]0, \infty[$  par  $f(x) = x^4$  si  $x \in ]0, \infty[$ . On montre tout d'abord que  $f$  est dérivable en tout point de  $]0, +\infty[$  et  $f'(x) = 4x^3$  pour tout  $x \in ]0, +\infty[$ . On en déduit que, pour tout  $x > 0$ ,  $g'(x) = \frac{1}{4x^4}$  où  $g$  est la fonction réciproque de  $f$ .

### 3.3 Théorème des Accroissements Finis

Nous commençons par un cas particulier du théorème des Accroissements Finis.

**Théorème 3.1 (Théorème de Rolle)** Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f$  une application de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . on suppose que  $f$  continue sur  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$  (c'est-à-dire dérivable en tout point de  $]a, b[$ ). on suppose aussi que  $f(a) = f(b)$ . Alors, il existe  $c \in ]a, b[$  t.q.  $f'(c) = 0$ .

DÉMONSTRATION : Nous démontrons ce théorème en distinguant 3 cas possibles.

**Premier cas.** On suppose que  $f(x) = f(a)$  pour tout  $x \in [a, b]$ . On prend alors pour  $c$  un point quelconque de  $]a, b[$  (par exemple  $c = \frac{1}{2}(a + b)$ ) et on a bien  $f'(c) = 0$ .

**Deuxième cas.** On suppose qu'il existe  $x \in [a, b]$  t.q.  $f(x) > f(a)$ . Comme  $f$  est continue sur  $[a, b]$ , d'après le théorème 2.3, il existe  $c \in [a, b]$  t.q.  $f(c) = M = \max\{f(x), x \in [a, b]\}$ . Comme  $M > f(a) = f(b)$ , on a donc  $c \in ]a, b[$ . Pour  $h \neq 0$  t.q.  $a \leq c + h \leq b$ , on pose

$$\varphi(h) = \frac{f(c+h) - f(c)}{h}.$$

Pour  $h > 0$ , on a  $f(c+h) \leq M = f(c)$  et donc  $\varphi(h) \leq 0$ . On en déduit que  $f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0, h > 0} \varphi(h) \leq 0$ .

Pour  $h < 0$ , on a  $f(c+h) \leq M = f(c)$  et donc  $\varphi(h) \geq 0$ . On en déduit que  $f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0, h < 0} \varphi(h) \geq 0$ .

Finalement, on a donc nécessairement  $f'(c) = 0$ .

**Troisième cas.** On suppose qu'il existe  $x \in [a, b]$  t.q.  $f(x) < f(a)$ . On raisonne alors de manière semblable au cas précédent. On remarque qu'il existe  $c \in ]a, b[$  t.q.  $f(c) = m = \min\{f(x), x \in [a, b]\}$ . Puis, on montre que  $f'(c) = 0$ . ■

Nous donnons maintenant le théorème des Accroissements Finis.

**Théorème 3.2 (Théorème des Accroissements Finis)** Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f$  une application de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . on suppose que  $f$  continue sur  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$ . Alors, il existe  $c \in ]a, b[$  t.q.  $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$ .

DÉMONSTRATION : On va utiliser le théorème 3.1 pour une fonction bien choisie. Pour  $x \in [a, b]$ , on pose

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

La fonction  $g$  est continue sur  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$ . De plus, on a  $g(b) = g(a) = f(a)$ . Le théorème 3.1 montre donc qu'il existe  $c \in ]a, b[$  t.q.  $g'(c) = 0$ . Comme  $g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ , pour tout  $x \in ]a, b[$ , on a donc  $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ , c'est-à-dire  $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ . ■

Voici maintenant quelques conséquences du théorème des Accroissements Finis.

**Remarque 3.5** Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f$  une application de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . on suppose  $f$  continue sur  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$ . On a alors :

1.  $f(b) - f(a) = \gamma(b - a)$  avec  $\bar{m} \leq \gamma \leq \bar{M}$ ,  $\bar{m} = \inf\{f'(x), x \in ]a, b[ \} \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$  et  $\bar{M} = \sup\{f'(x), x \in ]a, b[ \} \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ . (C'est équivalent à la conclusion du théorème des Accroissements Finis sauf que le théorème des Accroissements Finis donne des inégalités strictes sur  $\gamma$  lorsque les bornes  $\bar{m}$  et  $\bar{M}$  ne sont pas atteintes. Cette équivalence est due au fait que  $f'$  vérifie la propriété des valeurs intermédiaires.)
2. On suppose de plus qu'il existe  $M \in \mathbb{R}$  t.q.  $|f'(x)| \leq M$  pour tout  $x \in ]a, b[$ . Alors  $|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$ . (C'est cette forme du théorème des Accroissements Finis qui pourra être généralisée au cas d'une application de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^p$ , voir le théorème 7.1. La forme donnée dans le théorème 3.2 n'étant plus vraie si  $p > 1$ .)
3. On suppose de plus que  $f'(x) \geq 0$  pour tout  $x \in ]a, b[$ . Alors  $f$  est croissante.
4. On suppose de plus que  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in ]a, b[$ . Alors  $f$  est strictement croissante.
5. On suppose de plus que  $f'(x) = 0$  pour tout  $x \in ]a, b[$ . Alors  $f$  est constante.

On suppose maintenant que  $f$  et  $g$  sont continues sur  $[a, b]$  et dérivables sur  $]a, b[$  et que  $f'(x) = g'(x)$  pour tout  $x \in ]a, b[$ . Alors  $f - g$  est constante.

### 3.4 Fonctions de classe $C^n$

**Définition 3.4** Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$  et  $f$  une application de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$ .

1.  $f$  est dérivable sur  $]a, b[$  si  $f$  est dérivable en tout point de  $]a, b[$ .
2.  $f$  est de classe  $C^0$  (on écrit  $f \in C^0(]a, b[)$  ou  $f \in C(]a, b[)$ ) si  $f$  est continue sur  $]a, b[$ .
3.  $n \geq 1$ .  $f$  est de classe  $C^n$  sur  $]a, b[$  (on écrit  $f \in C^n(]a, b[)$ ) si  $f$  est dérivable sur  $]a, b[$  et  $f'$  est de classe  $C^{n-1}$ .
4.  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $]a, b[$  si, pour tout  $n \geq 0$ ,  $f$  est de classe  $C^n$  sur  $]a, b[$ .

Notation :  $f^{(0)} = f$  et, pour  $n \geq 1$ ,  $f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$ .

**Exemple 3.2** Exemples de fonctions de classe  $C^\infty$ .

1.  $a = -\infty, b = \infty$ .  $f(x) = e^x$  pour  $x \in \mathbb{R}$ .  $f$  est de classe  $C^\infty$  et  $f^{(n)} = f$  pour tout  $n \geq 0$ .
2.  $a = 0, b = \infty$ . Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ .  $g(x) = x^\alpha = e^{\alpha \ln(x)}$  pour  $x \in ]a, b[$ .  $g$  est de classe  $C^\infty$ ,  $g'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$ , pour tout  $x \in ]a, b[$ , et, par récurrence sur  $n$ ,  $g^{(n)}(x) = \alpha(\alpha - 1) \dots (\alpha - n + 1)x^{\alpha-n}$  pour tout  $x \in ]a, b[$  et pour tout  $n \geq 2$ .
3.  $a = 0, b = \infty$ .  $h(x) = \ln(x)$  pour  $x \in ]a, b[$ .  $h$  est de classe  $C^\infty$  et  $h'(x) = x^{-1}$  pour tout  $x \in ]a, b[$  (pour calculer les dérivées suivantes de  $h$ , on utilise alors le deuxième item). (On rappelle que la fonction  $\ln$  est définie, sur  $\mathbb{R}_+^*$ , comme étant la primitive de  $x \mapsto 1/x$  s'annulant en 1. L'existence de cette primitive est montrée au chapitre 5.)

## 3.5 Exercices

### Exercice 3.1 (Opérations sur les dérivées)

Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$ ,  $x \in ]a, b[$  et  $f, g$  deux applications de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  et  $g$  sont dérivables en  $x$ .

1. Montrer que  $(f + g)$  est dérivable en  $x$  et  $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$ .
2. Montrer que  $fg$  est dérivable en  $x$  et  $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ .
3. On suppose que  $g(y) \neq 0$  pour tout  $y \in ]a, b[$ . Montrer que  $f/g$  est dérivable en  $x$  et que :

$$(f/g)'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}.$$

### Exercice 3.2 (Dérivée en un point)

Soit  $f$  une application continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est dérivable pour tout  $x \neq 0$  et que  $f'$  (définie sur  $\mathbb{R}^*$ ) admet une limite en 0, notée  $l$ . Montrer que  $f$  est dérivable en 0 et que  $f'(0) = l$ . [On pourra utiliser le théorème des accroissements finis.]

### Exercice 3.3 (Dérivabilité de $x \mapsto |x|^a$ )

Etudier, selon les valeurs du paramètre  $a > 0$ , la continuité et la dérivabilité de l'application  $f$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  définie par  $f(x) = |x|^a$  pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$  et  $f(0) = 0$ .

### Exercice 3.4 (Dérivée non continue)

On définit  $f$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  par :

$$\begin{aligned} f(x) &= 0, \text{ si } x \leq 0, \\ f(x) &= x^2 \sin \frac{1}{x}, \text{ si } x > 0. \end{aligned}$$

Montrer que  $f$  est dérivable en tout point de  $\mathbb{R}$  et calculer  $f'(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . La dérivée de  $f$  est-elle continue ?

### Exercice 3.5 (Dérivée et propriété des valeurs intermédiaires)

Soit  $-\infty \leq a < b \leq \infty$  et  $f$  une application de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est dérivable pour tout  $x \in ]a, b[$ . On va montrer, dans cet exercice, que  $f'$  (définie sur  $]a, b[$ ) vérifie la propriété des valeurs intermédiaires.

Soit  $c, d \in ]a, b[$ ,  $c < d$ , et  $\gamma$  appartenant à l'intervalle ouvert dont les bornes sont  $f'(c)$  et  $f'(d)$ .

1. Montrer qu'il existe  $\eta \in ]0, d - c[$  t.q.  $\gamma$  appartienne à l'intervalle ouvert dont les bornes sont  $\frac{f(c+\eta)-f(c)}{\eta}$  et  $\frac{f(d-\eta)-f(d)}{-\eta}$ .
2. On définit  $g$  de  $[c, d - \eta]$  dans  $\mathbb{R}$  (avec  $\eta$  donné par la question précédente) par :

$$g(x) = \frac{f(x + \eta) - f(x)}{\eta}, \text{ pour } x \in [c, d - \eta].$$

Montrer que  $g$  est continue sur l'intervalle  $[c, d - \eta]$  et en déduire qu'il existe  $y \in [c, d - \eta]$  t.q.  $g(y) = \gamma$ .

3. Montrer qu'il existe  $z \in [c, d]$  t.q.  $f'(z) = \gamma$ .

**Exercice 3.6 (Propriété des valeurs intermédiaires n'implique pas continuité)**

En utilisant les deux exercices précédents, donner un exemple d'application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  vérifiant la propriété des valeurs intermédiaires et non continue.

**Exercice 3.7 (Accroissements finis "généralisés")**

Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ . Soit  $f$  et  $g$  deux applications continues de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  et  $g$  sont dérivables pour tout  $x \in ]a, b[$  et que  $g'(x) \neq 0$  pour tout  $x \in ]a, b[$ .

1. Montrer que  $g(x) - g(a) \neq 0$  pour tout  $x \in ]a, b[$ .

2. Montrer qu'il existe  $c \in ]a, b[$  t.q. :

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

[On pourra considérer la fonction  $u$  définie sur  $[a, b]$  par  $u(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}g(x)$ .]

**Exercice 3.8**

Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ . Soit  $f$  une application continue de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est deux fois dérivable pour tout  $x \in ]a, b[$  (c'est-à-dire que  $f$  est dérivable pour tout  $x \in ]a, b[$  et que  $f'$ , qui est donc définie sur  $]a, b[$ , est aussi dérivable pour tout  $x \in ]a, b[$ ). Soit  $x_0 \in ]a, b[$ .

1. Montrer qu'il existe  $A \in \mathbb{R}$  t.q. :

$$f(x_0) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x_0 - a) + \frac{(x_0 - a)(x_0 - b)}{2}A.$$

2. On définit  $\varphi$  sur  $[a, b]$  par :

$$\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) - \frac{(x - a)(x - b)}{2}A.$$

Montrer qu'il existe  $c \in ]a, x_0[$  et  $d \in ]x_0, b[$  t.q.  $\varphi'(c) = \varphi'(d) = 0$ .

3. Montrer qu'il existe  $\theta \in ]a, b[$  t.q. :

$$f(x_0) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x_0 - a) + \frac{(x_0 - a)(x_0 - b)}{2}f''(\theta).$$

**Exercice 3.9**

Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $f(x) = x + e^x$ . Montrer que  $f$  est strictement croissante, continue et bijective de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On note  $g$  l'application réciproque de  $f$ . Montrer que  $g$  est deux fois dérivable sur  $\mathbb{R}$ . Calculer  $g'(1)$  et  $g''(1)$ .

**Exercice 3.10 (Limite à l'infini)**

Soit  $f$  une fonction dérivable de  $]0, \infty[$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$ . Montrer que  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ .

**Exercice 3.11 (Dérivabilité en un point)**

Soit  $f$  une application continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ .

1. On suppose que  $f$  est dérivable en tout point  $x$  différent de  $a$  et que  $f'$  (définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ ) admet une limite en  $a$ , notée  $a_1$ . Montrer que  $f$  est dérivable en  $a$  et que  $f'(a) = a_1$ . [Cette question a été faite dans un exercice précédent avec  $a = 0$ .]
2. On suppose que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{a\}$  et que, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $f^{(n)}$  (définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ ) admet une limite en  $a$ , notée  $a_n$ . Montrer que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ . [On pourra raisonner par récurrence sur  $n$ .]

### Exercice 3.12 (Fonctions höldériennes)

Soit  $f$  une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ ,  $\beta \in \mathbb{R}$ ,  $\beta > 0$  et  $k \in \mathbb{R}$ ,  $k > 0$ . On suppose que, pour tout  $x, y \in \mathbb{R}$ ,  $|f(y) - f(x)| \leq k|y - x|^\beta$ .

1. Montrer que  $f$  est continue en tout point de  $\mathbb{R}$ .
2. On suppose, dans cette question, que  $\beta > 1$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$ , montrer que  $f'(x) = 0$ . En déduire que  $f$  est constante.
3. (Exemple) Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $g(x) = |x|^{\frac{1}{2}}$ . Montrer que, pour tout  $x, y \in \mathbb{R}$ , on a  $|g(y) - g(x)| \leq |y - x|^{\frac{1}{2}}$ . [On pourra montrer qu'on peut supposer  $|y| \geq |x|$ , et distinguer les cas où  $x$  et  $y$  sont de même signe et où  $x$  et  $y$  sont de signe contraire.]

### Exercice 3.13 (Exercice de rédaction...)

Soit  $\varphi$  une application de  $]0, \infty[$  dans  $\mathbb{R}$ , dérivable (en tout point de  $]0, \infty[$ ) et t.q.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \varphi(x) = 0$ .

1. On suppose que  $\varphi'(x) \leq 0$  pour tout  $x > 0$ . Montrer que  $\varphi(x) \geq 0$  pour tout  $x > 0$ .
2. On suppose que  $\varphi'(x) < 0$  pour tout  $x > 0$ . Montrer que  $\varphi(x) > 0$  pour tout  $x > 0$ .

### Exercice 3.14 (Etude d'une fonction)

Soit  $a > 0$ . On définit  $f$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  de la manière suivante :

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(1 + \frac{a}{|x|}\right)^x, \text{ si } x \neq 0, \\ f(0) &= 1. \end{aligned}$$

(On rappelle que  $b^x = e^{x \ln b}$ , pour  $b > 0$  et  $x \in \mathbb{R}$ .)

1. (Continuité de  $f$ )
  - (a) Montrer que  $e^z \geq 1 + \frac{z^2}{2}$  pour tout  $z \in \mathbb{R}_+$ .  
En déduire que  $\ln(1 + y) \leq \sqrt{2y}$ , pour tout  $y \in \mathbb{R}_+$ .
  - (b) En utilisant la question précédente, montrer que  $1 \leq f(x) \leq e^{\sqrt{2ax}}$ , pour tout  $x \in ]0, \infty[$ .
  - (c) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} f(x) = 1$ .
  - (d) Montrer que  $f$  est continue en 0. [On pourra remarquer que  $f(x)f(-x) = 1$ , pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .]
2. (Dérivabilité de  $f$  sur  $\mathbb{R}^*$ ) Montrer que  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^*$  et que  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \neq 0$ . [Pour  $x > 0$ , on pourra mettre  $f'(x)$  sous la forme  $f(x)\varphi(x)$  et utiliser l'exercice 3.13.] Montrer que  $f$  est strictement croissante.

3. (Dérivabilité en 0 ?) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = +\infty$ . L'application  $f$  est-elle dérivable en 0 ? (Justifier la réponse...)
4. (Limites en  $\pm\infty$ ) Donner (en fonction de  $a$ ) les limites en  $+\infty$  et  $-\infty$  de  $f$ .  
Dans la suite, on note  $l$  et  $m$  ces limites.
5. (Fonction réciproque) Montrer que  $f$  est une bijection de  $\mathbb{R}$  dans  $]m, l[$ . On note  $g$  la fonction réciproque de  $f$  (de sorte que  $g$  est une application de  $]m, l[$  dans  $\mathbb{R}$ ). Montrer que  $g$  est dérivable en 1 (noter que  $1 \in ]m, l[$ ) et calculer  $g'(1)$ . [Pour  $h \neq 0$ , on pourra appliquer le théorème des Accroissements Finis à la fonction  $f$  entre les points  $g(1+h)$  et  $g(1)$ .]
6. (Régularité de la fonction réciproque) Montrer que la fonction réciproque de  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $]m, l[$  mais que  $f$  n'est pas de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

### 3.6 Exercices corrigés

#### Exercice 3.15 (Corrigé de l'exercice 3.8)

Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ . Soit  $f$  une application continue de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est deux fois dérivable pour tout  $x \in ]a, b[$  (c'est-à-dire que  $f$  est dérivable pour tout  $x \in ]a, b[$  et que  $f'$ , qui est donc définie sur  $]a, b[$ , est aussi dérivable pour tout  $x \in ]a, b[$ ). Soit  $x_0 \in ]a, b[$ .

1. Montrer qu'il existe  $A \in \mathbb{R}$  t.q. :

$$f(x_0) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x_0 - a) + \frac{(x_0 - a)(x_0 - b)}{2}A.$$

---

corrigé

---

Il suffit de définir de définir  $A$  par la formule suivante :

$$A = \frac{2}{(x_0 - a)(x_0 - b)} \left( f(x_0) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x_0 - a) \right).$$

On obtient bien

$$f(x_0) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x_0 - a) + \frac{(x_0 - a)(x_0 - b)}{2}A. \quad (3.3)$$


---

2. On définit  $\varphi$  sur  $[a, b]$  par :

$$\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) - \frac{(x - a)(x - b)}{2}A.$$

Montrer qu'il existe  $c \in ]a, x_0[$  et  $d \in ]x_0, b[$  t.q.  $\varphi'(c) = \varphi'(d) = 0$ .

---

corrigé

---

La fonction  $\varphi$  est continue sur l'intervalle  $[a, x_0]$  et dérivable sur l'intervalle  $]a, x_0[$ , on peut donc utiliser le théorème des accroissements finis (théorème 3.2). Il donne l'existence de  $c \in ]a, x_0[$  t.q.  $\varphi(x_0) - \varphi(a) = \varphi'(c)(x_0 - a)$ . Comme  $\varphi(a) = 0$  et  $\varphi(x_0) = 0$  (par le choix de  $A$ ), on a donc  $\varphi'(c) = 0$ .

De même, la fonction  $\varphi$  est continue sur l'intervalle  $[x_0, b]$  et dérivable sur l'intervalle  $]x_0, b[$ , on peut donc utiliser le théorème des accroissements finis. Il donne l'existence de  $d \in ]x_0, b[$  t.q.  $\varphi(x_0) - \varphi(b) = \varphi'(d)(x_0 - b)$ . Comme  $\varphi(b) = \varphi(x_0) = 0$ , on a donc  $\varphi'(d) = 0$ .

---

3. Montrer qu'il existe  $\theta \in ]a, b[$  t.q. :

$$f(x_0) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x_0 - a) + \frac{(x_0 - a)(x_0 - b)}{2} f''(\theta).$$

---

**corrigé**

---

La fonction  $\varphi'$  est continue sur l'intervalle  $[c, d]$  et dérivable sur l'intervalle  $]c, d[$  (car  $c, d \in ]a, b[$  et que  $f'$  est dérivable sur  $]a, b[$ ), on peut donc utiliser le théorème des accroissements finis. Il donne l'existence de  $\theta \in ]c, d[$  t.q.  $\varphi''(\theta) = 0$ . Or, pour tout  $x \in ]a, b[$ , on a  $\varphi''(x) = f''(x) - A$ . On a donc  $A = \varphi''(\theta)$ . En reportant cette valeur de  $A$  dans (3.3) on obtient bien  $f(x_0) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x_0 - a) + \frac{(x_0 - a)(x_0 - b)}{2} f''(\theta)$ .

N.B. Pour les questions 2 et 3, on peut aussi utiliser la version "réduite" du théorème 3.2, c'est-à-dire le théorème de Rolle (théorème 3.1).

---

### Exercice 3.16 (Corrigé de l'exercice 3.11)

Soit  $f$  une application continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ .

1. On suppose que  $f$  est dérivable en tout point  $x$  différent de  $a$  et que  $f'$  (définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ ) admet une limite en  $a$ , notée  $a_1$ . Montrer que  $f$  est dérivable en  $a$  et que  $f'(a) = a_1$ . [Cette question a été faite dans un exercice précédent avec  $a = 0$ .]

---

**corrigé**

---

On veut montrer que  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = a_1$ , c'est-à-dire que pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q. :

$$h \neq 0, |h| \leq \alpha \Rightarrow \left| \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - a_1 \right| \leq \varepsilon. \quad (3.4)$$

Soit  $\varepsilon > 0$ . On cherche donc  $\alpha$  vérifiant (3.4). Comme  $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = a_1$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q. :

$$y \neq a, |y - a| \leq \alpha \Rightarrow |f'(y) - a_1| \leq \varepsilon. \quad (3.5)$$

Soit maintenant  $h \neq 0$  t.q.  $|h| \leq \alpha$ . En appliquant le théorème des accroissements finis (théorème 3.2) à la fonction  $f$  (qui est continue sur l'intervalle fermé dont les bornes sont  $a$  et  $a+h$  et dérivable sur l'intervalle ouvert dont les bornes sont  $a$  et  $a+h$ ) il existe  $y$  strictement compris entre  $a$  et  $a+h$  t.q.  $f(a+h) - f(a) = hf'(y)$ . Comme  $|y - a| \leq |h| \leq \alpha$ , on peut utiliser (3.4) et on obtient :

$$\left| \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - a_1 \right| = |f'(y) - a_1| \leq \varepsilon.$$

Pour tout  $\varepsilon > 0$ , on a donc bien trouvé  $\alpha > 0$  vérifiant 3.5. Ceci prouve que  $f$  est dérivable en  $a$  et que  $f'(a) = a_1$ . Comme  $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = a_1$ , on a donc aussi montré que  $f'$  est continue en  $a$ .

---

2. On suppose que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{a\}$  et que, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $f^{(n)}$  (définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ ) admet une limite en  $a$ , notée  $a_n$ . Montrer que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ . [On pourra raisonner par récurrence sur  $n$ .]

---

**corrigé**

---

On va montrer, par récurrence sur  $n$ , que  $f$  est de classe  $C^n$  sur  $\mathbb{R}$ , pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Initialisation.** Pour  $n = 0$ , on a bien  $f$  de classe  $C^0$  (car  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ ).

**Hérédité.** Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On suppose que  $f$  est de classe  $C^n$ , en on va montrer que  $f$  est de classe  $C^{n+1}$ . On pose  $g = f^{(n)}$ . La fonction  $g$  est donc continue sur  $\mathbb{R}$ . Les hypothèses de la question donne aussi que  $g$  est dérivable sur  $\mathbb{R} \setminus \{a\}$  et que  $\lim_{x \rightarrow a} g'(x) = a_{n+1}$  (car  $g' = f^{(n+1)}$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ ). On peut donc appliquer la question 1 à la fonction  $g$ . Elle donne que  $g$  est dérivable en  $a$  et que  $g'$  est continue en  $a$ . Comme  $g = f^{(n)}$ , on a donc  $f^{(n)}$  dérivable en  $a$  et  $f^{(n+1)}$  continue en  $a$ . Les hypothèses de la question donnant aussi que  $f^{(n)}$  est dérivable sur  $\mathbb{R} \setminus \{a\}$  et que  $f^{(n+1)}$  est continue sur  $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ , on obtient finalement que  $f$  est de classe  $C^{n+1}$ .

On a bien ainsi montré, par récurrence sur  $n$ , que  $f$  est de classe  $C^n$  sur  $\mathbb{R}$ , pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Ceci signifie que  $f$  est de classe  $C^\infty$ .

---

### Exercice 3.17 (Corrigé de l'exercice 3.12)

Soit  $f$  une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ ,  $\beta \in \mathbb{R}$ ,  $\beta > 0$  et  $k \in \mathbb{R}$ ,  $k > 0$ . On suppose que, pour tout  $x, y \in \mathbb{R}$ ,  $|f(y) - f(x)| \leq k|y - x|^\beta$ .

1. Montrer que  $f$  est continue en tout point de  $\mathbb{R}$ .

---

**corrigé**

---

On va même montrer que  $f$  est uniformément continue. Soit  $\varepsilon > 0$ . On pose  $\alpha = \left(\frac{\varepsilon}{k}\right)^{\frac{1}{\beta}}$ , de sorte que  $\alpha > 0$  et :

$$x, y \in \mathbb{R}, |x - y| \leq \alpha \Rightarrow |f(y) - f(x)| \leq k|y - x|^\beta \leq k\alpha^\beta = \varepsilon.$$

Ceci montre bien que  $f$  est uniformément continue sur  $\mathbb{R}$ .

---

2. On suppose, dans cette question, que  $\beta > 1$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$ , montrer que  $f'(x) = 0$ . En déduire que  $f$  est constante.

---

**corrigé**

---

Pour  $h \neq 0$ , on a, en utilisant l'hypothèse sur  $f$  avec  $y = x + h$ ,  $|f(x + h) - f(x)| \leq k|h|^\beta$ . On en déduit :

$$0 \leq \left| \frac{f(x + h) - f(x)}{h} \right| \leq k|h|^{\beta-1}.$$

Comme  $\beta > 1$ , on a  $\lim_{h \rightarrow 0} k|h|^{\beta-1} = 0$  et donc  $\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right| = 0$  (on raisonne ici avec un  $x$  fixé). Ceci prouve que  $f'(x) = 0$ .

On a donc montré que  $f'(x) = 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . En utilisant le théorème des accroissements finis, ceci implique que  $f$  est constante (voir la remarque 3.5). On rappelle ici cette démonstration. Soit  $x \in \mathbb{R}^*$ . Le théorème des accroissements finis (théorème 3.2) donne l'existence de  $y$  entre 0 et  $x$  t.q.  $f(x) - f(0) = x f'(y)$ . comme  $f'(y) = 0$ , on a donc  $f(x) = f(0)$ . La fonction  $f$  est donc constante.

---

3. (Exemple) Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $g(x) = |x|^{\frac{1}{2}}$ . Montrer que, pour tout  $x, y \in \mathbb{R}$ , on a  $|g(y) - g(x)| \leq |y - x|^{\frac{1}{2}}$ . [On pourra montrer qu'on peut supposer  $|y| \geq |x|$ , et distinguer les cas où  $x$  et  $y$  sont de même signe et où  $x$  et  $y$  sont de signe contraire.]

---

**corrigé**

---

Soit  $x, y \in \mathbb{R}$ . En changeant éventuellement  $x$  en  $y$  et  $y$  en  $x$  (ce qui ne change pas  $|g(y) - g(x)|$  et  $|y - x|$ ), on peut supposer  $|y| \geq |x|$ . En changeant éventuellement  $y$  en  $-y$  et  $x$  en  $-x$  (ce qui ne change toujours pas  $|g(y) - g(x)|$  et  $|y - x|$ ), on peut également supposer  $y \geq 0$ . On distingue maintenant 2 cas selon le signe de  $x$ .

**Cas 1.** On suppose ici  $x \geq 0$ . On a alors  $|g(y) - g(x)| = \sqrt{y} - \sqrt{x}$  et  $|y - x| = y - x$ . On remarque alors que  $(\sqrt{y} - \sqrt{x})^2 = y + x - 2\sqrt{y}\sqrt{x} \leq y + x - 2\sqrt{x}\sqrt{x}$  (car  $\sqrt{y} \geq \sqrt{x}$ ) et donc  $(\sqrt{y} - \sqrt{x})^2 \leq y + x - 2x = y - x$ , ce qui donne bien :

$$|g(y) - g(x)| = \sqrt{y} - \sqrt{x} \leq \sqrt{y - x} = |y - x|^{\frac{1}{2}}.$$

**Cas 2.** On suppose ici  $x < 0$ . Comme  $g(y) \geq g(x) \geq 0$ , on a  $|g(y) - g(x)| = g(y) - g(x) \leq g(y)$ . En utilisant le premier cas précédent avec le couple  $(0, y)$ , on a :

$$g(y) = |g(y) - g(0)| \leq y^{\frac{1}{2}}.$$

Comme  $0 \leq y \leq y - x$ , on a  $y^{\frac{1}{2}} \leq |y - x|^{\frac{1}{2}}$  et donc :

$$|g(y) - g(x)| \leq g(y) \leq y^{\frac{1}{2}} \leq |y - x|^{\frac{1}{2}}.$$


---

### Exercice 3.18 (Corrigé de l'exercice 3.13)

Soit  $\varphi$  une application de  $]0, \infty[$  dans  $\mathbb{R}$ , dérivable (en tout point de  $]0, \infty[$ ) et t.q.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \varphi(x) = 0$ .

1. On suppose que  $\varphi'(x) \leq 0$  pour tout  $x > 0$ . Montrer que  $\varphi(x) \geq 0$  pour tout  $x > 0$ .

---

**corrigé**

---

Soit  $x > 0$ . On veut montrer que  $\varphi(x) \geq 0$ .

Soit  $y > x$ . La fonction  $f$  est continue sur  $[x, y]$  et dérivable sur  $]x, y[$ . Le théorème des accroissements finis donne donc l'existence de  $z \in ]x, y[$  t.q.  $\varphi(y) - \varphi(x) = (y - x)\varphi'(z)$ . Comme  $\varphi'(z) \leq 0$  et  $y > x$ , on a donc  $\varphi(x) \geq \varphi(y)$ . On peut maintenant passer à la limite dans cette inégalité quand  $y$  tend vers  $+\infty$  (avec  $x$  fixé) et on obtient :

$$\varphi(x) \geq \lim_{y \rightarrow \infty} \varphi(y) = 0.$$


---

2. On suppose que  $\varphi'(x) < 0$  pour tout  $x > 0$ . Montrer que  $\varphi(x) > 0$  pour tout  $x > 0$ .

---

**corrigé**

---

Soit  $x > 0$ . En appliquant encore une fois le théorème des accroissements finis, il existe  $z \in ]x, x + 1[$  t.q.  $\varphi(x + 1) - \varphi(x) = \varphi'(z)$ . Comme  $\varphi'(z) < 0$  n a donc  $\varphi(x) > \varphi(x + 1)$ . Or, on sait, par la question 1, que  $\varphi(x + 1) \geq 0$ . On a donc  $\varphi(x) > 0$ .

---

**Exercice 3.19 (Corrigé de l'exercice 3.14)**

Soit  $a > 0$ . On définit  $f$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  de la manière suivante :

$$f(x) = \left(1 + \frac{a}{|x|}\right)^x, \text{ si } x \neq 0, \\ f(0) = 1.$$

(On rappelle que  $b^x = e^{x \ln b}$ , pour  $b > 0$  et  $x \in \mathbb{R}$ .)

1. (Continuité de  $f$ )

(a) Montrer que  $e^z \geq 1 + \frac{z^2}{2}$  pour tout  $z \in \mathbb{R}_+$ .

En déduire que  $\ln(1+y) \leq \sqrt{2y}$ , pour tout  $y \in \mathbb{R}_+$ .

-----  
**corrigé**

On pose, pour  $z \in \mathbb{R}$ ,  $g(z) = e^z - 1 - \frac{z^2}{2}$ . La fonction  $g$  est de classe  $C^\infty$  et on a  $g'(z) = e^z - z$ ,  $g''(z) = e^z - 1$  pour tout  $z \in \mathbb{R}$ . Comme  $g''(z) \geq 0$  pour tout  $z \in \mathbb{R}_+$ , la fonction  $g'$  est croissante sur  $\mathbb{R}_+$  (d'après le troisième item de la remarque 3.5). On a donc  $g'(z) \geq g'(0) = 1 \geq 0$  pour tout  $z \in \mathbb{R}_+$ . La fonction  $g$  est donc croissante sur  $\mathbb{R}_+$  (toujours par le troisième item de la remarque 3.5), ce qui donne  $g(z) \geq g(0) = 0$  pour tout  $z \in \mathbb{R}_+$ . Ce qui donne bien :

$$e^z \geq 1 + \frac{z^2}{2} \text{ pour tout } z \in \mathbb{R}_+.$$

Soit  $y \in \mathbb{R}_+$ . On applique l'inégalité précédente avec  $z = \sqrt{2y} \in \mathbb{R}_+$ , on obtient que  $e^{\sqrt{2y}} \geq 1 + y$ . Comme la fonction  $\ln$  est croissante sur  $\mathbb{R}_+^*$ , on obtient :

$$\sqrt{2y} \geq \ln(1+y).$$

(b) En utilisant la question précédente, montrer que  $1 \leq f(x) \leq e^{\sqrt{2ax}}$ , pour tout  $x \in ]0, \infty[$ .

-----  
**corrigé**

Soit  $x > 0$ . Comme  $f(x) = e^{x \ln(1 + \frac{a}{x})}$ , on a  $f(x) \geq 1$  (car  $x \ln(1 + \frac{a}{x}) > 0$ ) et, en utilisant la question précédente avec  $y = \frac{a}{x}$ ,  $f(x) \leq e^{x \sqrt{2 \frac{a}{x}}} = e^{\sqrt{2ax}}$ .

(c) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} f(x) = 1$ .

-----  
**corrigé**

En passant à limite, quand  $x \rightarrow 0$  avec  $x > 0$ , dans l'inégalité  $1 \leq f(x) \leq e^{\sqrt{2ax}}$ , on obtient que  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} f(x) = 1$ .

(d) Montrer que  $f$  est continue en 0. [On pourra remarquer que  $f(x)f(-x) = 1$ , pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .]

-----  
**corrigé**

Comme  $f(x) = \frac{1}{f(-x)}$  pour tout  $x < 0$ , on a (avec la question précédente) :

$$\lim_{x \rightarrow 0, x < 0} f(x) = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} f(x)} = 1.$$

On a donc  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ , et, comme  $f(0) = 1$ , on en déduit que  $f$  est continue en 0.

2. (Dérivabilité de  $f$  sur  $\mathbb{R}^*$ ) Montrer que  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^*$  et que  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \neq 0$ . [Pour  $x > 0$ , on pourra mettre  $f'(x)$  sous la forme  $f(x)\varphi(x)$  et utiliser l'exercice 3.13.] Montrer que  $f$  est strictement croissante.

————— corrigé —————

Pour  $x \in \mathbb{R}_+^*$ , on a  $f(x) = e^{x \ln(1 + \frac{a}{x})}$ . On en déduit que  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  comme composée de fonctions de classe  $C^1$  (on a même  $f$  de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ ).

De même, pour  $x \in \mathbb{R}_-^*$ , on a  $f(x) = e^{x \ln(1 - \frac{a}{x})}$ . On en déduit que  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}_-^*$  comme composée de fonctions de classe  $C^1$ . La fonction  $f$  est donc de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^*$ .

Pour  $x > 0$ , on a  $f'(x) = f(x)\varphi(x)$  avec :

$$\varphi(x) = \ln\left(1 + \frac{a}{x}\right) - \frac{a}{a+x}.$$

En tout point de  $\mathbb{R}_+^*$ ,  $\varphi$  est dérivable et on a, pour  $x \in \mathbb{R}_+^*$  :

$$\varphi'(x) = -\frac{a}{x(a+x)} + \frac{a}{(a+x)^2} = -\frac{a^2}{x(a+x)^2} < 0.$$

De plus, on a  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 0$ . Avec l'exercice 3.13, on en déduit que  $\varphi(x) > 0$  pour tout  $x > 0$ . Comme  $f'(x) = f(x)\varphi(x)$  et que  $f(x) > 0$ , on a donc aussi  $f'(x) > 0$  pour tout  $x > 0$ . En utilisant le quatrième item de la remarque 3.5, on en déduit que  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}_+$ .

Pour  $x \in \mathbb{R}_-^*$  on a  $f(x) = \frac{1}{f(-x)}$ . On a donc  $f$  dérivable sur  $\mathbb{R}_-^*$  et  $f'(x) = \frac{f'(-x)}{f(-x)^2}$  (pour tout  $x < 0$ ). On a donc aussi  $f'(x) > 0$  pour tout  $x < 0$ , ce qui donne que  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}_-$ . Finalement, on a bien montré que  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

3. (Dérivabilité en 0 ?) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = +\infty$ . L'application  $f$  est-elle dérivable en 0 ? (Justifier la réponse...)

————— corrigé —————

En reprenant la fonction  $\varphi$  introduite à la question précédente, on a  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} \varphi(x) = +\infty$ . Comme  $f'(x) = f(x)\varphi(x)$  pour tout  $x > 0$  et que  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ , on en déduit :

$$\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} f'(x) = +\infty.$$

Comme  $f'(x) = \frac{f'(-x)}{f(-x)^2}$  pour tout  $x < 0$ , on a aussi  $\lim_{x \rightarrow 0, x < 0} f'(x) = +\infty$ . On a donc  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = +\infty$ .

On va montrer maintenant que  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = +\infty$  (ce qui prouve bien que  $f$  n'est pas dérivable en 0).

Soit  $M \in \mathbb{R}$ . Comme  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = +\infty$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q. :

$$x \neq 0, |x| \leq \alpha \Rightarrow f'(x) \geq M.$$

Soit  $h \neq 0$ ,  $|h| \leq \alpha$ . En appliquant le théorème des accroissements finis (théorème 3.2) à la fonction  $f$  sur l'intervalle dont les bornes sont 0 et  $h$ , il existe  $x$  strictement entre 0 et  $h$  t.q.  $f(h) - f(0) = hf'(x)$ . Comme  $x \neq 0$  et  $|x| < |h| \leq \alpha$ , on a  $f'(x) \geq M$  et donc :

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = f'(x) \geq M.$$

On a donc :

$$h \neq 0, |h| \leq \alpha \Rightarrow \frac{f(h) - f(0)}{h} \geq M.$$

Ceci prouve que  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = +\infty$  et donc que  $f$  n'est pas dérivable en 0.

---

4. (Limites en  $\pm\infty$ ) Donner (en fonction de  $a$ ) les limites en  $+\infty$  et  $-\infty$  de  $f$ .

**corrigé**

---

Pour  $y \in ]-\frac{1}{a}, +\infty[$ , on pose  $\psi(y) = \ln(1 + ay)$ . La fonction  $\psi$  est dérivable et  $\psi'(y) = \frac{a}{1+ay}$ . On a donc, en particulier :

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + ay)}{y} = \psi'(0) = a.$$

On a donc (en posant  $y = \frac{1}{x}$ )  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(1 + \frac{a}{x}) = a$ . On en déduit que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e^a$ .

Comme  $f(x) = \frac{1}{f(-x)}$ , on a  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)} = e^{-a}$ .

---

Dans la suite, on note  $l$  et  $m$  ces limites.

**corrigé**

---

On a donc  $l = e^a$  et  $m = e^{-a}$

---

5. (Fonction réciproque) Montrer que  $f$  est une bijection de  $\mathbb{R}$  dans  $]m, l[$ . On note  $g$  la fonction réciproque de  $f$  (de sorte que  $g$  est une application de  $]m, l[$  dans  $\mathbb{R}$ ). Montrer que  $g$  est dérivable en 1 (noter que  $1 \in ]m, l[$ ) et calculer  $g'(1)$ . [Pour  $h \neq 0$ , on pourra appliquer le théorème des Accroissements Finis à la fonction  $f$  entre les points  $g(1+h)$  et  $g(1)$ .]

**corrigé**

---

La fonction  $f$  est continue strictement croissante de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . Ses limites en  $+\infty$  et  $-\infty$  sont  $l$  et  $m$ . Le théorème 2.5 donne alors que  $f$  est une bijection de  $\mathbb{R}$  dans  $]m, l[$  et que sa fonction réciproque, notée  $g$ , est continue strictement croissante de  $]m, l[$  dans  $\mathbb{R}$ .

On va montrer maintenant que  $g$  est dérivable en 1 et que  $g'(1) = 0$ , c'est-à-dire que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(1+h) - g(1)}{h} = 0.$$

L'idée principale est de remarquer que, pour  $h \neq 0$  (et t.q.  $1+h \in ]m, l[$ ), on a :

$$\frac{g(1+h) - g(1)}{h} = \frac{\tau}{f(\tau) - f(0)},$$

avec  $\tau = g(1+h) - g(1) = g(1+h)$  (car  $g(1) = 0$  puisque  $f(0) = 1$ ) et donc  $f(\tau) = 1+h = f(0)+h$ . (Noter aussi que  $\tau \neq 0$  car  $g$  est injective).

Comme  $g$  est continue, on a  $\lim_{h \rightarrow 0} g(1+h) - g(1) = 0$ . Pour montrer que  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(1+h) - g(1)}{h} = 0$ , il suffit donc de montrer que  $\lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\tau}{f(\tau) - f(0)} = 0$ , c'est-à-dire que pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q. :

$$\tau \neq 0, |\tau| \leq \alpha \Rightarrow \left| \frac{\tau}{f(\tau) - f(0)} \right| \leq \varepsilon. \quad (3.6)$$

Soit  $\varepsilon > 0$ . On cherche  $\alpha > 0$  satisfaisant (3.6). Comme  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = +\infty$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q.

$$x \neq 0, |x| \leq \alpha \Rightarrow f'(x) \geq \frac{1}{\varepsilon}. \quad (3.7)$$

Soit  $\tau \neq 0$  t.q.  $|\tau| \leq \alpha$ . On applique le théorème des accroissements finis à la fonction  $f$  sur l'intervalle dont les bornes sont 0 et  $\tau$ . Il donne l'existence de  $z$  strictement entre 0 et  $\tau$  t.q.  $f(\tau) - f(0) = \tau f'(z)$ . On a donc  $\frac{\tau}{f(\tau) - f(0)} = \frac{1}{f'(z)}$ . Comme  $f'(z) \geq \frac{1}{\varepsilon} > 0$  (grâce à (3.7) car  $|z| \leq |\tau| \leq \alpha$ ), on a donc  $0 < \frac{\tau}{f(\tau) - f(0)} \leq \varepsilon$ .

ce qui donne :

$$\left| \frac{\tau}{f(\tau) - f(0)} \right| \leq \varepsilon.$$

On a donc trouvé  $\alpha > 0$  satisfaisant (3.6). Ce qui prouve que  $g$  est dérivable en 1 et  $g'(1) = 0$ .

6. (Régularité de la fonction réciproque) Montrer que la fonction réciproque de  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $]m, l[$  mais que  $f$  n'est pas de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

**corrigé**

La fonction  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^*$  (mais pas sur  $\mathbb{R}$  car  $f$  n'est pas dérivable en 0) et  $f'$  ne s'annule pas sur  $\mathbb{R}^*$  (on a montré que  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$ ). On en déduit que la fonction réciproque de  $f$ , notée  $g$ , est de classe  $C^1$  sur  $\{f(x), x \in \mathbb{R}^*\}$ , c'est-à-dire sur  $]m, 1[ \cup ]1, l[$ . Plus précisément, pour tout  $y \in ]m, 1[ \cup ]1, l[$ , on a :

$$g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}.$$

Comme  $g$  est continue sur  $]m, l[$  et que  $f'$  est continue et non nulle sur  $\mathbb{R}^*$ , on en déduit bien que  $g'$  est continue sur  $]m, 1[ \cup ]1, l[$  (noter que  $g(y) \neq 0$  si  $y \neq 0$  car  $g$  est injective). Dans la question 6, on a montré que  $g$  est dérivable en 1 et que  $g'(1) = 0$ . Pour montrer que  $g$  est de classe  $C^1$  sur  $]m, l[$ , il reste donc seulement à montrer que  $g'$  est continue en 1. Or, comme  $\lim_{y \rightarrow 1} g(y) = g(1) = 0$ , on a :

$$\lim_{y \rightarrow 1} g'(y) = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{1}{f'(g(y))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{f'(x)} = 0.$$

Ce qui prouve la continuité de  $g'$  en 1. On a bien, finalement, montré que  $g$  est de classe  $C^1$  sur  $]m, l[$ .

**Exercice 3.20 (Points fixes de  $f$ , si  $f \circ f = f$ )**

Soit  $-\infty < a < b < +\infty$  et  $f$  une fonction continue de  $[a, b]$  dans  $[a, b]$ . On rappelle que  $x \in [a, b]$  est un point fixe de  $f$  si  $f(x) = x$ .

1. Montrer que  $f$  admet au moins un point fixe. [On pourra considérer la fonction  $g$  définie sur  $[a, b]$  par  $g(x) = f(x) - x$ .]

—————**corrigé**—————

On remarque que  $g(a) = f(a) - a \geq 0$  (car  $f(a) \geq a$ ) et  $g(b) = f(b) - b \leq 0$  (car  $f(b) \leq b$ ). Comme  $g$  est continue sur  $[a, b]$  et  $g(a) \geq 0 \geq g(b)$ , le théorème des valeurs intermédiaires donne l'existence de  $c \in [a, b]$  t.q.  $g(c) = 0$ .

On suppose dans la suite que  $f \circ f = f$ . On pose  $\text{Im}(f) = \{f(x), x \in [a, b]\}$ .

2. Montrer que tout élément de  $\text{Im}(f)$  est un point fixe de  $f$ .

—————**corrigé**—————

Soit  $y \in \text{Im}(f)$ . Il existe  $x \in [a, b]$  t.q.  $y = f(x)$ . On a donc  $f(y) = f(f(x)) = f \circ f(x) = f(x) = y$ . Ce qui prouve que  $y$  est un point fixe de  $f$ .

3. On suppose, dans cette question, que  $f$  admet un seul point fixe. Montrer que  $f$  est constante.

—————**corrigé**—————

Puisque  $f$  admet un seul point fixe, la question précédente donne que  $\text{Im}(f)$  ne peut contenir que un seul point. Ce qui prouve que  $f$  est constante.

On suppose dans la suite que  $f$  admet au moins 2 points fixes (distincts) et que  $f$  est dérivable (c'est-à-dire dérivable en tout point de  $]a, b[$ ).

4. Montrer qu'il existe  $m, M \in [a, b]$  t.q.  $\text{Im}(f) = [m, M]$  et  $m < M$ .

—————**corrigé**—————

L'image d'un intervalle fermé borné par une fonction continue est encore un intervalle fermé borné. Il existe donc  $m, M \in \mathbb{R}$  t.q.  $m \leq M$  et  $\text{Im}(f) = [m, M]$ . Comme  $f$  admet au moins 2 points fixes,  $\text{Im}(f)$  contient au moins deux points. Donc,  $m < M$ .

5. Montrer que  $f'(x) = 1$  pour tout  $x \in ]m, M[$  (ici et dans la suite,  $m$  et  $M$  sont donnés par la question précédente).

—————**corrigé**—————

Pour tout  $x \in ]m, M[$ , on a  $f(x) = x$  (car  $]m, M[ \subset \text{Im}(f)$ ). On a donc, pour tout  $x \in ]m, M[$ ,  $f'(x) = 1$ .

6. On suppose, dans cette question, que  $m > a$ .

(a) Montrer que  $f'(m) = 1$ .

—————**corrigé**—————

On a  $a < m < M \leq b$ . La fonction  $f$  est donc dérivable en  $m$ . Pour  $0 < h < M - m$ , on a  $f(m) = m$  et  $f(m+h) = m+h$  (car  $m$  et  $(m+h)$  sont dans  $\text{Im}(f)$  et sont donc des points fixes de  $f$ ). On a donc :

$$\frac{f(m+h) - f(m)}{h} = 1.$$

On en déduit que :

$$f'(m) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(m+h) - f(m)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0, h > 0} \frac{f(m+h) - f(m)}{h} = 1.$$

(b) Montrer qu'il existe  $x \in ]a, m[$  t.q.  $f(x) < m$ .

**corrigé**

Comme  $f$  est dérivable en  $m$  et que  $f'(m) = 1$ , on a  $f(x) = f(m) + (x - m) + (x - m)\varepsilon(x)$  avec  $\lim_{x \rightarrow m} \varepsilon(x) = 0$ . Il existe donc  $\eta > 0$  t.q. :

$$|x - m| \leq \eta \Rightarrow |\varepsilon(x)| < 1.$$

Pour  $x \in [a, m[$  avec  $m - x < \eta$  on a donc :

$$f(x) < f(m) + (x - m) + |x - m| = f(m).$$

(c) En déduire que l'hypothèse  $m > a$  est en contradiction avec la définition de  $m$ .

**corrigé**

Si  $m > a$ , on vient de montrer l'existence de  $x \in [a, b]$  t.q.  $f(x) < f(m)$ , ce qui impossible car  $f(x) \in \text{Im}(f) = [m, M]$  et  $f(m) = m$  (car  $m \in \text{Im}(f)$  et donc  $m$  est un point fixe de  $f$ ).

7. Montrer que  $m = a$ ,  $M = b$  et  $f(x) = x$  pour tout  $x \in [a, b]$ .

**corrigé**

La question précédente donne  $m \leq a$  et donc finalement  $m = a$  (car  $[m, M] = \text{Im}(f) \subset [a, b]$ ). De manière analogue, on peut montrer que  $M = b$ . On a donc  $\text{Im}(f) = [a, b]$  et donc  $f(x) = x$  pour tout  $x \in [a, b]$ .

8. Montrer que le résultat de la question précédente peut être faux si on retire l'hypothèse " $f$  dérivable". [On cherche donc  $f$  continue de  $[a, b]$  dans  $[a, b]$  t.q.  $f \circ f = f$ ,  $f$  admet au moins deux points fixes distincts et il existe  $x \in [a, b]$  t.q.  $f(x) \neq x$ .]

**corrigé**

On peut prendre, par exemple,  $a = 0$ ,  $b = 3$ ,  $f(x) = 1$  si  $0 \leq x < 1$ ,  $f(x) = x$  si  $1 \leq x \leq 2$ ,  $f(x) = 2$  si  $2 < x \leq 3$ .

### Exercice 3.21 (Calcul de limites)

Calculer  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(x)}{x}$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{2x}}{x}$  et  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} \frac{x}{(\ln(1+x))^2}$ .

**corrigé**

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(x)}{x} = 0$  car  $|\frac{\sin(x)}{x}| \leq \frac{1}{x}$  pour tout  $x > 0$ .

Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $f(x) = e^x - e^{2x}$ . La fonction  $f$  est dérivable en 0 et  $f(0) = 0$ . On en déduit  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{2x}}{x} = f'(0) = -1$ .

Pour  $x \in ]-1, \infty[$ , on pose  $g(x) = \ln(1+x)^2$ . La fonction  $g$  est dérivable en 0 et  $g(0) = 0$ . On en déduit  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)^2}{x} = g'(0) = 0$ . Comme  $g(x) > 0$  quand  $x > 0$ , on a donc  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} \frac{x}{(\ln(1+x))^2} = +\infty$ .

### Exercice 3.22 (Fonction sous linéaire)

Soit  $f$  une fonction dérivable de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et t.q.  $f(0) = 0$ . On définit la fonction  $g$  de  $\mathbb{R}_+$  dans  $\mathbb{R}$  (avec  $\mathbb{R}_+ = [0, \infty[$ ) par :

$$g(x) = \frac{f(x)}{x} \text{ si } x > 0,$$

$$g(0) = f'(0).$$

1. Montrer que  $g$  est continue en tout point de  $\mathbb{R}_+$ .

—————  
**corrigé**  
—————

La fonction  $g$  est continue sur  $]0, \infty[$  car c'est le quotient de deux fonctions continues et que son dénominateur ne s'annule par (sur  $]0, \infty[$ ). On peut aussi noter que  $g$  est dérivable sur  $]0, \infty[$

Comme  $f$  est dérivable en 0 et que  $f(0) = 0$ , On a  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0)$ . La fonction  $g$  est donc continue en 0 (et donc continue sur tout  $\mathbb{R}_+ = [0, \infty[$ ).

On suppose maintenant qu'il existe  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , t.q., pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $f(x) \leq \alpha x + \beta$ .

2. Montrer que  $g$  est majorée (c'est-à-dire que l'ensemble  $\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\}$  est majoré)

—————  
**corrigé**  
—————

La fonction  $g$  est continue sur  $[0, 1]$ . La restriction de  $g$  à  $[0, 1]$  est donc majorée (car  $[0, 1]$  est fermé et borné). Il existe donc  $M$  t.q., pour tout  $x \in [0, 1]$ ,  $g(x) \leq M$ .

Puis, pour  $x > 1$ , on remarque que  $g(x) \leq \alpha + \frac{\beta}{x} \leq \alpha + |\beta|$ . On a donc finalement, pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $g(x) \leq C = \max\{M, \alpha + |\beta|\}$ , ce qui prouve que  $g$  est majorée.

3. On suppose, dans cette question, que  $\alpha < f'(0)$ . Montrer qu'il existe  $a \in \mathbb{R}_+$  t.q.  $g(a) = \sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\}$ . Montrer que  $g(a) = f'(a)$ .

—————  
**corrigé**  
—————

On choisit  $\varepsilon = f'(0) - \alpha > 0$ , et on pose  $A = \frac{|\beta|}{\varepsilon} \geq 0$ . Pour  $x \geq A$ , on a donc  $g(x) \leq \alpha + \frac{\beta}{x} \leq \alpha + \varepsilon = f'(0)$ .

La fonction  $g$  est continue sur l'intervalle fermé borné  $[0, A]$ , il existe donc  $a \in [0, A] \subset \mathbb{R}_+$  t.q.  $g(a) = \sup\{g(x), x \in [0, A]\}$ . Mais, comme  $\sup\{g(x), x \in [0, A]\} \geq g(0) = f'(0)$  et que pour  $x > A$  on a  $g(x) \leq f'(0)$ , on a donc  $g(a) = \sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\}$ .

Si  $a = 0$ , on a bien  $g(a) = f'(a)$ . Si  $a > 0$ , le fait que  $g(a) = \sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\}$  et que  $g$  soit dérivable en  $a$  permet de montrer que  $g'(a) = 0$  (comme dans la démonstration du théorème des accroissements finis). Comme  $xg(x) = f(x)$  pour tout  $x > 0$ , on a  $g(x) + xg'(x) = f'(x)$  pour tout  $x > 0$  et donc  $g(a) = f'(a)$ .

4. On suppose, dans cette question, que  $f(x) = x - \frac{x^3}{1+x^2}$ .

(a) La fonction  $f$  vérifie-t-elle les hypothèses données au début de l'exercice ?

—————  
**corrigé**  
—————

Oui...  $f$  est dérivable et  $f(0) = 0$ .

(b) Donner des valeurs de  $\alpha$  et  $\beta$  pour lesquelles, pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $f(x) \leq \alpha x + \beta$ .

—————**corrigé**—————

Comme  $\frac{x^3}{1+x^2} \geq 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ , les valeurs suivantes conviennent :  $\alpha = 1, \beta = 0$ .

(c) Montrer qu'il existe un unique  $a \in \mathbb{R}_+$  t.q.  $g(a) = \sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\}$  et donner cette valeur de  $a$ .

—————**corrigé**—————

On a  $g(x) < 1$ , pour tout  $x \in ]0, \infty[$ , et  $g(0) = 1$ . Il existe donc un unique  $a \in \mathbb{R}_+$  t.q.  $g(a) = \sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\} (= 1)$  et  $a = 0$ .

5. On suppose, dans cette question, que  $\alpha = f'(0)$ . Montrer qu'il existe  $a \in \mathbb{R}_+$  t.q.  $g(a) = \sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\}$  et que  $g(a) = f'(a)$ .

—————**corrigé**—————

On pose  $\gamma = \sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\}$ . On a  $\gamma \geq g(0) = f'(0)$  et donc distingue deux cas ;

Premier cas :  $\gamma = f'(0)$ . Dans ce cas,  $a = 0$  convient car  $g(0) = f'(0) = \gamma$ .

Deuxième cas :  $\gamma > f'(0)$ .

On choisit alors  $\varepsilon = \frac{\gamma - f'(0)}{2} > 0$ , et on pose  $A = \frac{|\beta|}{\varepsilon} \geq 0$ . Pour  $x \geq A$ , on a donc  $g(x) \leq \alpha + \frac{\beta}{x} \leq \alpha + \varepsilon = f'(0) + \varepsilon = \frac{\gamma + f'(0)}{2} < \gamma$ . On a donc  $\sup\{g(x), x \in [A, \infty[ \} < \gamma$  et donc :

$$\gamma = \sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\} = \sup\{g(x), x \in [0, A]\}.$$

La fonction  $g$  est continue sur l'intervalle fermé borné  $[0, A]$ , il existe donc  $a \in [0, A] \subset \mathbb{R}_+$  t.q.  $g(a) = \sup\{g(x), x \in [0, A]\}$ . Ce qui donne bien  $g(a) = \gamma$ .

La démonstration de  $g(a) = f'(a)$  est identique à celle de la question 3.

6. Montrer, en donnant un exemple (c'est-à-dire en choisissant convenable  $f$ ) qu'il peut ne pas exister  $a \in \mathbb{R}_+$  t.q.  $g(a) = \sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\}$  (pour cet exemple, on aura donc nécessairement  $\alpha > f'(0)$ ).

—————**corrigé**—————

On peut prendre, par exemple,  $f$  définie par  $f(x) = x + \frac{x^3}{1+x^2}$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . On a bien  $f$  dérivable,  $f(0) = 0$ . Comme  $\frac{x^2}{1+x^2} < 1$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , les valeurs  $\alpha = 2$  et  $\beta = 0$  conviennent et on a  $g(x) < 2$ , pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ . Enfin, on a  $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 2$ . on en déduit que  $\sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\} = 2$  et qu'il n'existe pas d'élément  $a$  de  $\mathbb{R}_+$  t.q.  $g(a) = \sup\{g(x), x \in \mathbb{R}_+\}$ .

### Exercice 3.23 (TAF...)

Soit  $f$  une application continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est dérivable pour tout  $x \neq 0$  et que  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = +\infty$ .

1. Montrer que  $f$  n'est pas dérivable en 0.

—————**corrigé**—————

On va montrer que  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \infty$  (ce qui prouve que  $f$  n'est pas dérivable en 0), c'est-à-dire que pour tout  $M \in \mathbb{R}$  il existe  $\alpha > 0$  t.q. :

$$h \neq 0, |h| \leq \alpha \Rightarrow \frac{f(h) - f(0)}{h} \geq M. \quad (3.8)$$

Soit donc  $M \in \mathbb{R}$ . Comme  $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = +\infty$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q. :

$$x \neq 0, |x| \leq \alpha \Rightarrow f'(x) \geq M. \quad (3.9)$$

Soit maintenant  $h \neq 0$  avec  $|h| \leq \alpha$ , le théorème des accroissements finis (théorème 3.2) donne l'existence de  $c \in ]\min(0, h), \max(0, h)[$  t.q. :

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = f'(c).$$

Comme  $|h| \leq \alpha$ , on a  $c \in ]-\alpha, \alpha[$  et, comme  $c \neq 0$ , (3.9) donne  $f'(c) \geq M$ , on a donc  $\frac{f(h) - f(0)}{h} \geq M$ .

On a bien ainsi montré que pour tout  $M \in \mathbb{R}$ , il existe  $\alpha > 0$  vérifiant (3.8). Ceci montre que  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = +\infty$  et donc que  $f$  n'est pas dérivable en 0.

2. On suppose maintenant que  $f$  est bijective de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , strictement croissante et que  $f(0) = 0$ . On note  $g$  la fonction réciproque de  $f$  [l'existence de la fonction  $g$  a été vue en cours]. Montrer que  $g$  est dérivable en 0 et que  $g'(0) = 0$ .

————— **corrigé** —————

On reprend ici essentiellement la démonstration faite en cours pour montrer la dérivabilité d'une fonction réciproque.

On veut montrer que  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(0)}{h} = 0$ , c'est-à-dire que pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe  $\beta > 0$  t.q. :

$$h \neq 0, |h| \leq \beta \Rightarrow \left| \frac{g(h) - g(0)}{h} \right| \leq \varepsilon. \quad (3.10)$$

Soit  $h \neq 0$ . Comme  $f \circ g(h) = h$ ,  $f(0) = 0$  et  $g(0) = 0$  (noter que  $g(h) \neq 0$  car  $h \neq 0$  et  $g$  injective), on a :

$$\frac{g(h) - g(0)}{h} = \frac{g(h)}{f(g(h)) - f(0)}.$$

Le théorème des accroissements finis donne l'existence de  $d \in ]\min(0, g(h)), \max(0, g(h))[[$  t.q. :

$$f(g(h)) - f(0) = g(h)f'(d)$$

(bien sûr, le point  $d$  dépend de  $h$ ). On a donc :

$$\frac{g(h) - g(0)}{h} = \frac{1}{f'(d)}. \quad (3.11)$$

Cette égalité, avec (3.9) et la continuité de  $g$  (qui a été vue en cours) nous suggère le choix de  $\beta$ , à partir de  $\varepsilon$ , pour avoir (3.10). En effet, soit  $\varepsilon > 0$ . On choisit  $M = 1/\varepsilon$ . Il existe alors  $\alpha > 0$  vérifiant (3.9). Mais, comme  $g$  est continue en 0, il existe  $\beta > 0$  t.q. :

$$y \in \mathbb{R}, |y| \leq \beta \Rightarrow |g(y)| \leq \alpha.$$

Si  $|h| \leq \beta$ , on a donc  $|g(h)| \leq \alpha$ . Ce qui donne  $d \in ]-\alpha, \alpha[[$  et donc (comme on a aussi  $d \neq 0$ ),  $f'(d) \geq M = 1/\varepsilon > 0$ . Finalement, on obtient avec (3.11),

$$\left| \frac{g(h) - g(0)}{h} \right| = \frac{g(h) - g(0)}{h} \leq \varepsilon.$$

Pour tout  $\varepsilon > 0$  on a donc trouvé  $\beta$  vérifiant (3.10). Ce qui prouve que  $g$  est dérivable en 0 et  $g'(0) = 0$ .

### Exercice 3.24

Etudier l'existence et la valeur d'une limite éventuelle en  $x_0$  pour les fonctions suivantes.

- $f_1(x) = \frac{x+|x|}{x}$ , pour  $x \neq 0$ , et  $x_0 = 0$ ,
- $f_2(x) = (\frac{\pi}{2} - x) \tan x$ , pour  $x \in ]0, \frac{\pi}{2}[ \cup ]\frac{\pi}{2}, \pi[$ , et  $x_0 = \frac{\pi}{2}$ .

---

**corrigé**

---

La limite à gauche de  $f_1$  en 0 est 0 et la limite à droite est 2. Donc,  $f$  n'a pas de limite en 0 pour  $x \in ]0, \frac{\pi}{2}[ \cup ]\frac{\pi}{2}, \pi[$ , on a :

$$f_2(x) = \frac{\frac{\pi}{2} - x}{\cos(x) - \cos(\frac{\pi}{2})} \sin(x).$$

Comme  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x) - \cos(\frac{\pi}{2})}{x - \frac{\pi}{2}} = -\sin(\frac{\pi}{2}) = -1$  et  $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$ , on en déduit :

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f_2(x) = 1.$$

---

### Exercice 3.25

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes. Monter qu'elles sont dérivables et donner une expression de leur dérivée.

- $f_1(x) = x^{\frac{1}{x}}$ ,
- $f_2(x) = \ln\left(\frac{1+\sin(x)}{1-\sin(x)}\right)$ .

---

**corrigé**

---

La fonction  $f_1$  est définie sur  $\mathbb{R}_+^*$  et est dérivable comme composée de fonctions dérivables. Comme  $f_1(x) = e^{\ln(x)/x}$ , on a, pour tout  $x > 0$  :

$$f_1'(x) = \frac{1}{x^2}(1 - \ln(x))x^{\frac{1}{x}}.$$

La fonction  $f_2$  est définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ . Elle est dérivable comme composée de fonctions dérivables et on trouve, pour tout  $x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ ,  $f_2'(x) = \frac{2}{\cos(x)}$ .

---

### Exercice 3.26

En appliquant le théorème des accroissements finis, montrer que  $1 < \frac{e^x - 1}{x} < e^x$ , pour tout  $x > 0$ .

---

**corrigé**

---

Soit  $x > 0$ . Comme la fonction  $y \mapsto e^y$  est continue sur  $[0, x]$  et dérivable sur  $]0, x[$ , le théorème des accroissements finis donne l'existence de  $c \in ]0, x[$  t.q.  $e^x - e^0 = xe^c$ . On a donc :

$$\frac{e^x - 1}{x} = e^c.$$

Comme la fonction  $y \mapsto e^y$  est strictement croissante, on a  $1 = e^0 < e^c < e^x$  (car  $0 < c < x$ ) et donc :

$$1 < \frac{e^x - 1}{x} < e^x.$$

---

### Exercice 3.27 (Fonction convexe)

Soit  $\varphi$  une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $\varphi$  est dérivable (c'est-à-dire dérivable en tout point de  $\mathbb{R}$ ) et que  $\varphi'$  est une fonction croissante.

1. Soit  $x < z < y$ . Montrer que  $\frac{\varphi(z) - \varphi(x)}{z - x} \leq \frac{\varphi(y) - \varphi(z)}{y - z}$ .

—————  
corrigé

La fonction  $\varphi$  est continue sur  $[x, z]$  et dérivable sur  $]x, z[$ , le théorème des accroissements finis (théorème 3.2) donne l'existence de  $c \in ]x, z[$  t.q.

$$\frac{\varphi(z) - \varphi(x)}{z - x} = \varphi'(c).$$

De même, le théorème des accroissements finis donne l'existence de  $d \in ]z, y[$  t.q.

$$\frac{\varphi(y) - \varphi(z)}{y - z} = \varphi'(d).$$

Comme  $\varphi'$  est croissante et  $c < z < d$ , on a  $\varphi'(c) \leq \varphi'(d)$  et donc  $\frac{\varphi(z) - \varphi(x)}{z - x} \leq \frac{\varphi(y) - \varphi(z)}{y - z}$ .

2. Montrer que  $\varphi$  est convexe, c'est-à-dire que

$$\varphi(tx + (1 - t)y) \leq t\varphi(x) + (1 - t)\varphi(y) \text{ pour tout } x, y \in \mathbb{R} \text{ et tout } t \in [0, 1]. \quad (3.12)$$

[Pour  $x < y$  et  $t \in ]0, 1[$ , on pourra utiliser la question 1 avec  $z = tx + (1 - t)y$ .]

—————  
corrigé

L'inégalité (3.12) est immédiate pour  $x = y$ . Elle est aussi immédiate pour  $x \neq y$  et  $t = 0$  ou  $t = 1$ . Il reste à étudier le cas  $x \neq y$  et  $t \in ]0, 1[$ . On peut aussi supposer  $x < y$  (quitte à changer  $x$  en  $y$ ,  $y$  en  $x$  et  $t$  en  $1 - t$ ).

On applique alors la question 1 avec  $z = tx + (1 - t)y$ , de sorte que  $z - x = (1 - t)(y - x)$  et  $y - z = t(y - x)$ . On obtient

$$\frac{\varphi(z) - \varphi(x)}{(1 - t)(y - x)} = \frac{\varphi(z) - \varphi(x)}{z - x} \leq \frac{\varphi(y) - \varphi(z)}{y - z} = \frac{\varphi(y) - \varphi(z)}{t(y - x)}.$$

Ce qui donne, comme  $y - x > 0$ ,  $t > 0$  et  $(1 - t) > 0$ ,

$$t(\varphi(z) - \varphi(x)) \leq (1 - t)(\varphi(y) - \varphi(z)).$$

On en déduit bien l'inégalité (3.12).

3. On définit ici la fonction  $\psi$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  par  $\psi(x) = |x|$  si  $x \in \mathbb{R}$ . Montrer que  $\psi$  est convexe. La fonction  $\psi$  est-elle dérivable en tout point de  $\mathbb{R}$  ?

—————  
corrigé

Soit  $x, y \in \mathbb{R}$  et  $t \in [0, 1]$ , on a

$$\psi(tx + (1 - t)y) = |tx + (1 - t)y| \leq t|x| + (1 - t)|y| = t\psi(x) + (1 - t)\psi(y).$$

Ce qui montre bien que  $\psi$  est convexe. La fonction  $\psi$  n'est pas dérivable en 0.

### Exercice 3.28 (Recherche d'un maximum et convexité)

Soit  $\varphi$  une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  vérifiant

$$\varphi\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{1}{2}\varphi(x) + \frac{1}{2}\varphi(y) \text{ pour tout } x, y \in \mathbb{R}. \quad (3.13)$$

(Noter que  $\varphi$  n'est pas nécessairement dérivable.)

1. Dans cette question, on suppose qu'il existe  $a \in \mathbb{R}$  t.q.  $\varphi(a) = \max\{\varphi(x), x \in \mathbb{R}\}$ . (On a donc  $\varphi(a) \geq \varphi(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .)

(a) Soit  $\theta \neq 0$ . Montrer que

$$\varphi(a) \leq \frac{1}{2}\varphi(a+\theta) + \frac{1}{2}\varphi(a-\theta), \quad \varphi(a+\theta) \leq \varphi(a) \text{ et } \varphi(a-\theta) \leq \varphi(a).$$

Montrer que  $\varphi(a+\theta) = \varphi(a-\theta) = \varphi(a)$ .

—————  
**corrigé**

On remarque que  $a = \frac{1}{2}(a+\theta) + \frac{1}{2}(a-\theta)$ . L'inégalité (3.13) donne donc  $\varphi(a) \leq \frac{1}{2}\varphi(a+\theta) + \frac{1}{2}\varphi(a-\theta)$ . Puis, comme  $\varphi(a) = \max\{\varphi(x), x \in \mathbb{R}\}$ , on a, bien sûr,  $\varphi(a+\theta) \leq \varphi(a)$  et  $\varphi(a-\theta) \leq \varphi(a)$ .

En utilisant ces trois inégalités, on remarque que

$$\varphi(a) \leq \frac{1}{2}\varphi(a+\theta) + \frac{1}{2}\varphi(a-\theta) \leq \frac{1}{2}\varphi(a+\theta) + \frac{1}{2}\varphi(a).$$

On a donc  $\frac{1}{2}\varphi(a) \leq \frac{1}{2}\varphi(a+\theta) \leq \frac{1}{2}\varphi(a)$ . Ce qui donne bien  $\varphi(a+\theta) = \varphi(a)$ . De même on a  $\varphi(a-\theta) = \varphi(a)$  (par exemple en changeant  $\theta$  en  $-\theta$ ).

(b) Montrer que  $\varphi(x) = \varphi(a)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  (la fonction  $\varphi$  est donc constante).

—————  
**corrigé**

Soit  $x \neq a$ . On pose  $\theta = x - a$ . La question précédente donne  $\varphi(x) = \varphi(a+\theta) = \varphi(a)$ . La fonction  $\varphi$  est donc constante.

2. On s'intéresse maintenant à une situation un peu plus compliquée. Soit  $g$  une fonction dérivable de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On pose  $f = \varphi + g$  et on suppose qu'il existe  $a \in \mathbb{R}$  t.q.  $f(a) = \max\{f(x), x \in \mathbb{R}\}$ .

(a) Soit  $h \neq 0$ .

i. Montrer que  $\varphi(a+h) - \varphi(a) \leq g(a) - g(a+h)$ .

—————  
**corrigé**

On remarque que  $\varphi(a+h) + g(a+h) = f(a+h) \leq f(a) = \varphi(a) + g(a)$ . on a donc  $\varphi(a+h) - \varphi(a) \leq g(a) - g(a+h)$ .

ii. Montrer que  $\varphi(a+h) - \varphi(a) \geq g(a-h) - g(a)$ .

—————  
**corrigé**

La question précédente, changeant  $h$  en  $-h$ , donne  $\varphi(a-h) - \varphi(a) \leq g(a) - g(a-h)$ . Ce qui peut s'écrire

$$\varphi(a) - \varphi(a-h) \geq g(a-h) - g(a).$$

Or l'inégalité (3.13) donne

$$\frac{1}{2}\varphi(a) + \frac{1}{2}\varphi(a) \leq \frac{1}{2}\varphi(a+h) + \frac{1}{2}\varphi(a-h).$$

On a donc  $\varphi(a+h) - \varphi(a) \geq \varphi(a) - \varphi(a-h)$  et, finalement, on obtient bien

$$\varphi(a+h) - \varphi(a) \geq \varphi(a) - \varphi(a-h) \geq g(a-h) - g(a).$$

- 
- (b) Montrer que  $\varphi$  est dérivable en  $a$  et que  $\varphi'(a) = -g'(a)$ . [On pourra commencer par calculer, en fonction de  $g'(a)$ , la limite de  $(g(a-h) - g(a))/h$  quand  $h$  tend vers 0.]

**corrigé**

Comme  $\frac{g(a-h)-g(a)}{h} = -\frac{g(a-h)-g(a)}{-h}$ , on a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a-h) - g(a)}{h} = -g'(a).$$

La question précédente donne, pour tout  $h > 0$ ,

$$\frac{g(a-h) - g(a)}{h} \leq \frac{\varphi(a+h) - \varphi(a)}{h} \leq -\frac{g(a+h) - g(a)}{h}$$

et, pour tout  $h < 0$ ,

$$\frac{g(a-h) - g(a)}{h} \geq \frac{\varphi(a+h) - \varphi(a)}{h} \geq -\frac{g(a+h) - g(a)}{h}$$

Comme  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a-h)-g(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{g(a+h)-g(a)}{h} = -g'(a)$ , on en déduit que  $\varphi$  est dérivable en  $a$  et que  $\varphi'(a) = -g'(a)$ .

---

N.B. On a donc montré que  $\varphi$  est nécessairement dérivable au point où  $f$  atteint son maximum.

3. (Exemple) On définit ici  $\varphi$  et  $g$  par  $\varphi(x) = |x|$  et  $g(x) = -x^2$  pour  $x \in \mathbb{R}$ . On pose  $f = \varphi + g$ . Donner les deux points  $a, b \in \mathbb{R}$  t.q.  $f(a) = f(b) = \max\{f(x), x \in \mathbb{R}\}$ . [On pourra commencer par dessiner la courbe de  $f$ .]

**corrigé**

La fonction  $f$  est paire. On l'étudie sur  $\mathbb{R}_+$ . On a  $f(x) = x(1-x)$  pour  $x \geq 0$ . La fonction  $f$  est donc strictement croissante sur  $[0, \frac{1}{2}]$  puis strictement décroissante sur  $[\frac{1}{2}, +\infty[$ . On en déduit que les points  $a$  et  $b$  sont les points  $\frac{1}{2}$  et  $-\frac{1}{2}$ .

---

## Chapitre 4

# Formules de Taylor et développements limités

### 4.1 Taylor-Lagrange

Si  $a, b \in \mathbb{R}$ , on note  $\text{Int}(a, b)$  l'intervalle ouvert dont les bornes sont  $a$  et  $b$ , c'est-à-dire  $\text{Int}(a, b) = ]a, b[$  si  $a \leq b$  et  $\text{Int}(a, b) = ]b, a[$  si  $b < a$ .

**Théorème 4.1 (Taylor-Lagrange)** Soit  $-\infty \leq \alpha < \beta \leq \infty$  et  $f$  une application de  $] \alpha, \beta [$  dans  $\mathbb{R}$ . Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On suppose que  $f$  de classe  $C^n$  et que  $f^{(n)}$  dérivable. Soit  $a, b \in ] \alpha, \beta [$ . Alors, il existe  $c \in \text{Int}(a, b)$  t.q.

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c). \quad (4.1)$$

On rappelle que, par convention,  $x^0 = 1$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et  $0! = 1$ .

DÉMONSTRATION : La démonstration de ce théorème consiste à appliquer le théorème des accroissements finis (ou, plus simplement, le théorème 3.1) à une fonction convenablement choisie.

On pose

$$d = \frac{(n+1)!}{(b-a)^{n+1}} \left( f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right),$$

de sorte que  $f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} d$ . Il s'agit maintenant de démontrer qu'il existe  $c \in \text{Int}(a, b)$  t.q.  $d = f^{(n+1)}(c)$ .

Pour  $x \in ] \alpha, \beta [$ , on pose

$$\varphi(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-x)^k}{k!} f^{(k)}(x) + \frac{(b-x)^{n+1}}{(n+1)!} d.$$

On remarque que  $\varphi(a) = f(b)$  (grâce au choix de  $d$ ) et  $\varphi(b) = f(b)$ . La fonction  $\varphi$  est dérivable sur  $]a, b[$  et on a, pour tout  $x \in ]a, b[$ ,

$$\begin{aligned}\varphi'(x) &= -\sum_{k=1}^n \frac{(b-x)^{k-1}}{(k-1)!} f^{(k)}(x) + \sum_{k=0}^n \frac{(b-x)^k}{k!} f^{(k+1)}(x) - \frac{(b-x)^n}{n!} d \\ &= -\sum_{k=0}^{n-1} \frac{(b-x)^k}{k!} f^{(k+1)}(x) + \sum_{k=0}^n \frac{(b-x)^k}{k!} f^{(k+1)}(x) - \frac{(b-x)^n}{n!} d = \frac{(b-x)^n}{n!} (f^{(n+1)}(x) - d).\end{aligned}$$

On utilise maintenant le théorème 3.1 (théorème de Rolle). La fonction  $\varphi$  est continue sur l'intervalle fermé dont les bornes sont  $a$  et  $b$  et dérivable sur l'intervalle ouvert dont les bornes sont  $a$  et  $b$  (c'est-à-dire sur l'intervalle  $\text{Int}(a, b)$ ). Comme  $\varphi(a) = \varphi(b)$ , Il existe donc  $c \in \text{Int}(a, b)$  t.q.  $\varphi'(c) = 0$ , ce qui donne (comme  $b - c \neq 0$ )

$$d = f^{(n+1)}(c).$$

On en déduit bien  $f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c)$ . ■

## 4.2 Taylor-Young

Notation : Lorsque l'on dit qu'une propriété est vraie "au voisinage" de  $a$  ou encore "pour  $x$  suffisamment proche de  $a$ ", cela signifie qu'il existe  $\gamma > 0$  t.q. pour tout  $x \in [a - \gamma, a + \gamma]$  la propriété est vraie.

**Théorème 4.2 (Taylor-Young)** Soit  $-\infty \leq \alpha < \beta \leq \infty$  et  $f$  de  $]a, b[$  dans  $\mathbb{R}$ . Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On suppose que  $f$  de classe  $C^n$ . Soit  $a \in ]a, b[$ . Alors, on a :

1. Pour tout  $x \in ]a, b[$ ,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + (x-a)^n h(x), \quad \text{avec } \lim_{x \rightarrow a} h(x) = 0 \quad (4.2)$$

(et donc  $h$  continue en  $a$ , si on ajoute  $h(a) = 0$ ). On dit que  $h$  est un "petit o" de  $(x-a)$  et on note  $h(x) = o(x-a)$ .

2. Pour tout  $x \in ]a, b[$ ,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + (x-a)^n H(x),$$

avec  $H$  bornée au voisinage de  $a$  (c'est-à-dire qu'il existe  $\gamma > 0$  et  $M \in \mathbb{R}$  t.q.  $|x-a| \leq \gamma \Rightarrow |H(x)| \leq M$ ). On dit que  $H$  est un "grand O" de  $(x-a)$  et on note  $H(x) = O(x-a)$ .

DÉMONSTRATION : On va démontrer le premier item du théorème 4.2 en appliquant le théorème 4.1 à l'ordre  $n-1$ . Soit  $x \in ]a, b[$ ,  $x \neq a$ . D'après le théorème 4.1 il existe  $c_x \in \text{Int}(a, x)$  t.q.

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(c_x) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + (x-a)^n h(x),$$

avec  $h(x) = \frac{1}{n!} (f^{(n+1)}(c_x) - f^{(n)}(a))$ .

Soit maintenant  $\varepsilon > 0$ . Comme  $f^{(n)}$  est continue en  $a$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q.

$$|y - a| \leq \alpha \Rightarrow |f^{(n)}(y) - f^{(n)}(a)| \leq \varepsilon.$$

Comme  $c_x \in \text{Int}(a, x)$ , on a donc aussi

$$|x - a| \leq \alpha \Rightarrow |f^{(n)}(c_x) - f^{(n)}(a)| \leq \varepsilon \Rightarrow |h(x)| \leq \varepsilon.$$

Ce qui prouve bien que  $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = 0$ .

Pour montrer le deuxième item, on remarque simplement que pour  $x \in ]\alpha, \beta[$ ,  $x \neq a$ ,

$$H(x) = h(x) + \frac{1}{n!} f^{(n)}(a).$$

On a donc  $\lim_{x \rightarrow a} H(x) = \frac{1}{n!} f^{(n)}(a)$ , on en déduit que  $H$  est une fonction bornée au voisinage de  $a$ . ■

#### Remarque 4.1

1. Avec le théorème 4.2 pour  $n = 1$ , on retrouve la définition de la dérivée, c'est-à-dire :

$$f(x) = f(a) + (x - a)f'(a) + (x - a)h(x),$$

avec  $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = 0$ . On remarque alors que l'hypothèse “ $f$  de classe  $C^1$ ” dans le théorème 4.2 n'est pas nécessaire (il suffit de  $f$  dérivable en  $a$ , la continuité de  $f'$  n'est pas nécessaire). Ceci est général, voir l'item suivant.

2. Le théorème 4.2 est encore vraie sous l'hypothèse plus faible (au lieu de  $f$  de classe  $C^n$ ) :  $f$  de classe  $C^{n-1}$  et  $f^{(n-1)}$  dérivable en  $a$ .

Le théorème 4.2 (Taylor-Young) donne uniquement, pour  $a$  fixé, une information locale sur  $f$  (c'est-à-dire une information sur le comportement de  $f$  au voisinage de  $a$ ). Le théorème 4.1 (Taylor-Lagrange) donne une information locale plus précise (car il donne une précision sur la fonction  $h(x)$  de la formule de Taylor-Young), comme nous allons le voir dans l'exemple suivant. Il donne aussi une information globale sur  $f$ , même si  $a$  est fixé (voir aussi l'exemple suivant). Une troisième formule de Taylor, la formule de Taylor avec reste intégral, est encore plus précise. Elle nécessite la construction de l'intégrale, nous la verrons donc au chapitre 5.

**Exemple 4.1 (Exemples d'application des formules de Taylor)** Nous commençons par une application de la formule de Taylor-Young puis de celle de Taylor-Lagrange.

1. (Application de Taylor-Young,  $n = 1$ ) Soit  $0 < \alpha < 1$ . La formule de Taylor-Young permet de calculer la limite de  $f(x) = (x + 3)^\alpha - (x + 1)^\alpha$  quand  $x \rightarrow \infty$ . (Dans le cas particulier  $\alpha = 1/2$ , une autre démonstration possible, classique, consiste à utiliser l'astuce de la “quantité conjuguée”.)
2. (Application de Taylor-Lagrange,  $n = 2$ ) Soit  $-\infty \leq \alpha < \beta \leq +\infty$ ,  $f$  une application de  $] \alpha, \beta [$  dans  $\mathbb{R}$ , de classe  $C^2$ , et  $a \in ] \alpha, \beta [$ . On cherche un point  $a \in ] \alpha, \beta [$  t.q.  $f(a) = \min_{x \in ] \alpha, \beta [} f(x)$ . Le théorème 4.1 permet de montrer les deux résultats suivants (voir la proposition 4.6) :
  - (a) (Condition Nécessaire)  $f(a) = \min_{x \in ] \alpha, \beta [} f(x) \Rightarrow (f'(a) = 0 \text{ et } f''(a) \geq 0)$ .

(b) (Condition Suffisante) ( $f'(a) = 0$  et, pour tout  $x \in ]\alpha, \beta[$ ,  $f''(x) \geq 0$ )  $\Rightarrow f(a) = \min_{x \in ]\alpha, \beta[} f(x)$ .

**Proposition 4.1 (Condition suffisante de dérivabilité en un point)** Soit  $-\infty \leq \alpha < \beta \leq \infty$ ,  $f$  une application de  $] \alpha, \beta[$  dans  $\mathbb{R}$ , continue, et  $a \in ] \alpha, \beta[$ .

1. On suppose que  $f$  est dérivable sur  $] \alpha, \beta[ \setminus \{a\}$  et qu'il existe  $a_1 \in \mathbb{R}$  t.q.  $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = a_1$ . Alors  $f$  est dérivable en  $a$  et  $f'(a) = a_1$ .

2. On suppose que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $] \alpha, \beta[ \setminus \{a\}$  et que, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , il existe  $a_n \in \mathbb{R}$  t.q. :

$$\lim_{x \rightarrow a} f^{(n)}(x) = a_n.$$

Alors  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $] \alpha, \beta[$ .

DÉMONSTRATION : Cette proposition est démontrée dans l'exercice (corrigé) 3.11. ■

### 4.3 Fonctions analytiques (hors programme...)

**Remarque 4.2** Soit  $f$  une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , de classe  $C^\infty$ . Soit  $a, x \in \mathbb{R}$  (fixés). D'après le théorème 4.1 (Taylor-lagrange), pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , il existe  $c_n \in \text{Int}(a, x)$  t.q. :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c_n).$$

On suppose (cette hypothèse est forte) qu'il existe  $M \in \mathbb{R}$  t.q.

$$n \in \mathbb{N}, y \in \text{Int}(a, x) \Rightarrow |f^{(n)}(y)| \leq M. \quad (4.3)$$

On rappelle que  $a$  et  $x$  sont fixés. Sous l'hypothèse (4.3), on a alors

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a). \quad (4.4)$$

Pour démontrer (4.4) (avec l'hypothèse (4.3)), il suffit de remarquer que, grâce à (4.1), on a, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right| \leq M \frac{\gamma^{n+1}}{(n+1)!} \text{ avec } \gamma = |x-a|,$$

et d'utiliser le petit lemme 4.1 donné ci-après.

**Lemme 4.1** Soit  $\gamma > 0$ . Alors,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\gamma^n}{n!} = 0$ .

DÉMONSTRATION : . Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $u_n = \frac{\gamma^n}{n!}$ . On remarque que  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\gamma}{n+1}$ . Il existe donc  $n_0 \in \mathbb{N}$  t.q.

$$n \geq n_0 \Rightarrow \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow u_{n+1} \leq \frac{1}{2} u_n.$$

Par récurrence sur  $n$  (à partir de  $n_0$ ), on a donc

$$n \geq n_0 \Rightarrow 0 \leq u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-n_0} u_{n_0}.$$

Ce qui prouve que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ . ■

**Exemple 4.2** Voici quelques exemples de fonctions  $f$  (de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ ) satisfaisant l'hypothèse (4.3) pour tout  $a, x \in \mathbb{R}$  (le nombre  $M$  peut alors dépendre de  $a$  et  $x$ ).

1.  $f$  est polynôme. Dans ce cas, il existe bien  $M$  (dépendant de  $a$  et  $x$ ) vérifiant (4.3). Mais, pour montrer (4.4), il est plus facile de remarquer que  $f^{(k)}(a) = 0$  pour tout  $k > m$ , où  $m$  est le degré du polynôme  $f$ . La formule (4.4) découle alors directement de la formule (4.1) en prenant  $n = m + 1$ .
2.  $f(x) = \sin x$ ,  $f(x) = \cos x$  (prendre  $M = 1$ ),
3.  $f(x) = e^x$  (prendre  $M = \max(e^a, e^x)$ , dans cet exemple  $M$  dépend donc de  $a$  et  $x$ ).

La question suivante est alors naturelle :

**Question :** Soit  $f$  une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , de classe  $C^\infty$ . A t-on :

pour tout  $a \in \mathbb{R}$ , il existe  $\gamma > 0$  t.q.  $|x - a| \leq \gamma \Rightarrow f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a)$  ?

**Réponse :** En général, la réponse est "non". La remarque 4.2 dit que la réponse est "oui" si on a, pour tout  $a, x \in \mathbb{R}$ , l'hypothèse (4.3) (c'est-à-dire que pour tout  $a, x \in \mathbb{R}$  il existe  $M$  vérifiant (4.3)).

**Définition 4.1** Soit  $f$  une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , on dit que  $f$  est analytique si :

1.  $f$  est de classe  $C^\infty$ ,
2. pour tout  $a \in \mathbb{R}$ , il existe  $\gamma > 0$  t.q.  $|x - a| \leq \gamma$  implique  $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a)$ .

L'hypothèse (4.3) donnée dans la remarque 4.2 donne une condition suffisante pour que  $f$  soit analytique.

**Exemple 4.3** On donne ici un exemple de fonction  $C^\infty$ , non analytique.

$$\begin{aligned} f(x) &= 0, \text{ si } x \leq 0, \\ f(x) &= e^{-\frac{1}{x}}, \text{ si } x > 0. \end{aligned}$$

Pour cette fonction, on peut montrer les deux assertions suivantes:

1.  $f$  est de classe  $C^\infty$ ,
2.  $f$  n'est pas analytique.

**Remarque 4.3** [Analytique = développable en série entière] Soit  $f$  une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . Alors,  $f$  est analytique si et seulement si  $f$  est développable en série entière, c'est-à-dire :

Pour tout  $a \in \mathbb{R}$ , il existe  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$  et  $\gamma > 0$  t.q. :

$$|x - a| \leq \gamma \Rightarrow f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n a_n (x - a)^k.$$

**Remarque 4.4 (analyse réelle versus analyse complexe)**  
voici une différence importante entre analyse réelle et complexe.

1. Soit  $f$  une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On a alors :

$$f \text{ dérivable partout} \not\Rightarrow f \text{ de classe } C^\infty \not\Rightarrow f \text{ analytique.}$$

2. Soit  $f$  une application de  $\mathbb{C}$  dans  $\mathbb{C}$ . La définition 3.1 donne une notion naturelle de dérivabilité de  $f$ . On dit que  $f$  est dérivable au point  $x \in \mathbb{C}$  si  $\varphi$  a une limite (dans  $\mathbb{C}$ ) en 0, avec  $\varphi(h) = \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$  pour  $h \in \mathbb{C}$ ,  $h \neq 0$ . Noter aussi que, dans  $\mathbb{C}$ ,  $|z|$  est le module de  $z$  et joue le rôle de la valeur absolue dans les définitions de limites. On peut alors définir aussi, comme dans le cas de  $\mathbb{R}$ , les fonctions de classe  $C^\infty$  et les fonctions analytiques. On a alors :

$$f \text{ dérivable partout} \Rightarrow f \text{ de classe } C^\infty \Rightarrow f \text{ analytique.}$$

Une application  $f$  de  $\mathbb{C}$  dans  $\mathbb{C}$  dérivable partout, s'appelle "fonction holomorphe". Comme pour le cas des applications de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , une application de  $\mathbb{C}$  dans  $\mathbb{C}$  est holomorphe si et seulement si elle est développable en série entière (voir la remarque 4.3 et remplacer  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$  par  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ .)

## 4.4 Développements limités

**Définition 4.2 (DLn)** Soit  $-\infty \leq \alpha < \beta \leq \infty$  et  $f$  une application de  $] \alpha, \beta [$  dans  $\mathbb{R}$ . Soit  $a \in ] \alpha, \beta [$ , on suppose que  $f$  est continue en  $a$ . Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Alors,  $f$  admet un "DLn" (pour "Développement Limité d'ordre  $n$ ") en  $a$  si il existe  $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$  t.q. (pour  $x \in ] \alpha, \beta [$ ) :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x-a)^k + (x-a)^n \varepsilon(x), \text{ avec } \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0. \quad (4.5)$$

Autrement dit, il existe un polynôme de degré au plus  $n$ , noté  $P$ , t.q.  $f(x) = P(x) + (x-a)^n \varepsilon(x)$  (avec  $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$ ). Comme cette formule n'est intéressante que au voisinage de  $a$ , on écrit ce polynôme sous la forme donnée en (4.5), c'est-à-dire avec des puissances de plus en plus grandes de  $(x-a)$  (car, pour  $k \in \mathbb{N}$  et pour  $|x-a|$  petit par rapport à 1,  $|x-a|^{k+1}$  est petit par rapport à  $|x-a|^k$ ).

**Remarque 4.5** Quelques remarques élémentaires sur les Développement Limités. On se place dans les hypothèses de la définition 4.2.

1. Si  $f$  admet un DLn, les  $a_k$  (de la formule (4.5)),  $k = 0, \dots, n$ , sont uniques.
2. Si  $f$  est de classe  $C^n$ ,  $f$  admet un DLn en  $a$  et la formule (4.5) est vraie avec  $a^k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$  pour  $k = 0, \dots, n$ .
3. On suppose ici que  $n \geq 1$ . Alors :

$$f \text{ admet un DLn en } a \Rightarrow f \text{ dérivable en } a \text{ et } f'(a) = a_1 \text{ (dans la formule (4.5)).}$$

4. On suppose ici que  $n \geq 2$ . Alors :

$$f \text{ admet un DLn en } a \not\Rightarrow f' \text{ définie dans un voisinage de } a,$$

et on ne peut donc pas dériver  $f'$  en  $a$ . On a bien  $f'(a) = a_1$ , mais on ne peut pas dire que  $f''(a) = 2a_2$  (dans la formule (4.5)). Un exemple est donné dans l'exemple 4.4.

5. On définit  $g$  (de  $] \alpha - a, \beta - a [$  dans  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = f(x+a)$ . Alors,  $f$  admet un DLn en  $a$  si et seulement si  $g$  admet un DLn en 0 (et les coefficients du développement limité sont les mêmes).

**Exemple 4.4** On donne ici un exemple pour le quatrième item de la remarque 4.5. Soit  $n \geq 2$ . On définit  $f$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  par :

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 \text{ si } x \leq 0, \\ f(x) &= x^{n+1} \text{ si } x \in ]\frac{1}{p+1}, \frac{1}{p}] \text{ avec } p \in \mathbb{N}^* \text{ pair,} \\ f(x) &= -x^{n+1} \text{ si } x \in ]\frac{1}{p+1}, \frac{1}{p}] \text{ avec } p \in \mathbb{N}^* \text{ impair,} \\ f(x) &= -1 \text{ si } x > 1. \end{aligned}$$

Pour cette application,  $f'$  n'est pas définie en  $\frac{1}{p}$  pour tout  $p > 1$  (car  $f$  non continue en ce point) et  $f$  admet un  $DLn$  en 0.

On peut souvent calculer un développement limité en utilisant la formule de Taylor-Young (formule (4.2)), c'est ce qui est suggéré par le deuxième item de la remarque 4.5. On donne un exemple ci après (exemple 4.5).

**Exemple 4.5** Pour  $x < 1$ , on pose  $f(x) = \frac{1}{1-x}$ . La fonction  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $] -\infty, 1[$ . On peut démontrer, par récurrence sur  $n$  que  $f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  et tout  $x < 1$ . On en déduit, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , le  $DLn$  en 0 de  $f$  :

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{i=0}^n x^i + \varepsilon(x)x^n, \quad \text{avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

**Proposition 4.2 (Opérations sur DL)** Soit  $-\infty \leq \alpha < \beta \leq \infty$  et  $f, g$  deux applications de  $] \alpha, \beta[$  dans  $\mathbb{R}$ . Soit  $a \in ] \alpha, \beta[$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ . On suppose que  $f, g$  admettent des  $DLn$  en  $a$ . Alors :

1.  $f + g$  admet un  $DLn$  en  $a$ ,
2.  $fg$  admet un  $DLn$  en  $a$ ,
3. Si  $g(a) \neq 0$ ,  $f/g$  (bien définie au voisinage de  $a$ ) admet un  $DLn$  en  $a$ .

Les  $DLn$  de  $f + g$ ,  $fg$  et  $f/g$  (si  $g(a) \neq 0$ ) se calculent à partir des  $DLn$  de  $f$  et  $g$ .

DÉMONSTRATION : Compte tenu du cinquième item de la remarque 4.5, on peut supposer  $a = 0$  (ce qui simplifie les formules).

Comme  $f, g$  admettent des  $DLn$  en 0, il existent des polynômes  $P$  et  $Q$ , de degré au plus  $n$ , t.q., pour tout  $x \in ] \alpha, \beta[$ ,

$$f(x) = P(x) + x^n \varepsilon_1(x), \quad g(x) = Q(x) + x^n \varepsilon_2(x),$$

avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_1(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_2(x) = 0$ .

Le premier item de la proposition est facile, il suffit de remarquer que (pour tout  $x \in ] \alpha, \beta[$ )

$$f(x) + g(x) = (P + Q)(x) + x^n \varepsilon_3(x),$$

avec  $\varepsilon_3 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$ . Le polynôme  $P + Q$  est de degré au plus  $n$  et  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_3(x) = 0$ . On a bien montré que la fonction  $f + g$  admet un  $DLn$  en 0 et on trouve ce  $DLn$ .

Le deuxième item est à peine plus difficile. On remarque que (pour tout  $x \in ] \alpha, \beta[$ )

$$f(x)g(x) = P(x)Q(x) + x^n(P(x)\varepsilon_2(x) + Q(x)\varepsilon_1(x) + x^n\varepsilon_1(x)\varepsilon_2(x)).$$

Le polynôme  $PQ$  est de degré au plus  $2n$ , on peut donc l'écrire  $PQ(x) = R(x) + x^{n+1}S(x)$ , où  $R$  est un polynôme de degré au plus  $n$  et  $S$  est un polynôme (de degré au plus  $n - 1$ ). On obtient alors

$$fg(x) = R(x) + x^n \varepsilon_4(x),$$

avec  $\varepsilon_4(x) = xS(x) + P(x)\varepsilon_2(x) + Q(x)\varepsilon_1(x) + x^n\varepsilon_1(x)\varepsilon_2(x)$ . On a bien  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_4(x) = 0$ . Ce qui prouve que  $fg$  admet un  $DLn$  en 0 et on aussi trouvé ce  $DLn$  (c'est-à-dire le polynôme  $R$ ).

Le troisième item est plus difficile. On pose  $b = g(0)$ . Comme  $b \neq 0$  et que  $g$  est continue en 0, il existe  $\gamma > 0$  t.q.  $g(x) \neq 0$  pour tout  $x \in ]-\gamma, \gamma[$ . On se limite donc maintenant à  $x \in ]-\gamma, \gamma[$  et  $\frac{f}{g}(x)$  est bien définie.

Pour  $x \in ]-\gamma, \gamma[$ , on pose  $h(x) = 1 - \frac{g(x)}{b}$  de sorte que  $g(x) = b(1 - h(x))$  et

$$\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{b} \frac{1}{1 - h(x)}.$$

Noter que  $h(x) \neq 1$  car  $g(x) \neq 0$  (puisque  $x \in ]-\gamma, \gamma[$ ). Comme  $h(0) = 0$  (et que  $h$  est continue), le théorème des valeurs intermédiaires (théorème 2.2) donne même que  $h(x) < 1$  pour tout  $x \in ]-\gamma, \gamma[$ .

La fonction  $h$  admet un  $Dln$  en 0. Plus précisément, en posant  $T(x) = 1 - \frac{Q(x)}{b}$ , la fonction  $T$  est un polynôme de degré au plus  $n$  et on a

$$h(x) = T(x) + x^n \varepsilon_5(x), \quad \text{avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_5(x) = 0. \quad (4.6)$$

Comme  $h(0) = 0$ , on a nécessairement (grâce à la continuité de  $T$  et  $h$  en 0)  $T(0) = 0$  et donc  $T(x) = xS(x)$ , où  $S$  est un polynôme (de degré au plus  $n - 1$ ).

On pose maintenant  $\varphi(x) = \frac{1}{1-h(x)}$  (de sorte que  $\frac{f}{g} = \frac{f}{b}\varphi$ ). Pour montrer que  $\frac{f}{g}$  admet un  $DLn$  en 0 (et trouver ce  $DLn$ ), il suffit donc, compte tenu du deuxième item de cette proposition, de montrer que  $\varphi$  admet un  $DLn$  en 0 (et de trouver ce  $DLn$ ). Pour obtenir le  $DLn$  de  $\varphi$  en 0, on utilise l'exemple 4.5 qui donne, pour tout  $y < 1$ ,

$$\frac{1}{1-y} = 1 + \sum_{k=1}^n y^k + y^n \varepsilon(y), \quad \text{avec } \lim_{y \rightarrow 0} \varepsilon(y) = 0.$$

(On rappelle qu'en posant  $\varepsilon(0) = 0$  on a  $\varepsilon$  continue en 0.) On a donc (pour tout  $x \in ]-\gamma, \gamma[$ )

$$\varphi(x) = \frac{1}{1-h(x)} = 1 + \sum_{k=1}^n (h(x))^k + (h(x))^n \varepsilon(h(x)).$$

En utilisant (4.6) et  $T(x) = xS(x)$ , on obtient  $(h(x))^n \varepsilon(h(x)) = x^n (S(x) + x^{n-1} \varepsilon_5(x))^n \varepsilon(h(x)) = x^n \varepsilon_6(x)$ , avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_6(x) = 0$  (car  $h(0) = \varepsilon(0) = 0$  et  $h$  et  $\varepsilon$  sont continues en 0). Ce qui donne

$$\varphi(x) = \frac{1}{1-h(x)} = 1 + \sum_{k=1}^n (T(x) + x^n \varepsilon_5(x))^k + x^n \varepsilon_6(x). \quad (4.7)$$

On remarque maintenant que pour tout  $k \in \{1, \dots, n\}$  il existe un polynôme  $T_k$  de degré au plus  $n$  t.q.  $(T(x) + x^n \varepsilon_5(x))^k = T_k(x) + x^n \eta_k(x)$  avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \eta_k(x) = 0$ . Ceci peut se démontrer en développant la formule  $(T(x) + x^n \varepsilon_5(x))^k$ . On peut aussi montrer ce résultat par récurrence (finie) sur  $k$  (et on obtient aussi ainsi les polynômes  $T_k$ ). C'est cette seconde méthode que nous utilisons ici.

**Initialisation :** Pour  $k = 1$ , on a  $T_1 = T$  (et  $\eta_1 = \varepsilon_5$ ).

**Calcul de  $T_{k+1}$  connaissant  $T_k$  ( $k \in \{1, \dots, n-1\}$ ) :** Comme  $(T(x) + x^n \varepsilon_5(x))^k = T_k(x) + x^n \eta_k(x)$ , on a

$$\begin{aligned} (T(x) + x^n \varepsilon_5(x))^{k+1} &= (T_k(x) + x^n \eta_k(x))(T(x) + x^n \varepsilon_5(x)) \\ &= T_k(x)T(x) + x^n (T(x)\eta_k(x) + T_k(x)\varepsilon_5(x) + x^n \eta_k(x)\varepsilon_5(x)). \end{aligned}$$

Le polynôme  $T_k T$  peut s'écrire  $T_k(x)T(x) = T_{k+1}(x) + x^{n+1}S_k(x)$ , où  $T_{k+1}$  est un polynôme de degré au plus  $n$  et  $S_k$  est un polynôme (de degré au plus  $n-1$ ). On obtient ainsi

$$(T(x) + x^n \varepsilon_5(x))^{k+1} = T_{k+1}(x) + x^n \eta_{k+1}(x), \quad (4.8)$$

avec  $\eta_{k+1}(x) = xS_k(x) + T(x)\eta_k(x) + T_k(x)\varepsilon_5(x) + x^n \eta_k(x)\varepsilon_5(x)$ , et donc  $\lim_{x \rightarrow 0} \eta_{k+1}(x) = 0$ . Ce qui termine la récurrence.

On utilise maintenant la formule (4.8) dans (4.7) pour obtenir

$$\varphi(x) = \frac{1}{1-h(x)} = 1 + \sum_{k=1}^n T_k(x) + x^n \varepsilon_7(x),$$

avec  $\varepsilon_7 = \varepsilon_6 + \sum_{k=1}^n \eta_k$ , et donc  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_7(x) = 0$ . Ce qui donne le  $DLn$  en 0 de  $\varphi$ . On en déduit ensuite (par le deuxième item de cette proposition) le  $DLn$  de  $\frac{f}{g}$  en 0. ■

**Proposition 4.3 (Composition de  $DL$ )** Soit  $f$  une application de  $] \alpha, \beta[$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a \in ] \alpha, \beta[$ . Soit  $g$  une application de  $] \gamma, \delta[$  dans  $\mathbb{R}$  et  $b \in ] \gamma, \delta[$ . On suppose que  $g(b) = a$ . Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On suppose que  $f$  et  $g$  admettent des  $DLn$ , en  $a$  pour  $f$  et en  $b$  pour  $g$ . Alors  $f \circ g$  admet un  $DLn$  en  $b$  et ce  $DLn$  se calcule à partir des  $DLn$  de  $f$  et  $g$ .

**DÉMONSTRATION :** Dans la proposition 4.2, nous avons en fait démontré cette proposition dans un cas particulier (correspondant ici à prendre  $a = b = 0$  et pour  $f$  l'application  $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ , définie sur  $] -\infty, 1[$ ). Pour la démontrer dans le cas général demandée ici, on reprend essentiellement la même méthode que dans la proposition 4.2.

On commence par remarquer qu'on peut toujours se ramener au cas  $a = b = 0$ . En effet, Il suffit de poser  $F(x) = f(x+a)$  et  $G(x) = g(x+b) - g(b)$ . Les  $DLn$  de  $f$  et  $g$  en  $a$  et  $b$  donnent les  $DLn$  de  $F$  et  $G$  en 0. Puis, comme  $f(g(x+b)) = F(G(x))$ , le  $DLn$  de  $F \circ G$  en 0 donne le  $DLn$  de  $f \circ g$  en  $b$ .

On suppose donc maintenant que  $a = b = 0$ .

Comme  $g$  est continue en 0 et  $g(0) = 0 \in ] \alpha, \beta[$ , il existe  $\omega > 0$  t.q.

$$x \in ] -\omega, +\omega[ \Rightarrow g(x) \in ] \alpha, \beta[.$$

La fonction  $f \circ g$  est donc bien définie sur l'intervalle  $] -\omega, +\omega[$ . On se limite dans la suite à  $x \in ] -\omega, +\omega[$ . Comme  $g$  admet un  $DLn$  en 0, il existe un polynôme  $Q$  de degré au plus  $n$  t.q.  $g(x) = Q(x) + x^n \varepsilon_1(x)$  (pour tout  $x \in ] -\omega, +\omega[$ ) et  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_1(x) = 0$ , c'est-à-dire  $\varepsilon_1$  continue en 0, en posant  $\varepsilon_1(0) = 0$ .

Comme  $f$  admet un  $DLn$  en 0, il existe un polynôme  $P$  de degré au plus  $n$  t.q.  $f(y) = P(y) + y^n \varepsilon_2(y)$  (pour tout  $y \in ] \alpha, \beta[$ ) et  $\lim_{y \rightarrow 0} \varepsilon_2(y) = 0$ , c'est-à-dire  $\varepsilon_2$  continue en 0, en posant  $\varepsilon_2(0) = 0$ .

On en déduit, pour tout  $x \in ] -\omega, +\omega[$ , en prenant  $y = g(x)$

$$f(g(x)) = P(g(x)) + g(x)^n \varepsilon_2(g(x)) = P(g(x)) + g(x)^n \varepsilon_3(x), \quad (4.9)$$

avec  $\varepsilon_3 = \varepsilon_2 \circ g$  et donc  $\varepsilon_3(0) = 0$  et  $\varepsilon_3$  continue en 0. On rappelle aussi que

$$g(x) = Q(x) + x^n \varepsilon_1(x).$$

Or  $Q(0) = g(0) = 0$  (car  $Q$  et  $g$  sont continues en 0). Ceci montre que  $Q$  est un polynôme qui s'annule en 0. Il existe donc un polynôme  $R$  (de degré au plus  $n - 1$ ) t.q.  $Q(x) = xR(x)$ . Ceci montre que

$$g(x) = x(R(x) + (x - b)^{n-1} \varepsilon_1(x)).$$

En reportant cette égalité dans (4.9) on obtient

$$f(g(x)) = P(g(x)) + x^n \varepsilon_4(x), \quad (4.10)$$

avec  $\varepsilon_4(x) = (R(x) + x^{n-1} \varepsilon_1(x))^n \varepsilon_3(x)$ . On a donc aussi  $\varepsilon_4$  continue en 0 et  $\varepsilon_4(0) = 0$ . Enfin, comme  $P$  est un polynôme de degré au plus  $n$ , il existe  $a_0, \dots, a_n$  t.q.

$$P(y) = a_0 + \sum_{k=1}^n a_k y^k.$$

Comme  $g(x) = Q(x) + x^n \varepsilon_1(x)$ , on a donc

$$P(g(x)) = a_0 + \sum_{k=1}^n a_k (Q(x) + x^n \varepsilon_1(x))^k.$$

On reprend maintenant une partie de la démonstration de la proposition 4.2. Pour tout  $k \in \{1, \dots, n\}$  il existe un polynôme  $Q_k$  de degré au plus  $n$  t.q.  $(Q(x) + x^n \varepsilon_1(x))^k = Q_k(x) + x^n \eta_k(x)$  avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \eta_k(x) = 0$ . On obtient alors, avec (4.10),

$$f(g(x)) = a_0 + \sum_{k=1}^n a_k Q_k(x) + x^n \varepsilon_5(x),$$

$\varepsilon_5 = \varepsilon_4 + \sum_{k=1}^n a_k \eta_k$ , et donc  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_5(x) = 0$ . Ce qui donne le *DLn* en 0 de  $f \circ g$ . ■

**Proposition 4.4 (DL de  $f$  à partir du DL de  $f'$ )** Soit  $f$  une application de  $] \alpha, \beta[$  dans  $\mathbb{R}$ , dérivable. Soit  $a \in ] \alpha, \beta[$ . On suppose que  $f'$  admet un *DLn* en  $a$ . Alors  $f$  admet un *DL(n+1)* en  $a$  et le *DL(n+1)* de  $f$  se calcule à partir du *DLn* de  $f'$ .

DÉMONSTRATION : Ici encore, on peut se limiter à considérer le cas  $a = 0$ . Comme  $f'$  admet un *DLn* en 0, il existe  $a_0, \dots, a_n$  t.q. (pour tout  $x \in ] \alpha, \beta[$ )

$$f'(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + x^n \varepsilon(x), \quad \text{avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

On “devine” alors ce que doit être le *DL(n+1)* de  $f$  en 0. Pour le montrer, on définit la fonction  $\varphi$  de  $] \alpha, \beta[$  par

$$\varphi(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} x^{k+1}.$$

la fonction  $\varphi$  est dérivable sur  $] \alpha, \beta[$ , et  $\varphi'(x) = x^n \varepsilon(x)$ , pour tout  $x \in ] \alpha, \beta[$ .

Pour  $x \in ] \alpha, \beta[$ , on utilise le théorème des accroissements finis (théorème 3.2) sur l'intervalle dont les bornes sont 0 et  $x$ . Il donne l'existence de  $c_x \in \text{Int}(0, x)$  t.q.  $\varphi(x) - \varphi(0) = x\varphi'(c_x) = xc_x^n \varepsilon(c_x)$ . Comme  $|c_x| \leq |x|$ , on en déduit

$$|\varphi(x) - \varphi(0)| = |f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} x^{k+1} - f(0)| \leq |x|^{n+1} \varepsilon_1(x); \quad (4.11)$$

avec  $\varepsilon_1(x) = \max\{|\varepsilon(y)|, y \in \text{Int}(0, x)\}$ . Comme  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$  on a aussi  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_1(x) = 0$ . De (4.11) on déduit alors

$$f(x) = f(0) + \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} x^{k+1} + x^{n+1} \varepsilon_2(x),$$

avec  $|\varepsilon_2(x)| \leq \varepsilon_1(x)$  et donc  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_2(x) = 0$ . Ce qui donne le  $DL(n+1)$  de  $f$ . ■

## 4.5 Exemples (formules de Taylor, DL)

En pratique, pour trouver un développement limité on utilise souvent la formule de Taylor Young si la fonction est "simple" (et régulière) ou l'une des propositions du paragraphe 4.4 si la fonction est "compliquée". On donne maintenant quelques exemples.

**Exemple 4.6** Soit  $P$  un polynôme (non nul) de degré  $d$ . Alors  $P$  est de classe  $C^\infty$  (sur  $\mathbb{R}$ ) et le reste du  $DLn$  (c'est-à-dire le terme  $(x-a)^n h(x)$  dans la formule (4.2) ou le terme  $\frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c)$  dans la formule (4.1)) est nul pour  $n \geq d$ . (Donc,  $P$  est analytique.)

**Exemple 4.7** On prend ici  $f(x) = \ln(1+x)$ , pour  $x > -1$  (la fonction  $f$  est analytique sur  $] -1, +\infty[$ ). On peut calculer, par exemple, son  $DL2$  en 0. Comme  $f'(0) = 1$  et  $f''(0) = -1$ , on trouve  $f(x) = x - \frac{x^2}{2} + x^2 \varepsilon(x)$ , avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$ .

**Exemple 4.8** On prend ici  $f(x) = \sin x$ ,  $x \in \mathbb{R}$  (la fonction  $f$  est analytique sur  $\mathbb{R}$ ). On remarque que  $f^{(2p)}(x) = (-1)^p \sin(x)$  et  $f^{(2p+1)}(x) = (-1)^p \cos(x)$  pour  $p \in \mathbb{N}$  et  $x \in \mathbb{R}$ . On en déduit, par exemple, avec la formule (4.2), le  $DL4$ , de  $f$  en 0 :

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + x^4 \varepsilon(x), \quad \text{avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

**Exemple 4.9** On prend ici  $g(x) = \cos x$ ,  $x \in \mathbb{R}$  (la fonction  $g$  est analytique sur  $\mathbb{R}$ ). On remarque que  $g^{(2p)}(x) = (-1)^p \cos(x)$  et  $g^{(2p+1)}(x) = (-1)^{p+1} \sin(x)$  pour  $p \in \mathbb{N}$  et  $x \in \mathbb{R}$ . On en déduit, par exemple, avec la formule (4.2), le  $DL3$ , de  $g$  en 0 :

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + x^3 \varepsilon(x), \quad \text{avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

**Exemple 4.10** On prend ici  $h(x) = \tan x$ ,  $x \in ] -\pi/2, \pi/2[$  (la fonction  $h$  est analytique sur  $] -\pi/2, \pi/2[$ ). Pour trouver, par exemple, le  $DL3$  en 0, on peut utiliser deux méthodes :

1. (Première méthode) Calculer  $h(0)$ ,  $h'(0)$ ,  $h''(0)$ ,  $h'''(0)$  et utiliser la formule (4.2),
2. (Deuxième méthode) Faire le quotient des  $DL$  de  $f$  et  $g$ .

On trouve (dans les deux cas !)

$$\tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + x^3\varepsilon(x), \quad \text{avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

**Exemple 4.11** On prend ici  $\psi(x) = \arctan x$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . La fonction  $\psi$  est donc la fonction réciproque de la fonction  $\tan$ , notée  $h$  dans l'exemple 4.10, on garde ici cette notation. La fonction  $\psi$  est définie sur  $\mathbb{R}$  (et elle est analytique). Pour calculer, par exemple, son *DL3* en 0, on peut commencer par utiliser la proposition 3.4 sur les fonctions réciproques, elle donne que  $\psi'(h(x))h'(x) = 1$  pour tout  $x \in ]-\pi/2, \pi/2[$ . Comme  $h'(x) = 1 + \tan^2(x) = 1 + (h(x))^2$ , on obtient

$$\psi'(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}. \quad (4.12)$$

On obtient alors le *DL3* de  $\psi$  en 0 en calculant les valeurs en 0 de  $\psi$  et ses trois premières dérivées (avec la formule (4.12) ou avec la proposition 4.5) :

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + x^3\varepsilon(x), \quad \text{avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

**Proposition 4.5** Soit  $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ ,  $-\infty \leq \alpha < \beta \leq +\infty$  et  $f$  une application de  $]a, b[$  dans  $] \alpha, \beta[$ , strictement croissante, continue, bijective. On note  $g$  la fonction réciproque de  $f$ . On suppose que  $f$  est dérivable et  $f'(x) \neq 0$  pour tout  $x \in ]a, b[$ . Alors :

1.  $g$  dérivable de  $g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))}$  pour tout  $x \in ]\alpha, \beta[$ .
2. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a :

$$f \text{ de classe } C^n \Rightarrow g \text{ de classe } C^n.$$

Donc, si  $f$  de classe  $C^n$ ,  $g$  admet un *DLn* en tout point de  $] \alpha, \beta[$ . (Pour calculer le *DLn* de  $g$ , si on connaît les dérivées de  $f$ , on trouve celles de  $g$  en dérivant la formule  $g'(x)f'(g(x)) = 1$ .)

DÉMONSTRATION : Le premier item a été démontré dans la proposition 3.4.

On montre le deuxième item par récurrence sur  $n$ . Le cas  $n = 0$  a déjà été vu (théorème 2.5). On commence la récurrence à  $n = 1$ .

**Initialisation :**  $n = 1$ . On suppose que  $f$  est de classe  $C^1$ . On a alors  $g$  continue (théorème 2.5) et  $f'$  continue (par hypothèse). On a donc  $f' \circ g$  continue et, comme  $f' \circ g$  ne s'annule pas, on a aussi  $1/(f' \circ g)$  continue, c'est-à-dire  $g'$  continue. La fonction  $g$  est donc de classe  $C^1$ .

**Passage de  $n$  à  $n + 1$  :** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On suppose que

$$f \text{ de classe } C^n \Rightarrow g \text{ de classe } C^n.$$

et on veut montrer que

$$f \text{ de classe } C^{n+1} \Rightarrow g \text{ de classe } C^{n+1}.$$

On suppose donc que  $f$  est de classe  $C^{n+1}$ . On a donc  $f'$  de classe  $C^n$ . De plus, comme  $f$  est de classe  $C^n$ , l'hypothèse de récurrence donne que  $g$  est de classe  $C^n$ . Par composition, on en déduit que  $f' \circ g$  est de classe  $C^n$  et donc, comme  $f' \circ g$  ne s'annule pas, que  $1/(f' \circ g)$  est de classe  $C^n$ . Ceci donne donc que  $g'$  est de classe  $C^n$  et donc que  $g$  est de classe  $C^{n+1}$ . Ce qui termine la récurrence. ■

On revient sur le deuxième item de l'exemple 4.1 sur la recherche des extrémums d'une fonction.

**Définition 4.3** Soit  $f$  une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ . On dit que  $f$  admet un minimum local en  $a$  si il existe  $\gamma > 0$  t.q. :

$$x \in \mathbb{R}, |x - a| \leq \gamma \Rightarrow f(a) \leq f(x).$$

La proposition suivante donne des conditions nécessaires et une condition suffisante pour que  $f$  admette un minimum local en  $a$  (grâce à la formule (4.1), formule de Taylor-Lagrange).

**Proposition 4.6** Soit  $f$  une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ . On suppose  $f$  dérivable en  $a$ . Alors, si  $f$  admet un minimum local en  $a$  on a nécessairement  $f'(a) = 0$ . Plus précisément, si  $f$  est de classe  $C^2$ , on a :

1. (Condition Nécessaire)  $f$  admet un minimum local en  $a \Rightarrow f'(a) = 0$  et  $f''(a) \geq 0$ .
2. (Condition Suffisante)  $f'(a) = 0$ ,  $f''(a) > 0 \Rightarrow f$  admet un minimum local en  $a$ .

DÉMONSTRATION :

**Condition Nécessaire.** On suppose que  $f$  est dérivable en  $a$  et que  $f$  admet un minimum local en  $a$ . Il existe donc  $\alpha > 0$  t.q.  $f(a) \leq f(x)$  pour tout  $x \in ]a - \alpha, a + \alpha[$ . Pour  $0 < h < \alpha$  on a donc

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq 0.$$

On en déduit que  $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0, h > 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq 0$ .

On remarque maintenant que pour  $-\alpha < h < 0$  on a

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq 0.$$

On en déduit que  $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0, h < 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq 0$ . Finalement, on a bien montré que  $f'(a) = 0$ .

On suppose maintenant de plus que  $f$  est de classe  $C^2$ . Pour montrer que  $f''(a) \geq 0$ , on peut utiliser les formules de Taylor-Lagrange ou de Taylor-Young. On le fait ici avec la formule de Taylor-Young. La formule (4.2) donne, pour tout  $x \in ]a - \alpha, a + \alpha[$ ,

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{1}{2}(x - a)^2 f''(a) + (x - a)^2 h(x), \quad \text{avec } \lim_{x \rightarrow a} h(x) = 0.$$

Comme  $f'(a) = 0$  et  $f(x) \geq f(a)$ , on a donc, pour tout  $x \in ]a - \alpha, a + \alpha[$ ,

$$f''(a) \geq 2h(x).$$

Quand  $x \rightarrow a$ , on en déduit  $f''(a) \geq 0$ .

**Condition Suffisante.** Comme  $f''(a) > 0$  et  $f''$  continue en  $a$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q.  $f''(y) > 0$  pour tout  $y \in ]a - \alpha, a + \alpha[$ . On va montrer que  $f(x) \geq f(a)$  pour tout  $x \in ]a - \alpha, a + \alpha[$  en utilisant la formule de Taylor-Lagrange (on ne peut pas conclure ici avec la formule de Taylor-Young). Soit  $x \in ]a - \alpha, a + \alpha[$ ,  $x \neq a$ . D'après la formule (4.1), il existe  $c_x \in \text{Int}(a, x)$  t.q.

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{1}{2}(x - a)^2 f''(c_x).$$

Comme  $f'(a) = 0$  et  $f''(c_x) > 0$  (car  $c_x \in ]a - \alpha, a + \alpha[$ ), on a donc  $f(x) > f(a)$ . On a bien montré que  $f$  admet un minimum local en  $a$ . ■

Les notions que nous venons d'introduire (limite, continuité, dérivée, développements limités) permettent d'étudier des fonctions de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  (ou d'un intervalle de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ ). Plusieurs exercices sont consacrés à cette question. On rappelle maintenant la notion d'asymptote, utilisée dans plusieurs exercices. Par exemple, si  $f$  est une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a, b \in \mathbb{R}$ , la droite d'équation  $x \mapsto ax + b$  est l'asymptote de  $f$  en  $+\infty$  si  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax - b) = 0$ .

## 4.6 Equivalents

**Définition 4.4** Soit  $-\infty \leq \alpha < \beta \leq \infty$ ,  $\alpha \leq a \leq \beta$  et  $D \supset ]\alpha, \beta[ \setminus \{a\}$ . Soit  $f, g$  deux applications de  $D$  dans  $\mathbb{R}$ . On dit que  $f \sim g$  en  $a$  (ou que  $f(x) \sim g(x)$  en  $a$ ) si  $f(x) = g(x)(1 + \varepsilon(x))$  au voisinage de  $a$ , avec  $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$ .

Sous les hypothèses de la définition 4.4, si  $a \in \mathbb{R}$ , la phrase " $f(x) = g(x)(1 + \varepsilon(x))$  au voisinage de  $a$ " signifie qu'il existe  $\gamma > 0$  t.q.  $f(x) = g(x)(1 + \varepsilon(x))$  pour tout  $x \in [a - \gamma, a + \gamma] \cap D$ . Si  $a = +\infty$ , elle signifie qu'il existe  $M \in \mathbb{R}$  t.q.  $f(x) = g(x)(1 + \varepsilon(x))$  pour tout  $x \in [M, +\infty[$ . Si  $a = -\infty$ , elle signifie qu'il existe  $M \in \mathbb{R}$  t.q.  $f(x) = g(x)(1 + \varepsilon(x))$  pour tout  $x \in ]-\infty, M]$ .

**Remarque 4.6** Deux propriétés simples, sous les hypothèses de la définition 4.4.

1.  $f \sim g$  en  $a \Leftrightarrow g \sim f$  en  $a$ .
2. Si  $f$  (ou  $g$ ) est non nulle au voisinage de  $a$  (sauf éventuellement en  $a$ ), on a alors :  

$$f \sim g \text{ en } a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x)/g(x) = 1.$$

**Exemple 4.12** Soit  $a \in \mathbb{R}$  et  $f$  une application définie au voisinage de  $a$ , à valeurs dans  $\mathbb{R}$ . Alors :

1. Si  $f$  dérivable en  $a$  et  $f'(a) \neq 0$ , on a alors  $f(x) - f(a) \sim (x - a)f'(a)$  en  $a$ .
2. Si  $f$  de classe  $C^2$ ,  $f'(a) = 0$  et  $f''(a) \neq 0$ , on a alors  $f(x) - f(a) \sim \frac{(x-a)^2}{2} f''(a)$  en  $a$ .

Voici des applications immédiates de l'exemple 4.12 :

$\sin x \sim x$  en  $0$ ,  $\cos x - 1 \sim -x^2/2$  en  $0$ .

**Proposition 4.7 (Produit d'équivalents)** Soit  $a \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$  et  $f, g, \varphi, \psi$  quatre applications définies au voisinage de  $a$ , à valeurs dans  $\mathbb{R}$ , t.q.  $f \sim g$ ,  $\varphi \sim \psi$  en  $a$ . Alors,  $f\varphi \sim g\psi$  en  $a$ .

DÉMONSTRATION : On suppose  $a \in \mathbb{R}$  (les cas  $a = \pm\infty$  sont laissés en exercice). Il existe  $\gamma > 0$  t.q., pour tout  $x \in [a - \gamma, a + \gamma]$ ,

$$f(x) = g(x)(1 + \varepsilon_1(x)), \text{ avec } \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_1(x) = 0,$$

$$\varphi(x) = \psi(x)(1 + \varepsilon_2(x)), \text{ avec } \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_2(x) = 0.$$

On a alors

$$f(x)\varphi(x) = g(x)\psi(x)(1 + \varepsilon_3(x)),$$

avec  $\varepsilon_3 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_1\varepsilon_2$ . On a donc  $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_3(x) = 0$ , ce qui prouve que  $f\varphi \sim g\psi$  en  $a$ . ■

Il y a un piège avec les équivalents. Sous les hypothèses de la proposition 4.7 (on a donc  $f \sim g$  et  $\varphi \sim \psi$  en  $a$ ) on n'a pas toujours  $f + \varphi \sim g + \psi$  en  $a$ . Voici un exemple simple. On prend  $a = 0$  et, pour tout  $x > -1$ ,  $f(x) = \sin x$ ,  $g(x) = x$ ,  $\varphi(x) = -\log(1 + x)$ ,  $\psi(x) = -x$ . On a bien  $f \sim g$  et  $\varphi \sim \psi$  en  $0$ .

Pourtant,  $(f + \varphi) \not\sim (g + \psi)$  en 0. En fait, pour comprendre cette difficulté, il suffit de remarquer que  $f \sim 0$  en  $a$  implique  $f = 0$  au voisinage de  $a$ . L'exercice 4.9 donne toutefois un cas particulier pour lequel  $f \sim g$  et  $\varphi \sim \psi$  en  $a$  implique  $f + \varphi \sim g + \psi$  en  $a$ . Il s'agit du cas où  $g = \lambda h$ ,  $\psi = \mu h$  avec  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  et  $\lambda + \mu \neq 0$ .

**Définition 4.5 (“petit o” et “grand O”)** Soit  $-\infty \leq \alpha < \beta \leq \infty$ ,  $\alpha \leq a \leq \beta$  et  $D \supset ]\alpha, \beta[ \setminus \{a\}$ . Soit  $f, g$  deux applications de  $D$  dans  $\mathbb{R}$

1. On dit que  $f = o(g)$  en  $a$  si  $f(x) = g(x)\varepsilon(x)$  au voisinage de  $a$ , avec  $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$ .
2. On dit que  $f = O(g)$  en  $a$  si il existe  $C > 0$  t.q.  $|f(x)| \leq C|g(x)|$  au voisinage de  $a$ .

## 4.7 Exercices

### Exercice 4.1 (Fonction $C^\infty$ non analytique)

On définit  $f$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  par :

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-\frac{1}{x}}, \text{ si } x > 0, \\ f(x) &= 0, \text{ si } x \leq 0. \end{aligned}$$

1. Montrer que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $] -\infty, 0[$  et sur  $]0, \infty[$ .
2. Montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , il existe un polynôme  $p_n$  t.q.

$$f^{(n)}(x) = \frac{p_n(x)}{x^{2n}} e^{-\frac{1}{x}}, \text{ si } x > 0.$$

3. Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

(a) Soit  $p \in \mathbb{Z}$ , Montrer que :

$$\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^p} = 0.$$

[On rappelle que  $e^u \geq \frac{u^q}{q!}$  pour tout  $u > 0$  et tout  $q \in \mathbb{N}$ .]

(b) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow 0} f^{(n)}(x) = 0$ .

4. Montrer que  $f$  est de classe  $C^\infty$  (sur  $\mathbb{R}$ ).
5. Montrer que  $f$  n'est pas analytique.

### Exercice 4.2 (DL, exemple 1)

On définit  $f$  sur  $] -\infty, 1[$  par :

$$f(x) = \arctan \frac{1}{1-x}.$$

Donner le développement limité à l'ordre 3 de  $f$  en 0.

### Exercice 4.3 (DL d'un polynôme...)

Donner le développement limité à l'ordre 7 en  $-1$  de la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^4 - 1$ .

### Exercice 4.4 (Utilisation des DL)

Donner la limite en 0 de  $f$  définie sur  $]0, \infty[$  par :

$$f(x) = \frac{e^x - 1 - x}{x^2}.$$

**Exercice 4.5 (DL, exemple 2)**

On définit  $f$  sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{-\frac{1}{|x|}}$  si  $x \neq 0$  et  $f(0) = 0$ .

1. Montrer que  $f$  est de classe  $C^\infty$ . [Reprendre un exercice précédent...]
2. Calculer  $f'$  et  $f''$ .
3. Montrer que  $f$  est paire, donner son tableau de variation et sa limite en  $+\infty$ .
4. Donner le développement limité de  $f$  en 0.

**Exercice 4.6 (DL, exemple 3, fastidieux...)**

On définit  $f$  sur  $]0, \infty[$  par  $f(x) = \sqrt{\frac{\log(1+x)}{x}}$ .

1. Montrer que  $f$  admet une limite (finie) en 0, notée  $l$ . On pose dans la suite  $f(0) = l$ .
2. Donner un développement limité à l'ordre 3 en 0 de  $f$ .

**Exercice 4.7 (DL d'une fonction réciproque)**

On définit  $f$  sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2x + \sin x$ .

1. Montrer que  $f$  est une bijection de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , strictement croissante. On note, dans la suite,  $g$  sa fonction réciproque.
2. Montrer que  $f$  et  $g$  sont dérivables en tout point de  $\mathbb{R}$ .
3. Donner le développement limité à l'ordre 3 en 0 de  $g$ .

**Exercice 4.8 (Condition nécessaire et condition suffisante de minimalité)**

Soit  $f$  une application  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ .

1. On suppose que  $f$  est de classe  $C^1$  et que  $f$  admet un minimum local en  $a$ . Montrer que  $f'(a) = 0$ .
2. On suppose que  $f$  est de classe  $C^2$ ,  $f'(a) = 0$  et  $f''(a) > 0$ . Montrer que  $f$  admet un minimum local en  $a$ .
3. Donner un exemple pour lequel  $f$  est de classe  $C^2$ ,  $f'(a) = 0$ ,  $f''(a) = 0$  et  $f$  n'admet pas un minimum local en  $a$ .

**Exercice 4.9 (Equivalents)**

1. Soit  $\alpha > 0$ . Montrer que  $((1+x)^\alpha - 1) \sim \alpha x$  en 0.
2. Montrer que  $(1+x+x^2) \sim x^2$  en  $+\infty$ .
3. Soit  $f, g, h$  des applications de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ . On suppose que  $f \sim \lambda h$  et  $g \sim \mu h$  en 0 et que  $\lambda + \mu \neq 0$ . Montrer que  $(f+g) \sim (\lambda+\mu)h$  en 0. Donner un exemple où ce résultat est faux si  $\lambda + \mu = 0$ .

4. Soit  $f$  et  $g$  des applications de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f(x) > 0$  et  $g(x) > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f \sim g$  en 0 et  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$ . On pose  $h(x) = \ln(x)$  pour  $x > 0$ . Montrer que  $h \circ f \sim h \circ g$  en 0.
5. Soit  $f, g, h$  des applications de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f \sim h$  en 0 et que  $g = o(h)$  au voisinage de 0. Montrer que  $(f + g) \sim h$  en 0.

**Exercice 4.10 (Limite en 0)**

Trouver les limites en 0 des fonctions suivantes, définies sur  $\mathbb{R}^*$  :

$$f(x) = \frac{1}{x^2} \left( \frac{1}{1+x^2} - \cos(x) \right), \quad g(x) = \frac{\arctan(x) - x}{\sin(x) - x}, \quad h(x) = \frac{e^x - \cos(x) - \sin(x)}{x^2}.$$

**Exercice 4.11 (DL3)**

Calculer le DL3 en 0 de  $f$  définie pour  $x \in ]-1, 1[$  par  $f(x) = \sin(x) - \cos(x) + \tan(x) + \frac{1}{1-x}$ .  
Calculer le DL3 en  $\frac{\pi}{2}$  de  $f$  définie pour  $x \in ]0, \pi[$  par  $f(x) = \ln(\sin(x))$ .

**Exercice 4.12 (DL4)**

Donner le DL4 en 0 des fonctions suivantes (définies de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ ) :

$$f(x) = (1 + \sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{2}}, \quad g(x) = e^{\cos(x)}.$$

**Exercice 4.13 (DLn)**

On définit  $f$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  par :

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x}{e^x - 1} \text{ si } x \neq 0, \\ f(0) &= 1 \end{aligned} \tag{4.13}$$

Montrer que  $f$  est continue en 0 et admet un DLn en 0, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

**Exercice 4.14 (Equivalents)**

Soit  $f, g, \varphi, \psi$  définies pour tout  $x \in \mathbb{R}$  par  $f(x) = x^3 + 1$ ,  $g(x) = x^4 + 1$ ,  $\varphi(x) = x^3 - 3x$ ,  $\psi(x) = x^3$ .

1. Montrer que  $f \sim g$  en 0.
2. Montrer que  $\ln(f)$  et  $\ln(g)$  sont définies sur  $] -1, \infty[$  et que  $\ln(f) \not\sim \ln(g)$  en 0.
3. Montrer que  $\varphi \sim \psi$  en  $+\infty$ .
4. Montrer que  $e^\varphi \not\sim e^\psi$  en  $+\infty$ .

**Exercice 4.15 (Fonction indéfiniment dérivable et à support compact)**

On définit  $f$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  par :

$$\begin{aligned} f(x) &= 0, \text{ si } x \leq -1, \\ f(x) &= e^{\frac{1}{x^2-1}}, \text{ si } -1 < x < 1, \\ f(x) &= 0, \text{ si } x \geq 1. \end{aligned}$$

1. Montrer que  $f$  est continue en tout point de  $\mathbb{R}$
2. (a) Montrer que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $] -1, 1[$ .

(b) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Montrer qu'il existe deux polynômes  $p_n$  et  $q_n$  t.q.:

$$f^{(n)}(x) = \frac{p_n(x)}{q_n(x)} e^{\frac{1}{x^2-1}}, \text{ pour tout } -1 < x < 1.$$

(On ne demande de calculer  $p_n$  et  $q_n$  mais seulement de montrer leur existence.)

(c) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Montrer que  $\lim_{x \rightarrow 1, x < 1} f^{(n)}(x) = 0$ .

3. Montrer que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ . [On pourra utiliser le résultat suivant, vu en cours et en TD : Soit  $-\infty \leq b < a < c \leq \infty$  et  $g$  une application de  $]b, c[$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $g$  est dérivable pour tout  $x \in ]b, c[, x \neq a$ , et que  $g'$  (définie sur  $]b, c[\setminus \{a\}$ ) admet une limite en  $a$ , notée  $l$ . Alors,  $g$  est dérivable en  $a$  et  $g'(a) = l$ .]
4. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , donner le développement limité de  $f$ , à l'ordre  $n$ , au point 1.

#### Exercice 4.16 (Calcul de limites)

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $\alpha > 0$ . Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $f(x) = (x^2 + 1)^\alpha - (x^2 + 2)^\alpha$ .

1. Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  dans les cas simples suivants :  $\alpha = 2$ ,  $\alpha = 1$ ,  $\alpha = \frac{1}{2}$ .
2. Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  (en justifiant les calculs). [distinguer les cas  $0 < \alpha < 1$  et  $\alpha > 1$ .]

#### Exercice 4.17 (Dérivabilité d'un quotient, utilisation des développements limités)

Soit  $f, g$  deux fonctions de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , de classe  $C^1$  (c'est-à-dire dérivable en tout point de  $\mathbb{R}$  et de dérivée continue). On suppose que  $f(0) = g(0) = 0$  et  $g(x) \neq 0$  si  $x \neq 0$ . Pour tout  $x \neq 0$ , on peut donc définir  $h(x)$  en posant :

$$h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

1. On suppose, dans cette question, que, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sin x$  et  $g(x) = x^3$ . Montrer que  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = +\infty$ .  
Dans la suite de l'exercice on suppose qu'il existe  $a \in \mathbb{R}$  t.q.  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = a$  et on pose  $h(0) = a$ .
2. Montrer que  $h$  est une fonction continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , dérivable en tout point  $x$  de  $\mathbb{R}^*$ . Pour  $x \neq 0$ , donner  $h'(x)$  en fonction de  $f(x)$ ,  $g(x)$ ,  $f'(x)$  et  $g'(x)$ .
3. On suppose que  $g'(0) \neq 0$ . Montrer que  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \frac{f'(0)}{g'(0)}$  (et donc que  $a = \frac{f'(0)}{g'(0)}$ ).
4. On considère, dans cette question, les fonctions  $f$  et  $g$  suivantes :

$$f(x) = x + x^2, \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad g(x) = \begin{cases} x + x^2, & \text{si } x \geq 0, \\ x - x^2, & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Montrer que  $f$  et  $g$  sont bien de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$  et que  $g'(0) \neq 0$ . Donner la limite de  $h(x)$  quand  $x \rightarrow 0$ . Montrer que  $h$  n'est pas dérivable en 0.

5. On considère, dans cette question, les fonctions  $f$  et  $g$  suivantes (de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ ):

$$f(x) = \ln(1 + x^2), \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad g(x) = x(2 + \sin x), \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Donner la limite de  $h(x)$  quand  $x \rightarrow 0$ . Montrer que  $h$  est dérivable en 0 et que  $h$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

6. On suppose maintenant que  $f$  et  $g$  sont de classe  $C^2$  sur  $\mathbb{R}$  et que  $g'(0) \neq 0$ .
- Montrer que  $h$  est dérivable en 0 et calculer  $h'(0)$  en fonction de  $f'(0)$ ,  $g'(0)$ ,  $f''(0)$  et  $g''(0)$ .
  - Montrer que  $h'$  est continue en 0 et en déduire que  $h$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ .
7. On ne suppose plus que  $g'(0) \neq 0$  mais on suppose que  $f$  et  $g$  sont de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$  et qu'il existe  $n \geq 1$  t.q.  $g^{(n)}(0) \neq 0$  et, pour tout  $k < n$ ,  $g^{(k)}(0) = 0$ . (On suppose toujours que  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = a$ .)
- Montrer que  $f^{(k)}(0) = 0$  pour tout  $k < n$ .
  - Montrer que  $a = \frac{f^{(n)}(0)}{g^{(n)}(0)}$ .
  - Montrer que  $h$  est dérivable en 0 et calculer  $h'(0)$  en fonction de  $f^{(n)}(0)$ ,  $g^{(n)}(0)$ ,  $f^{(n+1)}(0)$  et  $g^{(n+1)}(0)$ .
  - Montrer que  $h'$  est continue en 0 et en déduire que  $h$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 4.18 (Développement limité curieux)**

On définit  $f$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  par:

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-\frac{1}{x^2}} \text{ si } x \neq 0, \\ f(0) &= 0. \end{aligned}$$

- Montrer que  $f$  est continue en 0.
- Soit  $q \in \mathbb{N}^*$ . Montrer que, pour tout  $u > 0$ ,  $e^u \geq \frac{u^q}{q!}$ .
- Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , montrer, en utilisant la question précédente, que  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 0$ . En déduire que  $f$  admet un développement limité d'ordre  $n$  en 0 et donner ce développement.

**Exercice 4.19 (Etude de la fonction  $x \mapsto x \arctan x$ )**

Etudier la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = x \arctan x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

[Montrer que  $f$  est paire. Calculer  $f'$  et  $f''$ . Etudier les asymptotes.]

**Exercice 4.20 (Etude d'une fonction (3))**

Soit  $a \in \mathbb{R}$ . Soit  $f$  la fonction définie de  $\mathbb{R}^*$  dans  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = a(1 + x^2)^{\frac{1}{x}} - \cos x$$

- Calculer en fonction de  $a$  la limite de  $f$  en 0. En déduire que  $f$  peut être prolongée par continuité sur  $\mathbb{R}$ .  
Dans la suite, on note de nouveau  $f$  ce prolongement à  $\mathbb{R}$ . On note  $C_f$  le graphe de  $f$ .
- Montrer que  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^*$ .
- Montrer que  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$  et préciser en fonction de  $a$  la dérivée de  $f$  en 0.

4. Donner la tangente à  $C_f$  en  $(0, f(0))$  et préciser en fonction de  $a$  la position locale de  $C_f$  par rapport à cette tangente.

**Exercice 4.21 (Maximum/minimum)**

1. Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ , et  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction.
- (a) On suppose dans cette question que  $f$  est deux fois dérivable et que pour tout  $x \in [a, b]$ ,  $f''(x) \leq 0$ . Montrer que pour tout  $x$ , on a  $f(x) \geq \min \{f(a), f(b)\}$ .
  - (b) On suppose maintenant que  $f$  est une seule fois dérivable et que  $f$  atteint son maximum en  $a$ . Montrer que  $f'(a) \leq 0$ . Donner un exemple de cette situation où on a  $f'(a) < 0$ .
2. Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction, et soit  $a$  un nombre réel.
- (a) On suppose que  $f$  est de classe  $C^4$ . Si  $f'(a) = f''(a) = f^{(3)}(a) = 0$  et  $f^{(4)}(a) \neq 0$ , montrer que  $f$  a un maximum ou minimum local en  $a$ .
  - (b) On suppose que  $f$  est de classe  $C^3$ . Si  $f'(a) = f''(a) = 0$  et  $f^{(3)}(a) \neq 0$ , montrer que  $f$  n'a ni maximum ni minimum local en  $a$ .
  - (c) On suppose que  $f$  est seulement continue et qu'elle tend vers  $+\infty$  lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$  ou  $-\infty$ . Montrer que  $f$  est minorée et qu'elle atteint sa borne inférieure.

**Exercice 4.22 (Limites)**

1. Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 2x + 2} + x, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 2x + 2} + x,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{\sin x - x}.$$

2. Calculer

$$l = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x+1}{x} \right)^x.$$

Donner un équivalent de  $l - \left( \frac{x+1}{x} \right)^x$  lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$ .

**Exercice 4.23 (Calcul approché de  $\sin(1)$ )**

Donner une valeur approchée de  $\sin(1)$  à  $10^{-6}$ -près, c'est-à-dire donner un nombre réel  $l$  tel que  $|\sin(1) - l| \leq 10^{-6}$ . [On pourra utiliser la formule de Taylor-Lagrange à un ordre convenable à déterminer ; on remarquera que le reste dans cette formule se borne facilement.]

**Exercice 4.24 (Quotient différentiel pour approcher  $f''$ )**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction et soit  $a$  un réel fixé. Pour  $h \neq 0$ , on pose

$$\Delta(h) = \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2}.$$

- 1. On suppose que  $f$  est de classe  $C^2$ . Montrer que  $\Delta(h)$  tend vers  $f''(a)$  lorsque  $h$  tend vers 0.
- 2. On suppose que  $f$  est de classe  $C^3$  et qu'il existe  $M \in \mathbb{R}$  t.q. pour tout réel  $x$ , on ait  $|f^{(3)}(x)| \leq M$ . Montrer que pour tout  $h \neq 0$ , on a

$$|\Delta(h) - f''(a)| \leq Mh/3.$$

## 4.8 Exercices corrigés

### Exercice 4.25 (Corrigé de l'exercice 4.1)

On définit  $f$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  par :

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-\frac{1}{x}}, \text{ si } x > 0, \\ f(x) &= 0, \text{ si } x \leq 0. \end{aligned}$$

1. Montrer que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $] -\infty, 0[$  et sur  $]0, \infty[$ .

—————  
corrigé  
—————

Sur  $] -\infty, 0[$ ,  $f$  est constante et est donc de classe  $C^\infty$ .

Sur  $]0, +\infty[$ ,  $f$  est de classe  $C^\infty$  car c'est la composée de la fonction  $x \mapsto -\frac{1}{x}$ , qui est de classe  $C^\infty$  sur  $]0, +\infty[$ , et de  $x \mapsto e^x$ , qui est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ .

2. Montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , il existe un polynôme  $p_n$  t.q.

$$f^{(n)}(x) = \frac{p_n(x)}{x^{2n}} e^{-\frac{1}{x}}, \text{ si } x > 0.$$

—————  
corrigé  
—————

On raisonne par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$ .

**Initialisation.** Pour  $n = 0$ , on a bien, pour  $x > 0$ ,  $f(x) = \frac{p_0(x)}{x^0} e^{-\frac{1}{x}}$  en prenant pour  $p_0$  le polynôme constant et égal à 1.

**Hérédité.** Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On suppose qu'il existe un polynôme  $p_n$  t.q.

$$f^{(n)}(x) = \frac{p_n(x)}{x^{2n}} e^{-\frac{1}{x}}, \text{ si } x > 0.$$

On a alors, pour  $x > 0$  :

$$f^{(n+1)}(x) = \left( \frac{p_n'(x)}{x^{2n}} - 2n \frac{p_n(x)}{x^{2n+1}} + \frac{1}{x^2} \frac{p_n(x)}{x^{2n}} \right) e^{-\frac{1}{x}}.$$

On en déduit que  $f^{(n+1)}(x) = \frac{p_{n+1}(x)}{x^{2(n+1)}} e^{-\frac{1}{x}}$ , avec  $p_{n+1}(x) = x^2 p_n'(x) - 2n x p_n(x) + p_n(x)$ . La fonction  $p_{n+1}$  est bien un polynôme (car  $p_n$  et  $p_n'$  sont des polynômes).

On a bien ainsi montré, par récurrence sur  $n$ , que  $f^{(n)}$  a, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , la forme demandée.

3. Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

(a) Soit  $p \in \mathbb{Z}$ , Montrer que :

$$\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^p} = 0.$$

[On rappelle que  $e^u \geq \frac{u^q}{q!}$  pour tout  $u > 0$  et tout  $q \in \mathbb{N}$ .]

—————  
corrigé  
—————

On démontre tout d'abord le rappel. Soit  $q \in \mathbb{N}$  et  $u > 0$ . La formule de Taylor-Lagrange (formule (4.1)) donne qu'il existe  $c \in ]0, u[$  t.q. :

$$e^u = \sum_{k=0}^q \frac{u^k}{k!} + \frac{u^{q+1}}{(q+1)!} e^c.$$

Comme tous les termes du membre de droite de cette égalité sont positifs, on en déduit que  $e^u \geq \frac{u^q}{q!}$ .

Pour montrer que  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^p} = 0$  (noter que  $p \in \mathbb{Z}$ ) on distingue deux cas.

**cas 1.** On suppose  $p \leq 0$ . Dans ce cas, il est immédiat que  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^p} = 0$ .

**Cas 2.** On suppose  $p > 0$ . Pour  $x > 0$ , on utilise alors l'inégalité  $e^u \geq \frac{u^q}{q!}$  avec  $q = p + 1$  et  $u = \frac{1}{x}$ . On obtient  $(p+1)! e^{\frac{1}{x}} \geq x^{-(p+1)}$  et donc :

$$0 \leq \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^p} \leq (p+1)! x, \text{ pour tout } x > 0.$$

On en déduit que  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^p} = 0$ .

(b) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow 0} f^{(n)}(x) = 0$ .

————— **corrigé** —————

On a  $\lim_{x \rightarrow 0, x < 0} f^{(n)}(x) = 0$  (car  $f^{(n)}(x) = 0$  si  $x < 0$ ). On a aussi  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} f^{(n)}(x) = 0$  car, pour  $x > 0$  on a :

$$f^{(n)}(x) = \frac{p_n(x)}{x^{2n}} e^{-\frac{1}{x}},$$

et on a  $\lim_{x \rightarrow 0} p_n(x) = p_n(0) \in \mathbb{R}$  et, d'après la question 3(a),  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^{2n}} = 0$ .

4. Montrer que  $f$  est de classe  $C^\infty$  (sur  $\mathbb{R}$ ).

————— **corrigé** —————

On sait déjà (question 1) que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}^*$ . Pour montrer que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ , il suffit, d'après la question 2 de l'exercice 3.11, de montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f^{(n)}(x)$  a une limite (dans  $\mathbb{R}$ ) en 0. Ceci a été démontré dans la question précédente. L'exercice 3.11 donne donc que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ . Cette question montre aussi que  $f^{(n)}(0) = 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

5. Montrer que  $f$  n'est pas analytique.

————— **corrigé** —————

La fonction  $f$  n'est pas analytique car  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) = 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  alors que  $f(x) \neq 0$  pour tout  $x > 0$ . Pour tout  $x > 0$ ,  $f(x)$  est donc différent de  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0)$ .

### Exercice 4.26 (Corrigé de l'exercice 4.8)

Soit  $f$  une application  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R}$ .

1. On suppose que  $f$  est de classe  $C^1$  et que  $f$  admet un minimum local en  $a$ . Montrer que  $f'(a) = 0$ .  


---

**corrigé**

---

Comme  $f$  admet un minimum local en  $a$ , il existe  $\gamma > 0$  t.q. :

$$|h| \leq \gamma \Rightarrow f(a+h) \geq f(a).$$

On remarque maintenant que  $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ . Or, pour  $0 < h < \gamma$ , on a  $f(a+h) \geq f(a)$  et donc  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq 0$ . On en déduit, en faisant tendre  $h$  vers 0 :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0, h > 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq 0.$$

De même, pour pour  $-\gamma < h < 0$ , on a  $f(a+h) \geq f(a)$  et donc  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq 0$ . On en déduit, en faisant tendre  $h$  vers 0 :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0, h < 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq 0.$$

Finalement, on a bien montré que  $f'(a) = 0$ .  


---

2. On suppose que  $f$  est de classe  $C^2$ ,  $f'(a) = 0$  et  $f''(a) > 0$ . Montrer que  $f$  admet un minimum local en  $a$ .  


---

**corrigé**

---

Comme  $f''(a) > 0$  et que  $f''$  est continue, il existe  $\gamma > 0$  t.q. :

$$|x - a| \leq \gamma \Rightarrow f''(x) > 0.$$

(En effet, en prenant  $\varepsilon = \frac{1}{2}f''(a)$ , la continuité de  $f''$  en  $a$  donne l'existence de  $\gamma > 0$  t.q.  $|x - a| \leq \gamma$  implique  $|f''(x) - f''(a)| \leq \frac{1}{2}f''(a)$  et donc  $f''(x) \geq \frac{1}{2}f''(a) > 0$ .)

Soit maintenant  $h \neq 0$  t.q.  $|h| \leq \gamma$ . La formule de Taylor-Lagrange (formule (4.1)) donne l'existence de  $x$  (strictement) entre  $a$  et  $a+h$  t.q. :

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2}{2}f''(x).$$

Comme  $f'(a) = 0$  et  $f''(x) > 0$  (car  $|x - a| < |h| \leq \gamma$ ), on a donc  $f(a+h) > f(a)$ . On a donc montré l'existence de  $\gamma > 0$  t.q. :

$$|h| \leq \gamma \Rightarrow f(a+h) \geq f(a).$$

Ceci prouve que  $f$  admet un minimum local en  $a$ .  


---

3. Donner un exemple pour lequel  $f$  est de classe  $C^2$ ,  $f'(a) = 0$ ,  $f''(a) = 0$  et  $f$  n'admet pas un minimum local en  $a$ .  


---

**corrigé**

---

On prend  $a = 0$  et  $f(x) = x^3$ . On a bien  $f$  de classe  $C^2$ ,  $f'(0) = f''(0) = 0$  et  $f$  n'admet pas un minimum local en 0 (car  $f(x) < f(0)$  pour tout  $x < 0$ ).  


---

**Exercice 4.27 (Corrigé de l'exercice 4.16)**

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $\alpha > 0$ . Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $f(x) = (x^2 + 1)^\alpha - (x^2 + 2)^\alpha$ .

1. Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  dans les cas simples suivants :  $\alpha = 2$ ,  $\alpha = 1$ ,  $\alpha = \frac{1}{2}$ .

—————  
corrigé  
—————

- Cas  $\alpha = 2$ . Dans ce cas, on a  $f(x) = 2x^2 + 1 - 4x^2 - 4 = -2x^2 - 3$  et donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ .
- Cas  $\alpha = 1$ . Dans ce cas, on a  $f(x) = -1$  et donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$ .
- Cas  $\alpha = \frac{1}{2}$ . Dans ce cas, on a :

$$f(x) = \frac{((x^2 + 1)^{\frac{1}{2}} - (x^2 + 2)^{\frac{1}{2}})((x^2 + 1)^{\frac{1}{2}} + (x^2 + 2)^{\frac{1}{2}})}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}} + (x^2 + 2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{-1}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}} + (x^2 + 2)^{\frac{1}{2}}}.$$

On en déduit que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

2. Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  (en justifiant les calculs). [distinguer les cas  $0 < \alpha < 1$  et  $\alpha > 1$ .]

—————  
corrigé  
—————

Pour  $u > -1$ , on pose  $\varphi(u) = (1 + u)^\alpha$ . Pour  $x > 0$ , on a donc  $f(x) = x^{2\alpha}(\varphi(\frac{1}{x^2}) - \varphi(\frac{2}{x^2}))$ .

La fonction  $\varphi$  est de classe  $C^\infty$  sur l'ensemble  $] -1, +\infty[$  et on a  $\varphi'(u) = \alpha(1 + u)^{\alpha-1}$  pour tout  $u > -1$ . Le DL1 de  $\varphi$  en 0 est donc :

$$\varphi(u) = 1 + \alpha u + u\varepsilon(u), \text{ pour tout } u > -1,$$

avec  $\lim_{u \rightarrow 0} \varepsilon(u) = 0$ . On a donc, pour tout  $x > 0$  :

$$f(x) = x^{2\alpha} \left( \frac{\alpha}{x^2} + \frac{1}{x^2} \varepsilon\left(\frac{1}{x^2}\right) - \frac{2\alpha}{x^2} - \frac{2}{x^2} \varepsilon\left(\frac{2}{x^2}\right) \right) = x^{2\alpha} \left( -\frac{\alpha}{x^2} + \frac{1}{x^2} \eta(x) \right),$$

avec  $\eta(x) = \varepsilon(\frac{1}{x^2}) - 2\varepsilon(\frac{2}{x^2})$  et donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \eta(x) = 0$  (car  $\lim_{u \rightarrow 0} \varepsilon(u) = 0$ ). On en déduit :

$$f(x) = x^{2(\alpha-1)}(-\alpha + \eta(x)).$$

Comme  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-\alpha + \eta(x)) = -\alpha$ , on a donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$  si  $\alpha > 1$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  si  $0 < \alpha < 1$ .

**Exercice 4.28 (Corrigé de l'exercice 4.17)**

Soit  $f, g$  deux fonctions de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , de classe  $C^1$  (c'est-à-dire dérivable en tout point de  $\mathbb{R}$  et de dérivée continue). On suppose que  $f(0) = g(0) = 0$  et  $g(x) \neq 0$  si  $x \neq 0$ . Pour tout  $x \neq 0$ , on peut donc définir  $h(x)$  en posant :

$$h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

1. On suppose, dans cette question, que, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sin x$  et  $g(x) = x^3$ . Montrer que  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = +\infty$ .

—————  
corrigé  
—————

Le DL1 de  $f$  en 0 est  $f(x) = x + x\varepsilon(x)$ , avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$ . On a donc, pour  $x \neq 0$ ,  $h(x) = \frac{1 + \varepsilon(x)}{x^2}$ . On en déduit bien que  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = +\infty$ .

Dans la suite de l'exercice on suppose qu'il existe  $a \in \mathbb{R}$  t.q.  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = a$  et on pose  $h(0) = a$ .

2. Montrer que  $h$  est une fonction continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , dérivable en tout point  $x$  de  $\mathbb{R}^*$ . Pour  $x \neq 0$ , donner  $h'(x)$  en fonction de  $f(x)$ ,  $g(x)$ ,  $f'(x)$  et  $g'(x)$ .

—————  
corrigé

La fonction  $h$  est le quotient de deux fonctions de classe  $C^1$ . Comme la fonction au dénominateur ne s'annule pas sur  $\mathbb{R}^*$ , la fonction  $h$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^*$  et on a :

$$h'(x) = \frac{g(x)f'(x) - g'(x)f(x)}{g^2(x)} \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}^*.$$

La fonction  $h$  est continue sur  $\mathbb{R}^*$ . D'autre part, elle est aussi continue en 0 car  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = a = h(0)$ . Elle est donc continue sur  $\mathbb{R}$ .

3. On suppose que  $g'(0) \neq 0$ . Montrer que  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \frac{f'(0)}{g'(0)}$  (et donc que  $a = \frac{f'(0)}{g'(0)}$ ).

—————  
corrigé

Les *DL1* de  $f$  et  $g$  en 0 donnent  $f(x) = xf'(0) + x\varepsilon_1(x)$  et  $g(x) = xg'(0) + x\varepsilon_2(x)$  avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_i(x) = 0$ , pour  $i = 1, 2$ . On a donc, pour  $x \neq 0$ ,  $h(x) = \frac{f'(0) + \varepsilon_1(x)}{g'(0) + \varepsilon_2(x)}$ . On en déduit bien que  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \frac{f'(0)}{g'(0)}$  (on vient ainsi de redémontrer un cas particulier de la règle de l'Hôpital).

4. On considère, dans cette question, les fonctions  $f$  et  $g$  suivantes :

$$f(x) = x + x^2, \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad g(x) = \begin{cases} x + x^2, & \text{si } x \geq 0, \\ x - x^2, & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Montrer que  $f$  et  $g$  sont bien de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$  et que  $g'(0) \neq 0$ . Donner la limite de  $h(x)$  quand  $x \rightarrow 0$ . Montrer que  $h$  n'est pas dérivable en 0.

—————  
corrigé

La fonction  $f$  étant un polynôme, elle est de classe  $C^1$  (et même de classe  $C^\infty$ ) sur  $\mathbb{R}$ . De même, la fonction  $g$  est de classe  $C^1$  (et même de classe  $C^\infty$ ) sur  $\mathbb{R}_+^*$  et sur  $\mathbb{R}_-^*$  (car c'est un polynôme sur  $\mathbb{R}_+^*$  et sur  $\mathbb{R}_-^*$ ). Pour montrer que  $g$  est dérivable en 0 on remarque que

$$\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0, x > 0} 1 + x = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0, x < 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0, x < 0} 1 - x = 1.$$

On en déduit bien que  $g$  est dérivable en 0 et que  $g'(0) = 1$ . Enfin, on a  $g'$  continue en 0 car  $g'(x) = 1 + 2|x|$  pour  $x \neq 0$  et donc  $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = g'(0)$ . La fonction  $g$  est donc de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

On a  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 1$  et donc  $h(0) = 1$ . Pour  $x \neq 0$ , on a  $h(x) - h(0) = h(x) - 1 = \frac{f(x) - g(x)}{g(x)}$ . On a donc  $h(x) - 1 = 0$  si  $x > 0$  et  $h(x) - 1 = \frac{2x}{1-x}$  si  $x < 0$ . On en déduit :

$$\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} \frac{h(x) - 1}{x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0, x < 0} \frac{h(x) - 1}{x} = 2.$$

Ce qui prouve que  $h$  n'est pas dérivable en 0.

5. On considère, dans cette question, les fonctions  $f$  et  $g$  suivantes (de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ ):

$$f(x) = \ln(1 + x^2), \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad g(x) = x(2 + \sin x), \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Donner la limite de  $h(x)$  quand  $x \rightarrow 0$ . Montrer que  $h$  est dérivable en 0 et que  $h$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

————— **corrigé** —————

Le *DL1* en 0 de la fonction  $u \mapsto \ln(1 + u)$  (définie sur  $] -1, +\infty[$ ) est  $\ln(1 + u) = u + u\varepsilon_1(u)$  avec  $\lim_{u \rightarrow 0} \varepsilon_1(u) = 0$ . On a donc  $f(x) = x^2 + x^2\varepsilon_2(x)$  avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_2(x) = 0$  (car  $\varepsilon_2(x) = \varepsilon_1(x^2)$ ). Ceci donne :

$$h(x) = \frac{x + x\varepsilon_2(x)}{2 + \sin(x)} \text{ pour tout } x \neq 0.$$

On en déduit que  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0$  et donc  $h(0) = 0$ .

On remarque maintenant que  $\frac{h(x)}{x} = \frac{1 + \varepsilon_2(x)}{2 + \sin(x)}$  et donc  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x)}{x} = \frac{1}{2}$ . Ceci montre que  $h$  est dérivable en 0 et  $h'(0) = \frac{1}{2}$ .

On sait déjà que  $h$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^*$  (voir la question 2). Pour montrer que  $h$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ , il suffit donc de montrer que  $h'$  est continue en 0, c'est-à-dire que  $\lim_{x \rightarrow 0} h'(x) = \frac{1}{2}$ . Pour  $x \neq 0$ , on a :

$$h'(x) = \frac{g(x)f'(x) - g'(x)f(x)}{g^2(x)} = \frac{1}{g^2(x)}(g(x)f'(x) - g'(x)f(x)).$$

Or  $g(x)f'(x) - g'(x)f(x) = \frac{2x^2(2 + \sin x)}{1 + x^2} - (x^2 + x^2\varepsilon_2(x))(2 + \sin x + x \cos x)$  et donc :

$$h'(x) = \frac{1}{(2 + \sin x)^2} \left( \frac{2(2 + \sin x)}{1 + x^2} - (1 + \varepsilon_2(x))(2 + \sin x + x \cos x) \right).$$

Ce qui donne  $\lim_{x \rightarrow 0} h'(x) = \frac{1}{4}(4 - 2) = \frac{1}{2}$  et montre la continuité de  $h'$  en 0.

6. On suppose maintenant que  $f$  et  $g$  sont de classe  $C^2$  sur  $\mathbb{R}$  et que  $g'(0) \neq 0$ .

(a) Montrer que  $h$  est dérivable en 0 et calculer  $h'(0)$  en fonction de  $f'(0)$ ,  $g'(0)$ ,  $f''(0)$  et  $g''(0)$ .

————— **corrigé** —————

Pour  $x \neq 0$ , on pose  $\varphi(x) = \frac{1}{x}(h(x) - h(0))$ . Comme  $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$  et  $h(0) = \frac{f'(0)}{g'(0)}$  on a donc :

$$\varphi(x) = \frac{1}{xg(x)g'(0)} (f(x)g'(0) - g(x)f'(0)) \text{ pour tout } x \neq 0.$$

Les *DL1* et *DL2* en 0 de  $g$  et le *DL2* en 0 de  $f$  donnent :

$$g(x) = xg'(0) + x\varepsilon_1(x), \quad g(x) = xg'(0) + \frac{x^2}{2}g''(0) + x^2\varepsilon_2(x), \quad f(x) = xf'(0) + \frac{x^2}{2}f''(0) + x^2\varepsilon_3(x),$$

avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_i(x) = 0$ , pour  $i = 1, 2, 3$ . On a donc, pour  $x \neq 0$ ,

$$\varphi(x) = \frac{1}{(g'(0) + \varepsilon_1(x))g'(0)} \left( \left( \frac{f''(0)}{2} + \varepsilon_3(x) \right) g'(0) - \left( \frac{g''(0)}{2} + \varepsilon_2(x) \right) f'(0) \right).$$

On en déduit que  $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = \frac{f''(0)g'(0) - g''(0)f'(0)}{2(g'(0))^2}$  et donc que  $h$  est dérivable en 0 et :

$$h'(0) = \frac{f''(0)g'(0) - g''(0)f'(0)}{2(g'(0))^2}.$$

(b) Montrer que  $h'$  est continue en 0 et en déduire que  $h$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

**corrigé**

Comme à la question 5, on sait déjà que  $h$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^*$  (question 2). Pour montrer que  $h$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ , il suffit donc de montrer que  $h'$  est continue en 0. Pour  $x \neq 0$ , on a :

$$h'(x) = \frac{g(x)f'(x) - g'(x)f(x)}{g^2(x)} = \frac{1}{g^2(x)}(g(x)f'(x) - g'(x)f(x)).$$

On utilise les *DL* de  $f$  et  $g$  écrits en (a), et les *DL1* en 0 de  $f'$  et  $g'$ , c'est-à-dire  $f'(x) = f'(0) + x f''(0) + x \varepsilon_4(x)$  et  $g'(x) = g'(0) + x g''(0) + x \varepsilon_5(x)$  avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_i(x) = 0$ , pour  $i = 4, 5$ . On obtient :

$$g(x)f'(x) = (xg'(0) + \frac{x^2 g''(0)}{2} + x^2 \varepsilon_2(x))(f'(0) + x f''(0) + x \varepsilon_4(x))$$

et

$$g'(x)f(x) = (g'(0) + x g''(0) + x \varepsilon_5(x))(x f'(0) + \frac{x^2 f''(0)}{2} + x^2 \varepsilon_3(x)).$$

On en déduit :

$$g(x)f'(x) - g'(x)f(x) = \frac{x^2}{2}(g'(0)f''(0) - g''(0)f'(0)) + x^2 \varepsilon_6(x),$$

avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_6(x) = 0$ . Ceci donne :

$$h'(x) = \frac{1}{(g'(0) + \varepsilon_1(x))^2} \left( \frac{g'(0)f''(0) - g''(0)f'(0)}{2} + \varepsilon_6(x) \right),$$

et donc  $\lim_{x \rightarrow 0} h'(x) = \frac{g'(0)f''(0) - g''(0)f'(0)}{2(g'(0))^2} = h'(0)$ . La fonction  $h'$  est donc bien continue en 0 et on en déduit que  $h$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

7. On ne suppose plus que  $g'(0) \neq 0$  mais on suppose que  $f$  et  $g$  sont de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$  et qu'il existe  $n \geq 1$  t.q.  $g^{(n)}(0) \neq 0$  et, pour tout  $k < n$ ,  $g^{(k)}(0) = 0$ . (On suppose toujours que  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = a$ .)

(a) Montrer que  $f^{(k)}(0) = 0$  pour tout  $k < n$ .

**corrigé**

On raisonne par l'absurde. On suppose qu'il existe  $k < n$  t.q.  $f^{(k)}(0) \neq 0$ . On pose alors  $l = \min\{k \in \mathbb{N} \text{ t.q. } f^{(k)}(0) \neq 0\}$ . On a donc  $1 \leq l < n$ ,  $f^{(l)}(0) \neq 0$  et  $f^{(k)}(0) = 0$  pour  $k < l$ . Le *DL1* en 0 de  $f$  et le *DLn* en 0 de  $g$  donnent :

$$f(x) = \frac{x^l}{l!} f^{(l)}(0) + x^l \eta_1(x), \quad g(x) = \frac{x^n}{n!} g^{(n)}(0) + x^n \eta_2(x),$$

avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \eta_i(x) = 0$ , pour  $i = 1, 2$ . On en déduit, pour  $x \neq 0$ ,

$$h(x) = \frac{\frac{x^l}{l!} f^{(l)}(0) + x^l \eta_1(x)}{\frac{x^n}{n!} g^{(n)}(0) + x^n \eta_2(x)} = x^{l-n} \frac{\frac{1}{l!} f^{(l)}(0) + \eta_1(x)}{\frac{1}{n!} g^{(n)}(0) + \eta_2(x)}.$$

Comme  $l < n$ ,  $f^{(l)}(0) \neq 0$  et  $g^{(n)}(0) \neq 0$ , on en déduit que  $\lim_{x \rightarrow 0} |h(x)| = +\infty$ , en contradiction avec le fait que  $\lim_{x \rightarrow 0} |h(x)| = |a| \in \mathbb{R}$ . On a donc bien montré, par contradiction, que  $f^{(k)}(0) = 0$  pour tout  $k < n$ .

(b) Montrer que  $a = \frac{f^{(n)}(0)}{g^{(n)}(0)}$ .

**corrigé**

Les  $DL_n$  de  $f$  et  $g$  en 0 donnent  $g(x) = \frac{x^n}{n!} g^{(n)}(0) + x^n \eta_2(x)$  et  $f(x) = \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(0) + x^n \eta_3(x)$  avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \eta_i(x) = 0$ , pour  $i = 2, 3$ . On a donc, pour  $x \neq 0$  :

$$h(x) = \frac{f^{(n)}(0) + n! \eta_3(x)}{g^{(n)}(0) + n! \eta_2(x)}.$$

On en déduit que  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \frac{f^{(n)}(0)}{g^{(n)}(0)}$  et donc que  $a = \frac{f^{(n)}(0)}{g^{(n)}(0)}$ .

(c) Montrer que  $h$  est dérivable en 0 et calculer  $h'(0)$  en fonction de  $f^{(n)}(0)$ ,  $g^{(n)}(0)$ ,  $f^{(n+1)}(0)$  et  $g^{(n+1)}(0)$ .

**corrigé**

On reprend la méthode de la question 6(a). Pour  $x \neq 0$ , on pose  $\varphi(x) = \frac{1}{x}(h(x) - h(0))$ . Comme  $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$  et  $h(0) = \frac{f^{(n)}(0)}{g^{(n)}(0)}$  on a donc :

$$\varphi(x) = \frac{1}{xg(x)g^{(n)}(0)} \left( f(x)g^{(n)}(0) - g(x)f^{(n)}(0) \right) \text{ pour tout } x \neq 0.$$

Les  $DL_n$  et  $DL(n+1)$  en 0 de  $g$  et le  $DL(n+1)$  en 0 de  $f$  donnent :

$$g(x) = \frac{x^n}{n!} g^{(n)}(0) + x^n \eta_4(x), \quad g(x) = \frac{x^n}{n!} g^{(n)}(0) + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} g^{(n+1)}(0) + x^{n+1} \eta_5(x),$$

$$f(x) = \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(0) + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(0) + x^{n+1} \eta_6(x),$$

avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \eta_i(x) = 0$ , pour  $i = 4, 5, 6$ . On a donc, pour  $x \neq 0$ ,

$$\varphi(x) = \frac{1}{\left(\frac{g^{(n)}(0)}{n!} + \eta_4(x)\right)g^{(n)}(0)} \left( \left(\frac{f^{(n+1)}(0)}{(n+1)!} + \eta_6(x)\right)g^{(n)}(0) - \left(\frac{g^{(n+1)}(0)}{(n+1)!} + \eta_5(x)\right)f^{(n)}(0) \right).$$

On en déduit que  $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = \frac{f^{(n+1)}(0)g^{(n)}(0) - g^{(n+1)}(0)f^{(n)}(0)}{(n+1)(g^{(n)}(0))^2}$  et donc que  $h$  est dérivable en 0 et :

$$h'(0) = \frac{f^{(n+1)}(0)g^{(n)}(0) - g^{(n+1)}(0)f^{(n)}(0)}{(n+1)(g^{(n)}(0))^2}.$$

(d) Montrer que  $h'$  est continue en 0 et en déduire que  $h$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

corrigé

On reprend la méthode de la question 6(b). Comme à la question 5, on sait déjà que  $h$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^*$  (question 2). Pour montrer que  $h$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ , il suffit donc de montrer que  $h'$  est continue en 0. Pour  $x \neq 0$ , on a :

$$h'(x) = \frac{g(x)f'(x) - g'(x)f(x)}{g^2(x)} = \frac{1}{g^2(x)}(g(x)f'(x) - g'(x)f(x)).$$

On utilise les *DL* de  $f$  et  $g$  écrits en (c), et les *DLn* en 0 de  $f'$  et  $g'$ , c'est-à-dire  $f'(x) = \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n)}(0) + \frac{x^n}{n!}f^{(n+1)}(0) + x^n\eta_7(x)$  et  $g'(x) = \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}g^{(n)}(0) + \frac{x^n}{n!}g^{(n+1)}(0) + x^n\eta_8(x)$  avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \eta_i(x) = 0$ , pour  $i = 7, 8$ . On obtient :

$$g(x)f'(x) = \left(\frac{x^n}{n!}g^{(n)}(0) + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}g^{(n+1)}(0) + x^{n+1}\eta_5(x)\right)\left(\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n)}(0) + \frac{x^n}{n!}f^{(n+1)}(0) + x^n\eta_7(x)\right)$$

et

$$g'(x)f(x) = \left(\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}g^{(n)}(0) + \frac{x^n}{n!}g^{(n+1)}(0) + x^n\eta_8(x)\right)\left(\frac{x^n}{n!}f^{(n)}(0) + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(0) + x^{n+1}\eta_6(x)\right).$$

On en déduit, en remarquant que  $\frac{1}{n!n!} - \frac{1}{(n+1)!(n-1)!} = \frac{1}{n!(n+1)!}$  :

$$g(x)f'(x) - g'(x)f(x) = \frac{x^{2n}}{n!(n+1)!}(g^{(n)}(0)f^{(n+1)}(0) - g^{(n+1)}(0)f^{(n)}(0)) + x^{2n}\eta_9(x),$$

avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \eta_9(x) = 0$ . Ceci donne (avec  $\eta_4$  définie en (c)) :

$$h'(x) = \frac{1}{(g^{(n)}(0) + n!\eta_4(x))^2} \left( \frac{g^{(n)}(0)f^{(n+1)}(0) - g^{(n+1)}(0)f^{(n)}(0)}{n+1} + (n!)^2\eta_9(x) \right),$$

et donc  $\lim_{x \rightarrow 0} h'(x) = \frac{g^{(n)}(0)f^{(n+1)}(0) - g^{(n+1)}(0)f^{(n)}(0)}{(n+1)(g^{(n)}(0))^2} = h'(0)$ . La fonction  $h'$  est donc bien continue en 0 et on en déduit que  $h$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ .

#### Exercice 4.29 (Limite en $+\infty$ )

Pour  $x > 0$  on pose  $f(x) = x^2(e^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{1}{x+1}})$ . Déterminer  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ . [On pourra, sur une fonction convenable, utiliser un développement limité ou le théorème des accroissements finis.]

corrigé

Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ . le théorème des accroissements finis appliqué à la fonction  $y \mapsto e^y$  donne l'existence de  $c \in ]a, b[$  t.q.  $e^b - e^a = (b - a)e^c$ .

Pour tout  $x > 0$ , en prenant  $a = \frac{1}{x+1}$  et  $b = \frac{1}{x}$ , il existe donc  $c_x \in ]\frac{1}{x+1}, \frac{1}{x}[$  t.q. :

$$f(x) = x^2(e^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{1}{x+1}}) = x^2\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right)e^{c_x} = \frac{x^2}{x(x+1)}e^{c_x}.$$

On a  $\lim_{x \rightarrow \infty} c_x = 0$  (car  $c_x \in ]\frac{1}{x+1}, \frac{1}{x}[$  et donc  $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{c_x} = 1$ ).

On a aussi  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x(x+1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1+\frac{1}{x}} = 1$ . On en déduit que  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$ .

**Exercice 4.30 (Sur le Théorème des Accroissements Finis (TAF))**

Rappel (TAF) : Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue sur  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$ . Alors, pour tout  $h \in ]0, b - a[$ , il existe  $\theta \in ]0, 1[$  t.q. :

$$f(a + h) - f(a) = hf'(a + \theta h). \quad (4.14)$$

1. Dans les quatre cas suivants, montrer que, pour tout  $h \in ]0, b - a[$ , il existe un *unique*  $\theta$  vérifiant (4.14) (les valeurs de  $a$  et  $b$  étant fixés). On note  $\theta_h$  cette valeur de  $\theta$ . Calculer  $\theta_h$  (en fonction de  $a$  et  $h$ ) et déterminer  $\lim_{h \rightarrow 0, h > 0} \theta_h$ .

- (a)  $0 < a < b < \infty$  et  $f(x) = \frac{1}{x}$  pour  $x \in [a, b]$ .

—————  
**corrigé**  
—————

Soit  $\theta \in ]0, 1[$  vérifiant (4.14) (l'existence d'au moins un  $\theta$  est donnée par le TAF, on veut montrer ici son unicité et on cherche la limite de  $\theta$  quand  $h \rightarrow 0, h > 0$ ). La relation (4.14) donne :

$$\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a} = hf'(a + \theta h) = \frac{-h}{(a + \theta h)^2},$$

et donc  $(a + \theta h)^2 = a(a + h)$ , ce qui donne :

$$\theta = \frac{\sqrt{a(a+h)} - a}{h}.$$

Ceci prouve bien l'unicité de  $\theta$ . En posant, pour  $y > -a$ ,  $\varphi(y) = \sqrt{a(a+y)}$ , on a aussi  $\theta_h = \frac{\sqrt{a(a+h)} - a}{h} = \frac{\varphi(h) - \varphi(0)}{h}$  et donc :

$$\lim_{h \rightarrow 0, h > 0} \theta_h = \varphi'(0) = \frac{1}{2}.$$

- (b)  $0 < a < b < \infty$  et  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$  pour  $x \in [a, b]$ .

—————  
**corrigé**  
—————

Soit  $\theta \in ]0, 1[$  vérifiant (4.14). La relation (4.14) donne :

$$\frac{1}{\sqrt{a+h}} - \frac{1}{\sqrt{a}} = hf'(a + \theta h) = \frac{-h}{2(a + \theta h)^{\frac{3}{2}}}.$$

On trouve donc ici

$$\theta = \frac{1}{h} \left[ \left( \frac{h}{2} \frac{\sqrt{a}\sqrt{a+h}}{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}} \right)^{\frac{2}{3}} - a \right].$$

Ceci prouve bien l'unicité de  $\theta$ .

Pour trouver la limite quand  $h$  tend vers 0, avec  $h > 0$ , de  $\theta_h$ , on peut utiliser des DL en  $a$  et la formule

$$\frac{1}{\sqrt{a+h}} - \frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{-h}{2(a + \theta_h h)^{\frac{3}{2}}}. \quad (4.15)$$

En effet, on a, en faisant un DL2 en  $a$  de  $y \mapsto \frac{1}{\sqrt{y}}$  et un DL1 en  $a$  de  $y \mapsto \frac{1}{y^{\frac{3}{2}}}$  :

$$\frac{1}{\sqrt{a+h}} - \frac{1}{\sqrt{a}} = -\frac{1}{2a^{\frac{3}{2}}}h + \frac{3}{8a^{\frac{5}{2}}}h^2 + h^2\varepsilon_1(h) \text{ avec } \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon_1(h) = 0,$$

$$\frac{1}{(a + \bar{h})^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{a^{\frac{3}{2}}} - \frac{3}{2a^{\frac{5}{2}}}\bar{h} + \bar{h}\varepsilon_2(\bar{h}) \text{ avec } \lim_{\bar{h} \rightarrow 0} \varepsilon_2(\bar{h}) = 0,$$

ce qui donne aussi, comme  $\theta_h \in ]0, 1[$ ,

$$\frac{1}{(a + \theta_h h)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{a^{\frac{3}{2}}} - \frac{3}{2a^{\frac{5}{2}}}\theta_h h + h\varepsilon_3(h) \text{ avec } \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon_3(h) = 0.$$

En portant ces relations dans (4.15), on obtient :

$$-\frac{1}{2a^{\frac{3}{2}}}h + \frac{3}{8a^{\frac{5}{2}}}h^2 + h^2\varepsilon_1(h) = \frac{-h}{2} \left( \frac{1}{a^{\frac{3}{2}}} - \frac{3}{2a^{\frac{5}{2}}}\theta_h h + h\varepsilon_3(h) \right),$$

ce qui donne, en divisant par  $h^2$  :

$$\frac{3}{4a^{\frac{5}{2}}}\left(\frac{1}{2} - \theta_h\right) = -\varepsilon_1(h) - \frac{\varepsilon_3(h)}{2},$$

et donc  $\lim_{h \rightarrow 0, h > 0} \theta_h = \frac{1}{2}$ . Cette question était plus difficile. . .

(c)  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f(x) = e^x$  pour  $x \in [a, b]$ .

**corrigé**

Soit  $\theta \in ]0, 1[$  vérifiant (4.14). La relation (4.14) donne :

$$e^a(e^h - 1) = e^{a+h} - e^a = hf'(a + \theta h) = he^{a+\theta h} = he^a e^{\theta h}.$$

On a donc  $e^{\theta h} = \frac{e^h - 1}{h}$ , ce qui donne

$$\theta = \frac{1}{h} \ln\left(\frac{e^h - 1}{h}\right).$$

Ceci prouve bien l'unicité de  $\theta$ . On utilise maintenant un DL2 de  $y \mapsto e^y$  en 0 :

$$e^h = 1 + h + \frac{h^2}{2} + h^2\varepsilon_1(h) \text{ avec } \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon_1(h) = 0,$$

et donc

$$\frac{e^h - 1}{h} = 1 + \frac{h}{2} + h\varepsilon_1(h).$$

Comme  $\theta_h \in ]0, 1[$ , le DL1 de  $y \mapsto e^y$  en 0 donne aussi

$$e^{\theta_h h} = 1 + \theta_h h + h\varepsilon_2(h) \text{ avec } \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon_2(h) = 0.$$

On a donc (comme  $e^{\theta h} = \frac{e^h - 1}{h}$ ) :

$$1 + \theta_h h + h\varepsilon_2(h) = 1 + \frac{h}{2} + h\varepsilon_1(h).$$

d'où :

$$\theta_h - \frac{1}{2} = \varepsilon_1(h) - \varepsilon_2(h).$$

On obtient, finalement,  $\lim_{h \rightarrow 0, h > 0} \theta_h = \frac{1}{2}$ .

- (d)  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f(x) = x^2 + x + 1$  pour  $x \in [a, b]$ .

—————  
**corrigé**  
—————

Soit  $\theta \in ]0, 1[$  vérifiant (4.14). La relation (4.14) donne :

$$(a + h)^2 + h - a^2 = hf'(a + \theta h) = 2h(a + \theta h) + h,$$

ce qui donne

$$h^2 = 2h^2\theta,$$

et donc  $\theta = \frac{1}{2}$ . Ceci donne l'unicité de  $\theta$  et  $\lim_{h \rightarrow 0, h > 0} \theta_h = \frac{1}{2}$ .

---

2. Soit  $f$  une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est de classe  $C^2$ . Soit  $a \in \mathbb{R}$ .

- (a) Montrer que pour tout  $h \in \mathbb{R}^*$  il existe  $\theta \in ]0, 1[$  vérifiant (4.14) et donner un exemple de fonction  $f$  (et de valeurs de  $a \in \mathbb{R}$  et  $h \in \mathbb{R}^*$ ) pour laquelle  $\theta$  n'est pas unique.

—————  
**corrigé**  
—————

Si  $h > 0$ ; on applique le théorème des accroissements finis à la fonction  $f$  sur l'intervalle  $[a, a + h]$ , il donne l'existence de  $\theta \in ]0, 1[$  vérifiant (4.14). Si  $h < 0$ , on obtient le même résultat en appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction  $f$  sur l'intervalle  $[a + h, a]$ .

En prenant, par exemple,  $f(x) = x$  (pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ), on obtient un exemple pour lequel (4.14) est vraie pour tout  $\theta \in ]0, 1[$  (et quelquesoit  $a \in \mathbb{R}$  et  $h \in \mathbb{R}^*$ ).

---

- (b) On suppose que  $f''(a) \neq 0$ . Pour tout  $h \in \mathbb{R}^*$ , on choisit une valeur de  $\theta \in ]0, 1[$  pour laquelle (4.14) est vérifiée. On note  $\theta_h$  cette valeur de  $\theta$ . Montrer que  $\lim_{h \rightarrow 0, h > 0} \theta_h = \frac{1}{2}$ . [On pourra utiliser la formule de Taylor-Lagrange.]

—————  
**corrigé**  
—————

Soit  $h \in \mathbb{R}^*$ . On applique la formule de Taylor-Lagrange à la fonction  $f$ . On obtient l'existence de  $\varphi_h \in ]0, 1[$  t.q. :

$$f(a + h) - f(a) = f'(a)h + \frac{f''(a + \varphi_h h)}{2}h^2.$$

En appliquant la formule de Taylor-Lagrange à la fonction  $f'$ , on obtient aussi l'existence de  $\psi_h \in ]0, 1[$  t.q. :

$$f'(a + \theta_h h) = f'(a) + f''(a + \psi_h \theta_h h)\theta_h h.$$

Comme  $f(a + h) - f(a) = hf'(a + \theta_h h)$ , on a donc  $\frac{f''(a + \varphi_h h)}{2} = f''(a + \psi_h \theta_h h)\theta_h$ . Comme  $f''(a) \neq 0$  et  $f''$  continue, il existe  $\eta > 0$  t.q., pour tout  $y \in [a - \eta, a + \eta]$ ,  $f''(y) \neq 0$ . On peut écrire, pour  $h \in [-\eta, \eta]$  :

$$\theta_h = \frac{f''(a + \varphi_h h)}{2f''(a + \psi_h \theta_h h)}.$$

La continuité de  $f''$  et le fait que  $f''(a) \neq 0$  permet alors d'en déduire que  $\lim_{h \rightarrow 0, h > 0} \theta_h = \frac{1}{2}$ .

---

3. Soit  $f$  une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est dérivable (en tout point de  $\mathbb{R}$ ) et que, pour tout  $a \in \mathbb{R}$  et  $h \in \mathbb{R}^*$ , (4.14) est vérifiée avec  $\theta = \frac{1}{2}$ .

- (a) Montrer que  $f(a+h) - f(a-h) = 2hf'(a)$  pour tout  $a \in \mathbb{R}$  et  $h \in \mathbb{R}^*$ .

—————  
corrigé

Comme (4.14) est vraie avec  $\theta = \frac{1}{2}$ , pour tout  $a \in \mathbb{R}$  et  $h \in \mathbb{R}^*$ , on peut l'appliquer (si  $a \in \mathbb{R}$  et  $h \in \mathbb{R}^*$ ) avec  $a-h$  et  $2h$ . on obtient

$$f(a-h+2h) - f(a-h) = 2hf'(a-h + \frac{1}{2}2h),$$

ce qui donne bien  $f(a+h) - f(a-h) = 2hf'(a)$ .

- (b) Montrer que  $f$  est de classe  $C^\infty$ . [On pourra, par exemple, utiliser (a) avec  $h = 1$ .]

—————  
corrigé

La question (a) donne, pour tout  $x \in \mathbb{R}$  ;

$$f'(x) = \frac{1}{2}(f(x+1) - f(x-1)).$$

On déduit de cette formule, par récurrence sur  $n$  que  $f$  est de classe  $C^n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ . En effet, comme  $f$  est continue, la formule donne bien que  $f'$  est continue, donc  $f$  est de classe  $C^1$ . Puis, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , si  $f$  est de classe  $C^n$ , la formule donne que  $f'$  est de classe  $C^n$  et donc  $f$  est de classe  $C^{n+1}$ .

On a bien montré ainsi, par récurrence, que  $f$  est de classe  $C^n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ . c'est-à-dire que  $f$  est de classe  $C^\infty$ .

- (c) Montrer que  $f'''(a) = 0$  pour tout  $a \in \mathbb{R}$ . En déduire qu'il existe  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$  t.q. :

$$f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

On suppose que (4.14) est, pour tout  $a \in \mathbb{R}$  et  $h \in \mathbb{R}^*$ , vérifiée seulement pour  $\theta = \frac{1}{2}$ . Montrer que  $\alpha \neq 0$ .

—————  
corrigé

Soit  $a \in \mathbb{R}$  et  $h \in \mathbb{R}^*$ . Comme  $f$  est de classe  $C^3$ , la formule de Taylor-Lagrange donne l'existence de  $\varphi_h, \psi_h \in ]0, 1[$  t.q. :

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + \frac{f'''(a + \varphi_h h)}{6}h^3,$$

$$f(a-h) = f(a) - f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 - \frac{f'''(a - \psi_h h)}{6}h^3.$$

Comme  $f(a+h) - f(a-h) = 2hf'(a)$ , on en déduit :

$$f'''(a + \varphi_h h) + f'''(a - \psi_h h) = 0.$$

En faisant tendre  $h$  vers 0, ceci donne  $f'''(a) = 0$ .

La formule de Taylor-Lagrange (en 0, à l'ordre 3) donne alors l'existence de  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$  t.q. :

$$f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Si  $\alpha = 0$ , la formule (4.14) est vérifiée pour tout  $\theta \in ]0, 1[$ . Donc, si, pour tout  $a \in \mathbb{R}$  et  $h \in \mathbb{R}^*$ , (4.14) est vérifiée seulement pour  $\theta = \frac{1}{2}$ , on a nécessairement  $\alpha \neq 0$ .

**Exercice 4.31 (Etude d'une fonction (1))**

Soit la fonction  $f$  définie sur  $] -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$  par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+\tan x)}{\sin x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que  $f$  est continue et dérivable en 0.

**corrigé**

On montre ci dessous continuité et dérivabilité de  $f$  en 0 en faisant un *DL2* en 0 du numérateur et du dénominateur de la fraction définissant  $f$  (mais, bien sûr, d'autres preuves sont possibles).

Pour  $x \in ] -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$ , on a  $\tan x \in ] -1, 1[$  et  $\tan x = x + x^2\varepsilon_1(x)$  avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_1(x) = 0$ . Pour  $u \in ] -1, 1[$ , on a  $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + u^2\varepsilon_2(u)$  avec  $\lim_{u \rightarrow 0} \varepsilon_2(u) = 0$ . On en déduit, pour  $x \in ] -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$  :

$$\ln(1 + \tan x) = x + x^2\varepsilon_1(x) - \frac{(x + x^2\varepsilon_1(x))^2}{2} + (x + x^2\varepsilon_1(x))^2\varepsilon_2(x + x^2\varepsilon_1(x)),$$

et donc :

$$\ln(1 + \tan x) = x - \frac{x^2}{2} + x^2\varepsilon_3(x), \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_3(x) = 0.$$

Pour  $x \in ] -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$ , on a  $\sin x = x + x^2\varepsilon_4(x)$  avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_4(x) = 0$ , ce qui donne, pour  $x \in ] -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$ ,  $x \neq 0$  :

$$f(x) = \frac{x - \frac{x^2}{2} + x^2\varepsilon_3(x)}{x + x^2\varepsilon_4(x)} = \frac{1 - \frac{x}{2} + x\varepsilon_3(x)}{1 + x\varepsilon_4(x)}.$$

On en déduit que  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$  et donc que  $f$  est continue (car  $f(0) = 1$ ). Puis, pour  $x \in ] -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$ ,  $x \neq 0$ , on a :

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{f(x) - 1}{x} = \frac{-\frac{x}{2} + x\varepsilon_3(x) - x\varepsilon_4(x)}{x(1 + x\varepsilon_4(x))} = \frac{-\frac{1}{2} + \varepsilon_3(x) - \varepsilon_4(x)}{1 + x\varepsilon_4(x)}$$

On a donc  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -\frac{1}{2}$ . Ce qui prouve que  $f$  est dérivable en 0 et  $f'(0) = -\frac{1}{2}$ .

2. Donner le développement limité de  $f$  en 0 à l'ordre 2.

**corrigé**

Pour avoir un *DL2* de  $f$  en 0, il suffit de faire un *DL3* en 0 du numérateur et du dénominateur de la fraction définissant  $f$ . On procède comme à la question précédente.

Pour  $x \in ] -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$ , on a  $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + x^3\eta_1(x)$  avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \eta_1(x) = 0$ . Pour  $u \in ] -1, 1[$ , on a  $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + u^3\eta_2(u)$  avec  $\lim_{u \rightarrow 0} \eta_2(u) = 0$ . On en déduit, pour  $x \in ] -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$  :

$$\ln(1 + \tan x) = x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3\eta_3(x), \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \eta_3(x) = 0.$$

c'est-à-dire :

$$\ln(1 + \tan x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{2x^3}{3} + x^3\eta_3(x).$$

Pour  $x \in ]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$ , on a  $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + x^3\eta_4(x)$  avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \eta_4(x) = 0$ , ce qui donne, pour  $x \in ]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$ ,  $x \neq 0$  :

$$f(x) = \frac{x - \frac{x^2}{2} + \frac{2x^3}{3} + x^3\eta_3(x)}{x - \frac{x^3}{6} + x^3\eta_4(x)} = \frac{1 - \frac{x}{2} + \frac{2x^2}{3} + x^2\eta_3(x)}{1 - \frac{x^2}{6} + x^2\eta_4(x)}.$$

On utilise maintenant que, pour  $u \neq 1$ ,  $\frac{1}{1-u} = 1 + u + u\eta_5(u)$ , avec  $\lim_{u \rightarrow 0} \eta_5(u) = 0$ . On obtient, pour  $x \in ]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$ ,  $x \neq 0$  :

$$\frac{1}{1 - \frac{x^2}{6} + x^2\eta_4(x)} = 1 + \frac{x^2}{6} + x^2\eta_6(x), \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \eta_6(x) = 0.$$

Ce qui donne :

$$f(x) = (1 - \frac{x}{2} + \frac{2x^2}{3} + x^2\eta_3(x))(1 + \frac{x^2}{6} + x^2\eta_6(x)) = 1 - \frac{x}{2} + \frac{5x^2}{6} + x^2\eta_7(x), \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \eta_7(x) = 0.$$

On a ainsi obtenu le DL2 de  $f$  en 0.

3. Donner l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 0 et la position locale de la courbe de  $f$  par rapport à cette tangente.

**corrigé**

La tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 0 a pour équation  $g(x) = 1 - \frac{x}{2}$ . La question précédente donne  $f(x) - g(x) = \frac{5x^2}{6} + x^2\eta_7(x)$ , avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \eta_7(x) = 0$ . Il existe donc  $\varepsilon > 0$  t.q.

$$|x| \leq \varepsilon \Rightarrow |\eta_7(x)| \leq \frac{5}{6} \Rightarrow f(x) - g(x) \geq 0.$$

Ceci prouve que la courbe de  $f$  est, au voisinage de 0, au dessus de celle de  $g$  (qui est sa tangente en 0).

### Exercice 4.32 (Etude d'une fonction (2))

On définit la fonction  $f$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 3x + \frac{\cos(x)}{x^2 + 1}$ .

1. Montrer que  $f$  est dérivable et calculer  $f'(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

**corrigé**

La fonction  $x \mapsto \frac{\cos(x)}{x^2+1}$  est dérivable (et même de classe  $C^\infty$ ) car elle le quotient de deux fonctions dérivables (et de classe  $C^\infty$ ) et que la fonction au dénominateur ne s'annule pas. La fonction  $f$  est alors dérivable (et de classe  $C^\infty$ ) comme somme de fonctions dérivables (et de classe  $C^\infty$ ).

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on trouve  $f'(x) = 3 - \frac{\sin(x)}{x^2+1} - \frac{2x \cos(x)}{(x^2+1)^2}$ .

**corrigé**

2. Montrer que  $f$  est strictement croissante.

**corrigé**

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a :

$$\frac{|\sin(x)|}{x^2 + 1} \leq 1$$

et

$$\frac{2|x \cos(x)|}{(x^2 + 1)^2} \leq \frac{2|x|}{(x^2 + 1)} \leq 1$$

car  $2|x| \leq x^2 + 1$ . On en déduit  $f'(x) \geq 3 - 1 - 1 = 1 > 0$ . Ce qui prouve que  $f$  est strictement croissante.

---

3. Montrer que  $f$  est une bijection de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ .

**corrigé**

La fonction  $f$  est strictement croissante, c'est donc une bijection de  $\mathbb{R}$  sur son image, notée  $\text{Im}(f)$ . Pour montrer que  $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$ , il suffit de remarquer que  $f$  est continue et que :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty.$$

---

Dans la suite, on note  $g$  la fonction réciproque de  $f$  (la fonction  $g$  est donc aussi une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ ).

4. Montrer que  $f$  admet un développement limité d'ordre 2 en 0 et donner ce développement.

**corrigé**

La fonction  $f$  est de classe  $C^2$ , elle admet donc un développement limité d'ordre 2 en 0. Pour le trouver, on remarque que :

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + x^2 \varepsilon_1(x) \text{ et } \frac{1}{x^2 + 1} = 1 - x^2 + x^2 \varepsilon_2(x), \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_i(x) = 0 \text{ pour } i = 1, 2.$$

On en déduit  $f(x) = 1 + 3x - \frac{3}{2}x^2 + x^2 \varepsilon_3(x)$  avec  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_3(x) = 0$ .

---

Donner l'équation de la tangente (à la courbe de  $f$ ) en 0 et la position locale de la courbe de  $f$  par rapport à cette tangente.

**corrigé**

La tangente (à la courbe de  $f$ ) en 0 est  $t(x) = 3x + 1$ . On remarque que  $f(x) - t(x) = \frac{\cos(x)}{x^2 + 1} - 1 \leq 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . La courbe de  $f$  est donc localement (et même globalement) en dessous de sa tangente en 0.

---

5. Montrer que  $g$  admet un développement limité d'ordre 2 en 1 et donner ce développement.

**corrigé**

La fonction  $f$  est de classe  $C^\infty$  et  $f'$  ne s'annule pas, on en déduit que la fonction  $g$  est aussi de classe  $C^\infty$ . Pour avoir le développement limité de  $g$  d'ordre 2 en 1, on calcule  $g(1)$ ,  $g'(1)$  et  $g''(1)$ .

Comme  $f(0) = 1$ , on a  $g(1) = 0$ . puis  $f'(x)g'(f(x)) = 1$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . En prenant  $x = 0$ , comme  $f'(0) = 3$ , on a donc  $3g'(1) = 1$  et  $g'(1) = 1/3$ . Enfin, on a  $f''(x)g'(f(x)) + f'(x)^2 g''(f(x)) = 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . En prenant  $x = 0$ , comme  $f''(0) = -3$ , on a donc  $-3g'(1) + 9g''(1) = 0$ , ce qui donne  $g''(1) = 1/9$ .

Le développement limité d'ordre 2 en 1 de  $g$  est donc  $g(x) = \frac{1}{3}(x-1) + \frac{1}{18}(x-1)^2 + (x-1)^2\varepsilon(x)$  avec  $\lim_{x \rightarrow 1} \varepsilon(x) = 0$ .

---

6. Donner les asymptotes de  $f$  en  $\pm\infty$ .

**corrigé**

---

Comme  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - 3x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\cos(x)}{x^2+1} = 0$ , la fonction  $f$  admet pour asymptote en  $\pm\infty$  la droite d'équation  $x \mapsto 3x$ .

---

7. montrer que  $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$  et donner les asymptotes de  $g$  en  $\pm\infty$ .

**corrigé**

---

La fonction  $g$  est (comme  $f$ ) une bijection strictement croissante de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . Pour tout  $A \in \mathbb{R}$ , il existe donc  $x_0 \in \mathbb{R}$  t.q.  $g(x_0) = A$  et on a :

$$x \geq x_0 \Rightarrow g(x) \geq A.$$

Ceci prouve que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ . De manière analogue, on a  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ .

Pour trouver les asymptotes de  $g$ , il suffit alors de remarquer que (comme  $f \circ g(x) = x$ ) :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (g(x) - \frac{1}{3}x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [g(x) - \frac{1}{3}f(g(x))] = \lim_{y \rightarrow \pm\infty} (y - \frac{1}{3}f(y)) = \frac{1}{3} \lim_{y \rightarrow \pm\infty} (3y - f(y)) = 0.$$

La fonction  $g$  admet donc pour asymptote en  $\pm\infty$  la droite d'équation  $x \mapsto \frac{1}{3}x$ .

### Exercice 4.33 (Etude de $\ln(1-x)/x$ )

1. Montrer que pour tout entier  $n$ , la fonction  $x \mapsto \ln(1+x)$  admet un développement limité à l'ordre  $n$  en zéro. Calculer explicitement ce développement pour  $n = 2$ .

**corrigé**

---

Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , la fonction  $x \mapsto \ln(1+x)$  est de classe  $C^n$  sur l'intervalle  $] -1, +\infty[$ . Elle admet donc un développement limité à l'ordre  $n$  en zéro. Son développement limité à l'ordre 2 en zéro est

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + x^2\varepsilon(x), \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$


---

2. Soit  $g : ]0, 1[ \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par  $g(x) = -\frac{\ln(1-x)}{x}$ . Montrer que  $g$  se prolonge par continuité en zéro (à droite).

**corrigé**

---

Pour tout  $x \in ]0, 1[$ , la question 1 donne  $g(x) = 1 + \frac{1}{2}x - x\varepsilon(-x)$ . On en déduit que  $g$  se prolonge par continuité en 0 en posant  $g(0) = 1$ .

---

Soit  $f : [0, 1[ \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par  $f(x) = \begin{cases} -\frac{\ln(1-x)}{x} & \text{si } x \in ]0, 1[, \\ 1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$

3. Montrer que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $]0, 1[$ .

—————  
**corrigé**—————

La fonction  $f$  est le quotient de deux fonctions de classe  $C^\infty$  sur  $]0, 1[$ . La fonction qui est au dénominateur ne s'annule pas. On en déduit que  $f$  est aussi de classe  $C^\infty$  sur  $]0, 1[$ .

4. Montrer que  $f$  est dérivable à droite en zéro et donner la valeur de cette dérivée (notée  $f'(0)$ ).

—————  
**corrigé**—————

En utilisant une nouvelle fois la question 1, on remarque que, pour tout  $x \in ]0, 1[$ , on a

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{1}{2} - \varepsilon(-x).$$

On en déduit que  $f$  est dérivable à droite en 0 et que  $f'(0) = \frac{1}{2}$ .

5. Calculer la fonction dérivée  $f'$  sur  $]0, 1[$ . La fonction  $f'$  est-elle continue en zéro ?

—————  
**corrigé**—————

Pour tout  $x \in ]0, 1[$  on a  $f'(x) = \frac{1}{x^2} \ln(1-x) + \frac{1}{x(1-x)}$ . On utilise la question 1 et le fait que

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x\eta(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \eta(x) = 0.$$

On obtient, pour tout  $x \in ]0, 1[$ ,  $f'(x) = -\frac{1}{x} - \frac{1}{2} + \varepsilon(-x) + \frac{1}{x} + 1 + \eta(x)$  et donc

$$f'(x) = \frac{1}{2} + \varepsilon(-x) + \eta(x).$$

Ceci donne  $\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} f'(x) = \frac{1}{2} = f'(0)$ . La fonction  $f'$  est donc continue en 0.

6. Montrer que pour tout  $x \in [0, 1[$ , on a  $\ln(1-x) + \frac{x}{1-x} \geq 0$ . En déduire le signe de  $f'(x)$  pour  $x \in ]0, 1[$ .

—————  
**corrigé**—————

Pour  $x \in [0, 1[$ , on pose  $h(x) = \ln(1-x) + \frac{x}{1-x}$ . La fonction  $h$  est continue sur  $[0, 1[$ , elle est dérivable sur  $]0, 1[$  et on a, pour tout  $x \in ]0, 1[$ ,  $h'(x) = \frac{x}{(1-x)^2} > 0$ . La fonction  $h$  est donc strictement croissante et, comme  $h(0) = 0$ , on en déduit que  $h(x) \geq 0$  pour tout  $x \in [0, 1[$  et  $h(x) > 0$  pour tout  $x \in ]0, 1[$ .

Comme  $f'(x) = \frac{1}{x^2} h(x)$ , pour tout  $x \in ]0, 1[$ , on a donc aussi  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in ]0, 1[$  (et donc aussi pour tout  $x \in [0, 1[$  car  $f'(0) = \frac{1}{2} > 0$ ).

7. Dresser le tableau de variations de  $f$  et tracer l'allure de son graphe sur  $[0, 1[$  (on pensera à calculer la limite de  $f$  en 1).

—————  
**corrigé**—————

La fonction  $f$  est continue sur  $[0, 1[$ , dérivable sur  $]0, 1[$  (et dérivable à droite en 0). Sa dérivée est strictement positive sur  $]0, 1[$ . La fonction  $f$  est donc strictement croissante. On a  $f(0) = 1$  et  $\lim_{x \rightarrow 1, x < 1} f(x) = +\infty$ .

# Chapitre 5

## Intégrale et primitives

### 5.1 Objectif

On cherche dans ce chapitre à construire l'opérateur réciproque de l'opérateur de dérivation. Les deux questions suivantes sont alors naturelles.

**Question 1 :** Soit  $f$  une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . Existe-t-il une application  $F$ , de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , dérivable et t.q.  $F' = f$  (c'est-à-dire  $F'(x) = f(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ) ? Si une telle application  $F$  existe, on dit que  $F$  est une primitive de  $f$ .

**Question 2 :** Si  $F$  existe, dans la question 1,  $F$  est-elle unique ?

**Réponse à la question 2 :** Cette question est facile,  $F$  est unique à une constante additive près. On peut le voir comme conséquence du théorème des accroissements finis (théorème 3.2). Nous le verrons dans le théorème 5.2.

**Réponse à la question 1 :** Cette question est beaucoup plus difficile.

1. On va montrer que la réponse est "oui" si  $f$  est continue (le fait que  $f$  soit continue est donc une condition suffisante pour que  $f$  admette une primitive). Ceci sera vu dans le théorème 5.2.
2. Le fait que  $f$  soit continue n'est pas une condition nécessaire pour que  $f$  admette une primitive. Plus précisément, si  $f$  admet une primitive, on a donc  $f = F'$ , où  $F$  est une application dérivable de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . L'exercice 3.5 montre alors que  $f$  vérifie la propriété des valeurs intermédiaires. Donc, le fait que  $f$  vérifie la propriété des valeurs intermédiaires est une condition nécessaire pour que  $f$  admette une primitive. Cette condition est-elle suffisante ? (je ne sais pas... , on peut montrer que si  $f$  vérifie la propriété des valeurs intermédiaires,  $f$  n'est pas nécessairement localement intégrable, même au sens de Lebesgue, notion qui ne sera pas présentée dans ce document, mais cela ne permet pas de conclure.)

Résumé : L'objectif principal de ce chapitre est donc de démontrer que si  $f$  est continue de  $] \alpha, \beta [$  dans  $\mathbb{R}$  ( $-\infty \leq \alpha < \beta \leq \infty$ ), alors  $f$  admet une primitive.

## 5.2 Intégrale des fonctions en escalier

**Définition 5.1 (Fonctions en escalier)** Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f$  une application de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . On dit que  $f$  est "en escalier" si il existe  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ ,  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$  t.q. :

- $a = x_0 < \dots < x_n = b$ ,
- $f(x) = \alpha_i$ , si  $x \in ]x_{i-1}, x_i[$ ,  $i \in \{1, \dots, n\}$ .

On note  $E_{a,b}$  l'ensemble des fonctions en escalier sur l'intervalle  $[a, b]$ .

**Remarque 5.1** Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f \in E_{a,b}$ . Soit  $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$  et  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$  t.q. :  $a = x_0 < \dots < x_n = b$  et  $f(x) = \alpha_i$  si  $x \in ]x_{i-1}, x_i[$ ,  $i \in \{1, \dots, n\}$ .

On aimerait poser  $\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^n \alpha_i(x_i - x_{i-1})$ . Est ce possible ? La difficulté est ici que les  $a_i$  et les  $\alpha_i$  ne sont pas nécessairement uniques. Cette difficulté est résolue dans la proposition 5.1.

**Proposition 5.1** Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f \in E_{a,b}$ .

- Soit  $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$  et  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$  t.q. :  
 $a = x_0 < \dots < x_n = b$ , et  $f(x) = \alpha_i$  si  $x \in ]x_{i-1}, x_i[$ ,  $i \in \{1, \dots, n\}$ .
- Soit  $y_0, \dots, y_p \in [a, b]$  et  $\beta_1, \dots, \beta_p \in \mathbb{R}$  t.q. :  
 $a = y_0 < \dots < y_p = b$  et  $f(x) = \beta_i$  si  $x \in ]y_{i-1}, y_i[$ ,  $i \in \{1, \dots, p\}$ .

Alors,  $\sum_{i=1}^n \alpha_i(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^p \beta_i(y_i - y_{i-1})$ .

DÉMONSTRATION : On réunit l'ensemble des points  $x_i$ ,  $i \in \{0, \dots, n\}$ , et des points  $y_j$ ,  $j \in \{0, \dots, p\}$ , on a ainsi

$$\{z_0, \dots, z_q\} = \{x_0, \dots, x_n\} \cup \{y_0, \dots, y_p\}, \text{ avec } a = z_0 < \dots < z_q = b.$$

(On a donc  $\max\{n, p\} \leq q \leq n + p - 1$ .) Sur l'intervalle  $]z_{k-1}, z_k[$ ,  $k \in \{1, \dots, q\}$ , la fonction  $f$  est constante, on note  $\gamma_k$  sa valeur. On va démontrer que

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i(x_i - x_{i-1}) = \sum_{k=1}^q \gamma_k(z_k - z_{k-1}). \quad (5.1)$$

Bien sûr, un raisonnement analogue donnerait  $\sum_{i=1}^p \beta_i(y_i - y_{i-1}) = \sum_{k=1}^q \gamma_k(z_k - z_{k-1})$ , ce qui permet de conclure la démonstration.

Pour montrer (5.1), on remarque que les points  $x_i$ ,  $i \in \{0, \dots, n\}$ , font partie des points  $z_k$ ,  $k \in \{0, \dots, q\}$ . Pour tout  $i \in \{0, \dots, n\}$ , il existe donc  $k_i \in \{0, \dots, q\}$  t.q.  $x_i = z_{k_i}$ . On a, en particulier,  $k_0 = 0$  et  $k_n = q$ .

Soit maintenant  $i \in \{1, \dots, n\}$ . On a  $x_i - x_{i-1} = z_{k_i} - z_{k_{i-1}} = \sum_{k=k_{i-1}+1}^{k_i} z_k - z_{k-1}$ , et donc

$$\alpha_i(x_i - x_{i-1}) = \sum_{k=k_{i-1}+1}^{k_i} \alpha_i(z_k - z_{k-1}).$$

Mais, pour tout  $k \in \{k_{i-1} + 1, \dots, k_i\}$ , on a  $]z_{k-1}, z_k[ \subset ]x_{i-1}, x_i[$  et donc  $\gamma_k = \alpha_i$ . On en déduit que

$$\alpha_i(x_i - x_{i-1}) = \sum_{k=k_{i-1}+1}^{k_i} \gamma_k(z_k - z_{k-1}).$$

On somme maintenant sur  $i$  cette égalité et on obtient

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=k_{i-1}+1}^{k_i} \gamma_k(z_k - z_{k-1}) = \sum_{k=1}^q \gamma_k(z_k - z_{k-1}).$$

Ce qui donne bien (5.1) et conclut la démonstration (car, comme cela a déjà été dit, un raisonnement analogue donnerait  $\sum_{i=1}^p \beta_i(y_i - y_{i-1}) = \sum_{k=1}^q \gamma_k(z_k - z_{k-1})$ ). ■

**Définition 5.2 (Intégrale des fonctions en escalier)** Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f \in E_{a,b}$  (voir la définition 5.1). Soit  $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ ,  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$  t.q. :

$a = x_0 < \dots < x_n = b$  et  $f(x) = \alpha_i$ , si  $x \in ]x_{i-1}, x_i[$ ,  $i \in \{1, \dots, n\}$ .

On pose  $T(f) = \int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^n \alpha_i(x_i - x_{i-1})$ .

Voici des propriétés élémentaires sur  $E_{a,b}$  et sur l'opérateur  $T$ .

**Proposition 5.2 (Propriétés de l'intégrale sur  $E_{a,b}$ )**

Soit  $-\infty < a < b < \infty$ , Alors (avec les définitions 5.1 et 5.2):

1.  $E_{a,b}$  est un e.v. sur  $\mathbb{R}$ ,
2.  $T$  est une application linéaire de  $E_{a,b}$  dans  $\mathbb{R}$ ,
3.  $f, g \in E_{a,b}$ ,  $f \geq g \Rightarrow T(f) \geq T(g)$ ,
4.  $f \in E_{a,b} \Rightarrow |f| \in E_{a,b}$  et  $|T(f)| \leq T(|f|)$ .

*N.B.* La notation " $f \geq g$ " signifie " $f(x) \geq g(x)$  pour tout  $x \in [a, b]$ ". La fonction  $|f|$  est définie par  $|f|(x) = |f(x)|$  pour  $x \in [a, b]$ .

DÉMONSTRATION :

1. Il est facile de voir que l'ensemble des applications de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$  est un e.v. sur  $\mathbb{R}$ . On remarque alors que  $E_{a,b}$  est un s.e.v. (c'est-à-dire un sous espace vectoriel) de l'ensemble des applications de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . En effet, soit  $f, g \in E_{a,b}$  et  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Il existe  $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$  t.q.  $a = x_0 < \dots < x_n = b$  et t.q.  $f$  soit constante sur  $]x_{i-1}, x_i[$ , pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ . De même, il existe  $y_0, \dots, y_p \in [a, b]$  t.q.  $a = y_0 < \dots < y_p = b$  et t.q.  $g$  soit constante sur  $]y_{j-1}, y_j[$ , pour tout  $j \in \{1, \dots, p\}$ . On introduit alors, comme dans la proposition 5.1, l'union des points  $x_i$ ,  $i \in \{0, \dots, n\}$ , et des points  $y_j$ ,  $j \in \{0, \dots, p\}$ , c'est-à-dire

$$\{z_0, \dots, z_q\} = \{x_0, \dots, x_n\} \cup \{y_0, \dots, y_p\}, \text{ avec } a = z_0 < \dots < z_q = b.$$

Il est clair (comme l'ensemble des points  $z_k$  contient tous les points  $x_i$  et tous les points  $y_j$ ) que les fonctions  $f$  et  $g$  sont constantes sur  $]z_{k-1}, z_k[$ , pour tout  $k \in \{1, \dots, q\}$ . la fonction  $\alpha f + \beta g$  est donc aussi constante sur  $]z_{k-1}, z_k[$ , pour tout  $k \in \{1, \dots, q\}$ . ce qui prouve que  $\alpha f + \beta g \in E_{a,b}$  et donc que  $E_{a,b}$  est un e.v. sur  $\mathbb{R}$ . (On peut remarquer que cet espace vectoriel est de dimension infinie).

**2.** Pour montrer que  $T$  est une application linéaire sur  $E_{a,b}$ , on reprend les notations précédentes. Soit  $f, g \in E_{a,b}$  et  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Comme précédemment, on remarque qu'il existe  $\{z_0, \dots, z_q\}$  t.q.  $a = z_0 < \dots < z_q = b$  et t.q.  $f$  et  $g$  soient constantes sur  $]z_{k-1}, z_k[$ , pour tout  $k \in \{1, \dots, q\}$ . On note alors  $\alpha_k$  la valeur de  $f$  sur  $]z_{k-1}, z_k[$  et  $\beta_k$  la valeur de  $g$  sur  $]z_{k-1}, z_k[$ . Par définition de  $T$  (définition 5.1) on a

$$T(f) = \sum_{k=1}^q \alpha_k (z_k - z_{k-1}), \quad T(g) = \sum_{k=1}^q \beta_k (z_k - z_{k-1}).$$

La fonction  $\alpha f + \beta g$  (qui appartient, comme nous l'avons déjà vu, à  $E_{a,b}$ ) est aussi constante sur  $]z_{k-1}, z_k[$  (pour tout  $k \in \{1, \dots, q\}$ ) et sa valeur sur  $]z_{k-1}, z_k[$  est  $\alpha\alpha_k + \beta\beta_k$ . On a donc (toujours par la définition 5.1)

$$T(\alpha f + \beta g) = \sum_{k=1}^q (\alpha\alpha_k + \beta\beta_k)(z_k - z_{k-1}).$$

On en déduit

$$T(\alpha f + \beta g) = \alpha \sum_{k=1}^q \alpha_k (z_k - z_{k-1}) + \beta \sum_{k=1}^q \beta_k (z_k - z_{k-1}) = \alpha T(f) + \beta T(g).$$

Ce qui prouve bien la linéarité de  $T$ .

**3.** On reprend, encore une fois, les mêmes notations. Soit  $f, g \in E_{a,b}$ . Il existe  $\{z_0, \dots, z_q\}$  t.q.  $a = z_0 < \dots < z_q = b$  et t.q.  $f$  et  $g$  soient constantes sur  $]z_{k-1}, z_k[$ , pour tout  $k \in \{1, \dots, q\}$ . On note alors  $\alpha_k$  la valeur de  $f$  sur  $]z_{k-1}, z_k[$  et  $\beta_k$  la valeur de  $g$  sur  $]z_{k-1}, z_k[$ . On a donc

$$T(f) = \sum_{k=1}^q \alpha_k (z_k - z_{k-1}), \quad T(g) = \sum_{k=1}^q \beta_k (z_k - z_{k-1}).$$

Si  $f \geq g$ , on a nécessairement  $\alpha_k \geq \beta_k$  pour tout  $k \in \{1, \dots, q\}$  (il suffit de remarquer que  $\alpha_k = f(x) \geq g(x) = \beta_k$  pour  $x \in ]z_{k-1}, z_k[$ ). On en déduit que

$$T(f) = \sum_{k=1}^q \alpha_k (z_k - z_{k-1}) \geq \sum_{k=1}^q \beta_k (z_k - z_{k-1}) = T(g).$$

**4.** Soit  $f \in E_{a,b}$ . Il existe  $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ ,  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$  t.q.  $a = x_0 < \dots < x_n = b$  et  $f = \alpha_i$  sur  $]x_{i-1}, x_i[$ ,  $i \in \{1, \dots, n\}$ . On a alors  $|f| = |\alpha_i|$  sur  $]x_{i-1}, x_i[$ , pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ . Ceci prouve que  $|f| \in E_{a,b}$  et (avec la définition 5.1)

$$T(|f|) = \sum_{i=1}^n |\alpha_i| (x_i - x_{i-1}) \geq \sum_{i=1}^n \alpha_i (x_i - x_{i-1}) = T(f).$$

Le même résultat avec  $-f$  au lieu de  $f$  donne

$$T(|-f|) \geq T(-f).$$

. Comme  $|-f| = |f|$  et (par linéarité de  $T$ )  $T(-f) = -T(f)$ , on a donc

$$T(|f|) \geq -T(f).$$

Finalement on a donc  $T(|f|) \geq \max(T(f), -T(f)) = |T(f)|$ . ■

### 5.3 Intégrale des fonctions continues

**Exemple 5.1** Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f$  une application de  $I$  dans  $\mathbb{R}$ . On rappelle que :

$$f \text{ continue (sur } I) \not\Rightarrow f \text{ uniformément continue.}$$

Voici deux exemples d'applications continues et non uniformément continues.

1.  $I = ]0, 1]$  et  $f(x) = \frac{1}{x}$  (vu au chapitre 2).
2.  $I = \mathbb{R}$  et  $f(x) = x^2$ .

Toutefois, lorsque  $I$  est intervalle de  $\mathbb{R}$ , fermé et borné, le théorème 5.1 montre que  $f$  est continue si et seulement si  $f$  est uniformément continue.

**Théorème 5.1 (Heine)** Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f$  une application continue de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . Alors,  $f$  est uniformément continue.

DÉMONSTRATION : Cette démonstration fait l'objet de l'exercice 5.2. ■

**Remarque 5.2** Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f$  une application bornée de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . Comme  $f$  est bornée, on peut trouver  $g$  et  $h$  dans  $E_{a,b}$  t.q.  $g \leq f \leq h$ . Soit  $g, h \in E_{a,b}$  t.q.  $g \leq f \leq h$ . On a alors (d'après la proposition 5.2)  $\int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b h(x)dx$ . Cette remarque suggère la définition de l'intégrale "supérieure" (notée  $S_f$ ) et de l'intégrale "inférieure" (notée  $I_f$ ) de  $f$ .

**Définition 5.3 (Intégrales supérieure et inférieure)** Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f$  une application bornée de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . On pose  $I_f = \sup\{\int_a^b g(x)dx, g \in E_{a,b}, g \leq f\}$ ,  $S_f = \inf\{\int_a^b h(x)dx, h \in E_{a,b}, f \leq h\}$ .

**Remarque 5.3** Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f$  une application bornée de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . La remarque 5.2 (avec les notations de la définition 5.3) donne  $I_f \leq S_f$ . Mais il est possible que  $I_f \neq S_f$ . Par contre, si  $f \in E_{a,b}$ , il est facile de montrer que  $I_f = S_f = \int_a^b f(x)dx$ .

Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f$  une application continue de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . La fonction  $f$  est donc bornée (voir le théorème 2.3). Nous avons vu dans la remarque 5.3 que  $I_f \leq S_f$  (ces quantités sont définies dans la définition 5.3). Dans la proposition 5.4 nous allons montrer que  $I_f = S_f$ . Ceci nous permettra alors de définir l'intégrale de  $f$  sur  $[a, b]$  comme la valeur commune de  $I_f$  et  $S_f$  (voir la définition 5.5). Pour cela, nous allons d'abord montrer qu'on peut approcher  $f$  "uniformément" par une fonction en escalier (grâce au théorème 5.1).

**Définition 5.4 (Convergence simple et convergence uniforme)** Soit  $D \subset \mathbb{R}$ ,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite d'applications de  $D$  dans  $\mathbb{R}$  et  $f$  une application  $D$  dans  $\mathbb{R}$ .

1. On dit que  $f_n$  converge simplement vers  $f$ , quand  $n \rightarrow +\infty$ , si

$$\text{pour tout } x \in D, \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x).$$

2. On dit que  $f_n$  converge uniformément vers  $f$ , quand  $n \rightarrow +\infty$ , si

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \right) = 0.$$

**Remarque 5.4** La convergence uniforme implique la convergence simple, mais la réciproque est fautive (même si  $D$  est un intervalle fermé borné et que les fonctions  $f_n$  et  $f$  sont continues de  $D$  dans  $\mathbb{R}$ ). Par exemple, on prend  $D = [0, 1]$ ,  $f(x) = 0$  pour tout  $x \in [0, 1]$  et, pour  $n \geq 2$ , on définit  $f_n$  par

$$\begin{aligned} f_n(x) &= nx \text{ si } 0 \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ f_n(x) &= -n(x - \frac{2}{n}) \text{ si } \frac{1}{n} < x \leq \frac{2}{n}, \\ f_n(x) &= 0 \text{ si } \frac{2}{n} \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

La suite  $(f_n)_{n \geq 2}$  converge bien simplement vers  $f$ , mais elle ne converge pas uniformément vers  $f$  car, pour tout  $n \geq 2$ ,  $\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x)| = 1$ .

On approche maintenant une fonction continue par une fonction en escalier.

**Proposition 5.3** Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f$  une application continue de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . On a alors

1. Pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe  $\varphi \in E_{a,b}$  t.q.  $|f - \varphi| \leq \varepsilon$  (c'est-à-dire  $\varphi(x) - \varepsilon \leq f(x) \leq \varphi(x) + \varepsilon$  pour tout  $x \in [a, b]$ ).
2. Il existe une suite  $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de  $E_{a,b}$  t.q.  $\varphi_n \rightarrow f$  uniformément, quand  $n \rightarrow +\infty$ .

DÉMONSTRATION : Soit  $\varepsilon > 0$ . Comme  $f$  est uniformément continue (d'après le théorème 5.1), il existe  $\alpha > 0$  t.q.

$$x, y \in [a, b], |x - y| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon. \quad (5.2)$$

On choisit alors  $n \in \mathbb{N}^*$  t.q.  $\frac{1}{n} \leq \frac{\alpha}{b-a}$  et pour  $i \in \{0, \dots, n\}$  on pose  $x_i = a + \frac{i}{n}(b-a)$ , de sorte que  $a = x_0 < \dots < x_n = b$  et  $x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n} \leq \alpha$ . On définit alors  $\varphi$  de la manière suivante :

$$\varphi(x) = f(x_{i-1}) \text{ si } x \in I_i, i \in \{1, \dots, n\},$$

avec  $I_i = [x_{i-1}, x_i[$  si  $i \in \{1, \dots, n\}$  et  $I_n = [x_{n-1}, x_n]$ . Avec cette définition de  $\varphi$ , on a bien  $\varphi \in E_{a,b}$  et on a  $|f - \varphi| \leq \varepsilon$ . En effet, soit  $x \in E_{a,b}$ , il existe  $i \in \{1, \dots, n\}$  t.q.  $x \in I_i$ . On a alors (grâce à (5.2))

$$|\varphi(x) - f(x)| = |f(x_{i-1}) - f(x)| \leq \varepsilon \text{ car } |x - x_{i-1}| \leq x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n} \leq \alpha.$$

On a donc bien trouvé  $\varphi \in E_{a,b}$  t.q.  $|\varphi - f| \leq \varepsilon$ .

Pour montrer le deuxième item, il suffit de prendre, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\varphi_n \in E_{a,b}$  t.q.  $|\varphi_n - f| \leq \frac{1}{n}$ . On a alors  $\sup_{x \in [a,b]} |\varphi_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{n}$ . La suite  $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge donc uniformément vers  $f$ . ■

**Proposition 5.4** Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f$  une application continue de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . Alors  $I_f = S_f$ .

DÉMONSTRATION : Comme cela a été dit dans la remarque 5.3 on a  $I_f \leq S_f$  (cela est même vrai pour toute fonction bornée de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$  et donc, *a fortiori* pour toute fonction continue de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ ). Grâce à la proposition 5.3, on va montrer maintenant que  $I_f = S_f$ .

D'après la proposition 5.3, il existe une suite  $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de  $E_{a,b}$  t.q.  $\varphi_n \rightarrow f$  uniformément vers  $f$ , quand  $n \rightarrow +\infty$ . On a donc, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\varphi_n - \varepsilon_n \leq f \leq \varphi_n + \varepsilon_n,$$

avec  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n = 0$  et  $\varepsilon_n = \sup_{x \in [a, b]} |\varphi_n(x) - f(x)|$ . En posant  $g_n = f_n - \varepsilon_n$  et  $h_n = f_n + \varepsilon_n$ , on a donc  $g_n, h_n \in E_{a, b}$  et  $g_n \leq f \leq h_n$ . La définition de  $I_f$  et  $S_f$  (définition 5.3) et le fait que  $I_f \leq S_f$  donne alors

$$\int_a^b g_n(x) dx \leq I_f \leq S_f \leq \int_a^b h_n(x) dx.$$

Grâce à la linéarité de l'intégrale sur  $E_{a, b}$ , on a donc

$$\int_a^b \varphi_n(x) dx - \varepsilon_n(b - a) \leq I_f \leq S_f \leq \int_a^b \varphi_n(x) dx + \varepsilon_n(b - a). \quad (5.3)$$

On en déduit, en particulier, que  $0 \leq S_f - I_f \leq 2\varepsilon_n(b - a)$ . Comme  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n = 0$ , on a donc  $I_f = S_f$ . ■

**Définition 5.5 (Intégrale des fonctions continues)** Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f$  une application continue de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . On pose  $\int_a^b f(x) dx = I_f = S_f$  (les quantités  $I_f$  et  $S_f$  sont définies dans la définition 5.3).

**Remarque 5.5** Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ , et  $f$  une application continue de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . On sait maintenant que  $\int_a^b f(x) dx = I_f = S_f$ . Soit  $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de  $E_{a, b}$  t.q.  $\varphi_n \rightarrow f$  uniformément vers  $f$ , quand  $n \rightarrow +\infty$ . On a donc, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\varphi_n - \varepsilon_n \leq f \leq \varphi_n + \varepsilon_n,$$

avec  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n = 0$  et  $\varepsilon_n = \sup_{x \in [a, b]} |\varphi_n(x) - f(x)|$ . Comme cela a été vu dans la proposition 5.4, on a

$$\int_a^b \varphi_n(x) dx - \varepsilon_n(b - a) \leq I_f \leq S_f \leq \int_a^b \varphi_n(x) dx + \varepsilon_n(b - a).$$

Mail, comme  $\int_a^b f(x) dx = I_f = S_f$ , on en déduit

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \int_a^b \varphi_n(x) dx \right| \leq \varepsilon_n(b - a).$$

On a donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$ . Nous utiliserons ceci pour démontrer (simplement) la linéarité de l'intégrale sur l'ensemble des fonctions continues de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$  (proposition 5.5).

Soit  $-\infty < a < b < \infty$ , on rappelle que  $E_{a, b} = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}; f \text{ en escalier}\}$  et on note  $C([a, b]) = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}; f \text{ continue}\}$ . L'intégrale est donc définie sur  $C([a, b])$  (et sur  $E_{a, b}$ ). Voici quelques propriétés simples de l'intégrale sur  $C([a, b])$  déduites de celles sur  $E_{a, b}$  (proposition 5.2).

**Proposition 5.5 (Propriétés de l'intégrale des fonctions continues)** Soit  $-\infty < a < b < \infty$ . On note  $I$  l'application de  $C([a, b])$  dans  $\mathbb{R}$  définie par  $I(f) = \int_a^b f(x) dx$ . Alors :

1.  $C([a, b])$  est un e.v. sur  $\mathbb{R}$ ,
2. (linéarité)  $I$  est une application linéaire de  $C([a, b])$  dans  $\mathbb{R}$ ,

3. (monotonie)  $f, g \in C([a, b])$ ,  $f \geq g \Rightarrow I(f) \geq I(g)$ ,

4.  $f \in C([a, b]) \Rightarrow |f| \in C([a, b])$  et  $|I(f)| \leq I(|f|)$ .

DÉMONSTRATION :

1. Le fait que  $C([a, b])$  est un e.v. sur  $\mathbb{R}$  est facile à voir. En effet, si  $f$  et  $g$  sont continues de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$  et si  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , la fonction  $\alpha f + \beta g$  est aussi continue de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ .

2. Soit  $f, g \in C([a, b])$  et  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Il existe deux suites  $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(\psi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de  $E_{a,b}$  t.q.  $\varphi_n \rightarrow f$  uniformément et  $\psi_n \rightarrow g$  uniformément, quand  $n \rightarrow +\infty$ . Pour tout  $x \in [a, b]$ , on a

$$|(\alpha\varphi_n + \beta\psi_n)(x) - (\alpha f + \beta g)(x)| \leq |\alpha| |\varphi_n(x) - f(x)| + |\beta| |\psi_n(x) - g(x)|,$$

et donc

$$\sup_{x \in [a, b]} \{ |(\alpha\varphi_n + \beta\psi_n)(x) - (\alpha f + \beta g)(x)| \} \leq |\alpha| \sup_{x \in [a, b]} \{ |\varphi_n(x) - f(x)| \} + |\beta| \sup_{x \in [a, b]} \{ |\psi_n(x) - g(x)| \}.$$

On en déduit que  $(\alpha\varphi_n + \beta\psi_n) \rightarrow (\alpha f + \beta g)$  uniformément, quand  $n \rightarrow +\infty$ . D'après la remarque 5.5 on a donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \psi_n(x) dx = \int_a^b g(x) dx$$

et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b (\alpha\varphi_n + \beta\psi_n)(x) dx = \int_a^b (\alpha f + \beta g)(x) dx.$$

Or, la linéarité de l'intégrale sur  $E_{a,b}$  (proposition 5.2) donne

$$\int_a^b (\alpha\varphi_n + \beta\psi_n)(x) dx = \alpha \int_a^b \varphi_n(x) dx + \beta \int_a^b \psi_n(x) dx,$$

en passant à la limite quand  $n \rightarrow +\infty$  on obtient donc

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.$$

Ce qui prouve bien la linéarité de l'intégrale sur  $C([a, b])$ .

3. Soit  $f, g \in C([a, b])$ , avec  $g \leq f$ . On remarque simplement ici que

$$\{\varphi \in E_{a,b}, \varphi \leq g\} \subset \{\varphi \in E_{a,b}, \varphi \leq f\}.$$

On en déduit  $I_g \leq I_f$  et donc

$$\int_a^b g(x) dx = I_g \leq I_f = \int_a^b f(x) dx.$$

4. Soit  $f \in C([a, b])$ . On a, bien sûr  $|f| \in C([a, b])$ . Comme  $f \leq |f|$ , l'item précédent donne

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Mais, on a aussi  $-f \leq |f|$ , les deux items précédents donnent alors

$$-\int_a^b f(x) dx = \int_a^b (-f)(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Finalement, comme  $|\int_a^b f(x)dx| = \max\{\int_a^b f(x)dx, -\int_a^b f(x)dx\}$ , on a bien

$$|\int_a^b f(x)dx| \leq \int_a^b |f(x)|dx.$$

Ce qui termine la démonstration de la proposition 5.5. ■

**Remarque 5.6** Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ . On a défini l'intégrale des fonctions continues (et l'intégrale des fonctions en escalier) sur l'intervalle  $[a, b]$ . On a aussi montré que l'application  $f \mapsto \int_a^b f(x)dx$  était linéaire sur  $E_{a,b}$  (proposition 5.2) et linéaire sur  $C([a, b])$  (proposition 5.5). On donne maintenant deux généralisations possibles (mais peu intéressantes).

1. On note  $S_{a,b}$  l'ensemble des fonctions réglées, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions qui sont limite uniforme de fonctions en escalier. L'ensemble  $S_{a,b}$  contient donc  $E_{a,b}$  et  $C([a, b])$ . En reprenant la proposition 5.3, il est facile de voir que  $I_f = S_f$  si  $f \in S_{a,b}$  (dans la proposition 5.3, on a seulement utilisé le fait qu'une fonction continue était limite uniforme de fonctions en escalier). Si  $f \in S_{a,b}$ , on pose  $\int_a^b f(x)dx = I_f = S_f$ . De même, une adaptation simple de la proposition 5.5 montre que  $S_{a,b}$  est un e.v. sur  $\mathbb{R}$  et que l'application  $f \mapsto \int_a^b f(x)dx$  est linéaire sur  $S_{a,b}$ .
2. Soit  $f$  une application de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . On dit que  $f$  est intégrable au sens de Riemann si  $f$  est bornée et  $I_f = S_f$  (voir la définition 5.3). On note  $R_{a,b}$  l'ensemble des fonctions intégrables au sens de Riemann sur l'intervalle  $[a, b]$ . L'ensemble  $R_{a,b}$  contient donc  $S_{a,b}$ . Si  $f \in R_{a,b}$ , on pose  $\int_a^b f(x)dx = I_f = S_f$ . On peut montrer que  $R_{a,b}$  est un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$  et que l'application  $f \mapsto \int_a^b f(x)dx$  est linéaire sur  $R_{a,b}$  (voir l'exercice 5.9). Cette démonstration est différente de celle de la proposition 5.5 car une fonction appartenant à  $R_{a,b}$  n'est pas forcément limite uniforme de fonctions en escalier.
3. Les deux généralisations précédentes (l'intégrale sur  $S_{a,b}$  et sur  $R_{a,b}$ ) sont peu intéressantes. Une généralisation très intéressante (mais qui utilise des outils différents) est l'intégrale de Lebesgue. Elle contient l'intégrale de Riemann, c'est-à-dire l'intégrale sur  $R_{a,b}$ , et donc aussi l'intégrale des fonctions réglées et l'intégrale des fonctions continues.

**Remarque 5.7** Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f \in C([a, b])$ , on pose  $m = \inf\{f(x), x \in [a, b]\}$  et  $M = \sup\{f(x), x \in [a, b]\}$ . Une conséquence du troisième item de la proposition 5.5 est alors que  $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$ .

**Proposition 5.6 (Formule de Chasles)** Soit  $-\infty < a < b < \infty$ ,  $f \in C([a, b])$  et  $a < c < b$ . Alors

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

DÉMONSTRATION : Soit  $\varphi \in E_{a,b}$ . On définit  $\xi$  et  $\zeta$  par

$$\xi(x) = \varphi(x) \text{ pour } x \in [a, c], \quad \zeta(x) = \varphi(x) \text{ pour } x \in [c, b].$$

Il est facile de voir que  $\xi \in E_{a,c}$ ,  $\zeta \in E_{c,b}$  et (avec la définition 5.2) que

$$\int_a^b \varphi(x)dx = \int_a^c \xi(x)dx + \int_c^b \zeta(x)dx. \tag{5.4}$$

Comme  $f \in C([a, b])$ , il existe une suite  $\varphi_n$  dans  $E_{a,b}$  t.q.  $\varphi_n \rightarrow f$  uniformément sur  $[a, b]$ . On définit alors les suites  $(\xi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(\zeta_n)_{n \in \mathbb{N}}$  dans  $E_{a,c}$  et  $E_{c,b}$  par

$$\xi_n(x) = \varphi_n(x) \text{ pour } x \in [a, c], \quad \zeta_n(x) = \varphi_n(x) \text{ pour } x \in [c, b].$$

La suite  $(\xi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge uniformément vers  $f$  sur  $[a, c]$  et la suite  $(\zeta_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge uniformément vers  $f$  sur  $[c, b]$ . La remarque 5.5 donne donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^c \xi_n(x) dx = \int_a^c f(x) dx, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_c^b \zeta_n(x) dx = \int_c^b f(x) dx, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Comme  $\int_a^b \varphi_n(x) dx = \int_a^c \xi_n(x) dx + \int_c^b \zeta_n(x) dx$  (pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , voir (5.4)), on obtient quand  $n \rightarrow +\infty$ ,  
 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$  ■

## 5.4 Primitives

**Définition 5.6 (Intégrale toutes bornes)** Soit  $-\infty < b \leq a < \infty$  et  $f \in C([b, a])$ , On pose :

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx \text{ si } b < a \text{ et } \int_a^a f(x) dx = 0.$$

Une conséquence facile de la définition 5.6 et de la proposition 5.6 est que si  $-\infty \leq \alpha < \beta \leq \infty$ ,  $f$  est une application continue de  $] \alpha, \beta [$  dans  $\mathbb{R}$  et  $a, b, c \in ] \alpha, \beta [$ , on a alors :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

On montre maintenant l'existence (et l'unicité à une constante près) d'une primitive à une fonction continue.

**Théorème 5.2 (Primitive d'une fonction continue)** Soit  $-\infty \leq \alpha < \beta \leq \infty$  et  $f$  continue de  $] \alpha, \beta [$  dans  $\mathbb{R}$ . Soit  $a \in ] \alpha, \beta [$ .

On pose  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  pour  $x \in ] \alpha, \beta [$ . Alors :

1. La fonction  $F$  dérivable (sur  $] \alpha, \beta [$ ) et  $F'(x) = f(x)$  pour tout  $x \in ] \alpha, \beta [$ . La fonction  $F$  est donc une primitive de  $f$ .
2. Soit  $G$  une primitive de  $f$ . Il existe alors  $C \in \mathbb{R}$  t.q.  $F - G = C$  (c'est-à-dire  $F(x) - G(x) = C$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ). La fonction  $F$  est donc la seule primitive de  $f$  s'annulant en  $a$ .

DÉMONSTRATION : Soit  $x \in ] \alpha, \beta [$ . On va montrer que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x). \tag{5.5}$$

Soit  $\varepsilon > 0$ . Comme  $f$  est continue en  $x$ , il existe  $\eta > 0$  t.q.

$$y \in [x - \eta, x + \eta] \Rightarrow |f(y) - f(x)| \leq \varepsilon. \tag{5.6}$$

Soit maintenant  $0 < h \leq \eta$ . On a

$$F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t)dt \quad \text{et} \quad f(x) = \frac{f(x)}{h} \int_x^{x+h} dt = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(x)dt.$$

On a donc

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| = \frac{1}{h} \left| \int_x^{x+h} (f(t) - f(x))dt \right|.$$

On utilise maintenant la proposition 5.5 et (5.6) (car  $|h| \leq \eta$ ). On obtient

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| \leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)|dt \leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \varepsilon dt = \varepsilon.$$

Un raisonnement analogue avec  $-\eta \leq h < 0$  donne

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| \leq \frac{1}{-h} \int_{x+h}^x |f(t) - f(x)|dt \leq \frac{1}{-h} \int_{x+h}^x \varepsilon dt = \varepsilon.$$

Finalement, on a donc

$$h \neq 0, |h| \leq \eta \Rightarrow \left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| \leq \varepsilon.$$

Ceci prouve bien (5.5) et termine le 1er item du théorème 5.2, c'est-à-dire  $F$  est dérivable et  $F' = f$ .

Pour montrer le deuxième item, soit  $G$  une primitive de  $f$ . On a donc, pour tout  $y \in ]\alpha, \beta[$ ,  $F'(y) = G'(y) = f(y)$ . Soit  $x \in ]\alpha, \beta[$ ,  $x \neq a$ . En appliquant le théorème des accroissements finis (théorème 3.2) à la fonction  $G - F$  sur l'intervalle dont les bornes sont  $a$  et  $x$ , il existe  $y$  entre  $a$  et  $x$  t.q.

$$(G(x) - F(x)) - (G(a) - F(a)) = (x - a)(G'(y) - F'(y)) = 0.$$

La fonction  $G - F$  est donc constante (et égale à  $G(a) - F(a)$ , c'est-à-dire à  $G(a)$ ).

Bien sûr, on en déduit que  $F$  est la seule primitive de  $f$  s'annulant en  $a$ . ■

Une conséquence du théorème 5.2 est que l'on peut calculer des intégrales en recherchant des primitives. Plus précisément, soit  $-\infty \leq \alpha < \beta \leq \infty$  et  $f$  une fonction continue de  $] \alpha, \beta [$  dans  $\mathbb{R}$ . Soit  $a, b \in ] \alpha, \beta [$ . Pour calculer  $\int_a^b f(t)dt$ , on recherche une primitive de  $f$ , notée  $F$ . On a alors  $\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$ . Par exemple, Pour calculer de  $\int_0^1 t^2 dt$ , on cherche une primitive de  $x \mapsto x^2$ . Une primitive est l'application  $x \mapsto \frac{x^3}{3}$  et on obtient ainsi  $\int_0^1 t^2 = \frac{1}{3}$ .

**Remarque 5.8** Soit  $-\infty \leq \alpha < \beta \leq \infty$  et  $f$  de  $] \alpha, \beta [$  dans  $\mathbb{R}$ , de classe  $C^1$ . On a alors, pour tout  $a, b \in ] \alpha, \beta [$ ,  $f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t)dt$ . En effet, pour  $x \in ] \alpha, \beta [$ , on pose

$$F(x) = \int_a^x f'(t)dt \quad \text{et} \quad G(x) = f(x) - f(a).$$

Les fonctions  $F$  et  $G$  sont donc deux primitives, s'annulant en  $a$ , de la fonction continue  $f'$ . Le théorème 5.2 donne donc que  $F = G$ , c'est-à-dire  $F(b) = G(b)$  pour tout  $b \in ] \alpha, \beta [$ .

Voici un exemple d'application de cette égalité, en utilisant la monotonie de l'intégrale. Si  $b > a$ , on déduit de l'égalité précédente :

$$m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a),$$

avec  $m = \min\{f'(x), x \in [a, b]\}$  et  $M = \max\{f'(x), x \in [a, b]\}$ . (Ceci a déjà été montré précédemment, mais d'une manière différente, en utilisant directement le théorème des accroissements finis, théorème 3.2.)

## 5.5 Intégration par parties, formule de Taylor

**Proposition 5.7 (intégration par parties)** Soit  $-\infty \leq \alpha < \beta \leq \infty$  et  $f, g$  deux applications continues de  $] \alpha, \beta [$  dans  $\mathbb{R}$ , de classe  $C^1$ . On a alors, pour tout  $a, b \in ] \alpha, \beta [, a < b$  :

$$\int_a^b f'(x)g(x)dx = - \int_a^b f(x)g'(x)dx + f(b)g(b) - f(a)g(a).$$

DÉMONSTRATION : la fonction  $fg$  est aussi de classe  $C^1$  sur  $] \alpha, \beta [$ . La remarque 5.8 donne donc, comme  $(fg)' = f'g + fg'$ ,

$$f(b)g(b) - f(a)g(a) = \int_a^b (fg)'(t)dt = \int_a^b (f'(x)g(x) + f(x)g'(x))dx.$$

La linéarité de l'intégrale (proposition 5.5) donne alors

$$\int_a^b f'(x)g(x)dx = - \int_a^b f(x)g'(x)dx + f(b)g(b) - f(a)g(a).$$

Ce qui termine la démonstration. ■

On donne maintenant la formule de Taylor avec reste intégral, plus précise que les formules de Taylor-Young et Taylor-Lagrange.

**Proposition 5.8 (Taylor, reste intégral)** Soit  $-\infty \leq \alpha < \beta \leq \infty$  et  $f$  une application de  $] \alpha, \beta [$  dans  $\mathbb{R}$ . Soit  $a, b \in ] \alpha, \beta [$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ . On suppose que  $f$  est de classe  $C^n$ . On a alors :

1. Si  $n = 1$ ,  $f(b) = f(a) + (b-a) \int_0^1 f'(tb + (1-t)a)dt$ .
2. Si  $n = 2$ ,  $f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + (b-a)^2 \int_0^1 (1-t)f''(tb + (1-t)a)dt$ .
3. Si  $n > 2$ ,  $f(b) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + (b-a)^n \int_0^1 \frac{(1-t)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(tb + (1-t)a)dt$ .

DÉMONSTRATION : On commence par montrer la proposition si  $a = 0$ ,  $b = 1$  (et donc  $\alpha < 0$  et  $\beta > 1$ ).

Soit  $\varphi$  une fonction de classe  $C^1$  sur  $] \alpha, \beta [$  (l'intervalle  $] \alpha, \beta [$  est donc simplement un intervalle ouvert contenant l'intervalle fermé  $[0, 1]$ ). La remarque 5.8 donne

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \varphi'(t)dt.$$

Ceci donne l'item 1 de la proposition 5.8.

On suppose maintenant que  $\varphi$  est de classe  $C^2$ . On utilise la proposition 5.7 avec  $f(x) = x - 1$  et  $g(x) = \varphi'(x)$ . On obtient

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \varphi'(t)dt = - \int_0^1 (x-1)\varphi''(x)dx + f(1)\varphi'(1) - f(0)\varphi'(0) = \int_0^1 (1-x)\varphi''(x)dx + \varphi'(0).$$

Ceci montre le deuxième item de la proposition 5.8. On montre ensuite le troisième item de la proposition 5.8 en faisant une récurrence et en utilisant la proposition 5.7 (on passe de  $n$  à  $n+1$  en prenant, dans la proposition 5.7,  $f(x) = -\frac{1}{n}(1-x)^n$  et  $g(x) = \varphi^{(n)}$ ). Ceci est laissé en exercice.

Pour montrer le cas général de la proposition 5.8, on se ramène au cas  $a = 0$  et  $b = 1$  en posant

$$\varphi(t) = f(tb + (1 - t)a).$$

La fonction  $\varphi$  est bien définie sur un intervalle ouvert contenant  $[0, 1]$ . Elle a la même régularité que  $\varphi$  (c'est-à-dire que  $\varphi$  est de classe  $C^n$  si  $f$  est de classe  $C^n$ ) et on obtient les dérivées de  $\varphi$  à partir de celle de  $f$ . Plus précisément, on a, pour  $t \in [0, 1]$ ,  $\varphi'(t) = (b - a)f'(tb + (1 - t)a)$  et donc, par récurrence sur  $n$ , pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\varphi^{(n)}(t) = (b - a)^n f^{(n)}(tb + (1 - t)a).$$

On trouve alors facilement la formule de Taylor de  $f$  à partir de celle pour  $\varphi$ . ■

## 5.6 Théorème de convergence

**Question :** Soit  $-\infty < a < b < \infty$ ,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de  $C([a, b])$  et  $f \in C([a, b])$ .

On suppose que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x)$  pour tout  $x \in [a, b]$  (on dit que  $f_n$  converge simplement vers  $f$ .)

A-t-on  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$  ? (i.e. peut-on intervertir  $\lim$  et  $\int$ )

**Réponse :** En général, la réponse est non ! mais la réponse est “oui” si la convergence de  $f_n$  vers  $f$  est uniforme, comme le montre le théorème 5.3.

**Théorème 5.3 (Convergence uniforme donne convergence en moyenne)** Soit  $-\infty < a < b < \infty$ ,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de  $C([a, b])$  et  $f \in C([a, b])$ . On suppose que  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge uniformément vers  $f$ . Alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

On a même

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx = 0.$$

DÉMONSTRATION : On pose

$$\varepsilon_n = \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)|.$$

(On peut noter d'ailleurs que ce “sup” est atteint, c'est-à-dire qu'il existe  $x_n \in [a, b]$  t.q.  $|f_n(x_n) - f(x_n)| = \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)|$ .)

La convergence uniforme de  $f_n$  vers  $f$  donne  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n = 0$ . Par monotonie de l'intégrale, on a donc

$$\int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \leq (b - a)\varepsilon_n,$$

on en déduit bien

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx = 0.$$

Puis, les items 2 et 4 de la proposition 5.5 donne

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| = \left| \int_a^b (f_n(x) - f(x)) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \leq (b - a)\varepsilon_n.$$

On a donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$ . ■

**Remarque 5.9** Soit  $-\infty < a < b < \infty$ ,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de  $C([a, b])$  et  $f \in C([a, b])$ . Nous avons maintenant 3 définitions différentes de convergence :

1. Convergence simple,
2. convergence uniforme,
3. convergence en moyenne (c'est-à-dire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx = 0$ ).

On a : 2)  $\Rightarrow$  1), 2)  $\Rightarrow$  3) (théorème 5.3) mais, on peut montrer : 1)  $\not\Rightarrow$  2), 1)  $\not\Rightarrow$  3), 3)  $\not\Rightarrow$  1), 3)  $\not\Rightarrow$  2).

## 5.7 Exercices

### Exercice 5.1 (Bolzano-Weierstrass)

Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de points de  $[a, b]$ .

1. Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $a_n = \inf\{x_p, p \geq n\}$ . Montrer que la suite  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est une suite croissante majorée. En déduire qu'il existe  $x \in [a, b]$  t.q.  $a_n \rightarrow x$  quand  $n \rightarrow +\infty$ .
2. Montrer que, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , il existe  $\varphi(n) \geq n$  t.q.  $|x_{\varphi(n)} - a_n| \leq \frac{1}{n}$  (où  $a_n$  est défini à la question précédente). En déduire que  $x_{\varphi(n)} \rightarrow x$  quand  $n \rightarrow +\infty$  (où  $x$  est défini à la question précédente).

### Exercice 5.2 (Théorème de Heine)

Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f$  une application de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ .

1. On suppose que  $f$  n'est pas uniformément continue.
  - (a) Montrer qu'il existe  $\varepsilon > 0$  t.q., pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , il existe  $x_n, y_n \in [a, b]$  t.q.  $|x_n - y_n| \leq \frac{1}{n}$  et  $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$ .
  - (b) Montrer qu'il existe un point  $x \in [a, b]$  t.q.  $f$  ne soit pas continue en  $x$ . [Utiliser l'exercice 5.1.]
2. On suppose que  $f$  est continue (sur  $[a, b]$ ). Montrer que  $f$  est uniformément continue (sur  $[a, b]$ ).

### Exercice 5.3 (Calcul de primitives)

1. Soit  $f$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  définie par  $f(x) = x^4 + 3x^2 - x$ . Calculer  $F$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  t.q.  $F' = f$  et  $F(0) = 0$ .
2. Soit  $f$  de  $\mathbb{R}_+$  dans  $\mathbb{R}$  définie par  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ . Calculer  $F$  de  $\mathbb{R}_+$  dans  $\mathbb{R}$  t.q.  $F' = f$  et  $F(0) = 0$ .
3. Soit  $f$  de  $\mathbb{R}_+^*$  dans  $\mathbb{R}$  définie par  $f(x) = \frac{x^4 + x^2 - 1}{x^2}$ . Calculer  $F$  de  $\mathbb{R}_+^*$  dans  $\mathbb{R}$  t.q.  $F' = f$  et  $F(1) = 0$ .

### Exercice 5.4 (Formule de la moyenne)

Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f$  une application continue de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . On note  $\text{Im}(f) = \{f(x), x \in [a, b]\}$ ,  $m = \inf(\text{Im}(f))$  et  $M = \sup(\text{Im}(f))$ .

1. Montrer qu'il existe  $\mu \in [m, M]$  t.q. :

$$\int_a^b f(x) dx = \mu(b - a).$$

2. Montrer qu'il existe  $c \in [a, b]$  t.q. :

$$\int_a^b f(x)dx = f(c)(b - a).$$

**Exercice 5.5 (Intégrale d'une fonction positive)**

Soit  $-\infty < a < b < \infty$  et  $f$  une application continue de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f(x) \geq 0$  pour tout  $x \in [a, b]$ , et qu'il existe  $c \in [a, b]$  t.q.  $f(c) > 0$ . Montrer que  $\int_a^b f(x)dx > 0$ .

**Exercice 5.6 (Intégrale impropre)**

On définit l'application  $f$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  par :

$$\begin{aligned} f(x) &= 0, \text{ si } x \leq 0, \\ f(x) &= x^2 \sin \frac{1}{x^2}, \text{ si } x > 0. \end{aligned}$$

1. Montrer que  $f$  est continue et dérivable en tout point de  $\mathbb{R}$ .
2. Montrer que  $f'$  est continue en tout point sauf 0.
3. Soit  $0 < a < b < \infty$ . Montrer que :

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t)dt.$$

4. Soit  $a > 0$ . Pour  $0 < x < a$ , on pose,  $g(x) = \int_x^a f'(t)dt$ . Montrer que  $g(x)$  a une limite (dans  $\mathbb{R}$ ) quand  $x \rightarrow 0$ , avec  $x > 0$ . On note (improprement... car  $f'$  n'est pas continue sur  $[0, a]$ )  $\int_0^a f'(t)dt$  cette limite. Montrer que :

$$f(a) - f(0) = \int_0^a f'(t)dt.$$

**Exercice 5.7 (Calcul d'intégrales)**

Calculer les intégrales suivantes :

$$\int_0^3 x^3 dx, \quad \int_1^4 \frac{x^2 - 1}{x^2} dx, \quad \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx.$$

**Exercice 5.8 (Convergence de l'intégrale)**

Soit  $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite d'applications continues de  $[0, 1]$  dans  $\mathbb{R}$  et  $\varphi$  une application continue de  $[0, 1]$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $\varphi_n \rightarrow \varphi$  simplement quand  $n \rightarrow \infty$  (c'est-à-dire que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi_n(x) = \varphi(x)$ , pour tout  $x \in [0, 1]$ ).

1. Montrer que si  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |\varphi_n(x) - \varphi(x)| dx = 0$ , alors  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \varphi_n(x) dx = \int_0^1 \varphi(x) dx$ .
2. Montrer que si  $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge uniformément vers  $\varphi$ , alors  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \varphi_n(x) dx = \int_0^1 \varphi(x) dx$ .

3. Donner un exemple pour lequel  $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ne converge pas uniformément vers  $\varphi$  et :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \varphi_n(x) dx = \int_0^1 \varphi(x) dx.$$

4. Donner un exemple pour lequel  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \varphi_n(x) dx \neq \int_0^1 \varphi(x) dx$ .

5. Si la suite  $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  satisfait les deux conditions :

- (a) Pour tout  $\varepsilon$ ,  $0 < \varepsilon < 1$ ,  $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge uniformément vers  $\varphi$  sur  $[\varepsilon, 1]$ ,
- (b) Les  $\varphi_n$  sont à valeurs dans  $[-1, +1]$ ,

montrer que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \varphi_n(x) dx = \int_0^1 \varphi(x) dx$ .

### Exercice 5.9 (Linéarité de l'intégrale de Riemann)

Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ . On rappelle que  $R_{a,b}$  désigne l'ensemble des fonctions intégrables au sens de Riemann sur  $[a, b]$  (remarque 5.6). Montrer que  $R_{a,b}$  est un e.v. sur  $\mathbb{R}$  et que l'application  $f \mapsto \int_a^b f(x) dx$  est linéaire sur  $R_{a,b}$ .

### Exercice 5.10 (Changement de variable)

Soient  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  et  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue. Soient  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  et  $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction strictement croissante, de classe  $C^1$ , vérifiant  $\varphi(\alpha) = a$  et  $\varphi(\beta) = b$ .

1. Montrer que  $\varphi$  est une bijection de  $[\alpha, \beta]$  dans  $[a, b]$ .
2. Montrer que

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

[On pourra introduire  $G = F \circ \varphi$ , où  $F$  est une primitive de  $f$  sur  $[a, b]$ , et calculer  $G'$ .]

**Remarque.** L'égalité ci-dessus est appelée la formule du changement de variable. On dit qu'on calcule l'intégrale  $\int_a^b f(x) dx$  en faisant le changement de variable  $x = \varphi(t)$ .

3. Calculer les intégrales suivantes :

- (a)  $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$ . [On pourra considérer le changement de variable  $x = \sin t$ .]
- (b)  $\int_1^2 e^x \sin(e^x) dx$ . [On pourra considérer le changement de variable  $x = \ln t$ .]

Quelques exercices d'intégration

**Exercice 5.11**

Soient  $0 < a \leq b$ . Montrer que  $\int_a^b \frac{dt}{t} \leq \frac{b-a}{\sqrt{ab}}$ .

————— corrigé —————

Pour  $x \geq a$ , on pose  $f(x) = \int_a^x \frac{dt}{t} - \frac{x-a}{\sqrt{ax}}$ . La fonction  $f$  est donc continue de  $[a, +\infty[$  dans  $\mathbb{R}$  et  $f(a) = 0$ . On montre maintenant que  $f'(x) \leq 0$  pour tout  $x \in ]a, \infty[$  (on en déduit que  $f$  est décroissante et donc que  $f(x) \leq 0$  pour tout  $x \in [a, +\infty[$ , ce qui donne, en particulier,  $f(b) \leq 0$ ).

Soit  $x > a$ , on a

$$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{ax}} + \frac{x-a}{2x\sqrt{ax}} = \frac{2\sqrt{ax} - 2x + x - a}{2x\sqrt{ax}} = \frac{2\sqrt{ax} - x - a}{2x\sqrt{ax}} = \frac{-(\sqrt{x} - \sqrt{a})^2}{2x\sqrt{ax}} < 0.$$

**Exercice 5.12**

Soit  $f \in C^0([0, 1], \mathbb{R})$  telle que  $\int_0^1 f(t)dt = \frac{1}{2}$ . Montrer qu'il existe  $a \in ]0, 1[$  telle que  $f(a) = a$ . [On pourra s'intéresser à l'intégrale de  $x - f(x)$ .]

————— corrigé —————

Pour  $x \in [0, 1]$ , on pose  $g(x) = x - f(x)$ . la fonction  $g$  est continue de  $[0, 1]$  dans  $\mathbb{R}$  et

$$\int_0^1 g(x)dx = \int_0^1 xdx - \int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0. \tag{5.7}$$

Si  $g(x) > 0$  pour tout  $x \in ]0, 1[$ , on a alors (par continuité)  $g(x) \geq 0$  pour tout  $x \in [0, 1]$  et l'exercice 5.5 donne  $\int_0^1 g(x)dx > 0$ , en contradiction avec (5.7).

De même, si  $g(x) < 0$  pour tout  $x \in ]0, 1[$ , on a  $\int_0^1 g(x)dx < 0$ , en contradiction aussi avec (5.7).

On en déduit qu'il existe  $a \in ]0, 1[$  t.q.  $g(a) = 0$ , c'est-à-dire  $f(a) = a$ .

**Exercice 5.13**

Soit  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  une application continue strictement croissante telle que  $f(0) = 0$ ,  $f(1) = 1$ . Calculer  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f^n(t)dt$ .

————— corrigé —————

On va montrer que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f^n(t)dt = 0$ . Soit  $0 < \varepsilon < 1$ . Comme  $f$  est strictement croissante, on a, pour tout  $t \in [0, 1 - \varepsilon]$ ,

$$0 = f(0) \leq f(t) \leq f(1 - \varepsilon) < f(1) = 1 \text{ et donc } 0 \leq f^n(t) \leq f^n(1 - \varepsilon) < 1,$$

et, pour tout  $t \in [1 - \varepsilon, 1]$ ,  $0 \leq f(t) \leq 1$  et donc  $0 \leq f^n(t) \leq 1$ .

On en déduit que

$$0 \leq \int_0^1 f^n(t)dt \leq \int_0^{1-\varepsilon} f^n(1 - \varepsilon)dt + \int_{1-\varepsilon}^1 dt \leq f^n(1 - \varepsilon) + \varepsilon.$$

Comme  $f(1 - \varepsilon) < 1$ , il existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  t.q.  $f^{n_0}(1 - \varepsilon) \leq \varepsilon$ , on a donc

$$n \geq n_0 \Rightarrow 0 \leq \int_0^1 f^n(t) dt \leq 2\varepsilon,$$

ce qui prouve bien que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f^n(t) dt = 0$ .

---

### Exercice 5.14 (Intégration par parties)

Calculer les primitives des fonctions suivantes (définies de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ ) :  $f(x) = e^x \cos(x)$ ,  $g(x) = x \operatorname{Arctan}(x)$  et  $h(x) = (x^2 + x + 1)e^x$ .

————— corrigé —————

Ces trois primitives se trouvent en intégrant par parties. On calcule, par exemple, la première.

Soit  $x \in \mathbb{R}$ , on a  $\int_0^x e^t \cos t dt = -\int_0^x e^t \sin t dt + [e^t \sin t]_0^x = -\int_0^x e^t \sin t dt + e^x \sin x$ . On intègre maintenant une deuxième fois par parties, on obtient

$$\int_0^x e^t \cos t dt = -\int_0^x e^t \cos t dt + [e^t \cos t]_0^x + e^x \sin x = \int_0^x e^t \cos t dt + e^x(\sin x + \cos x) - 1.$$

Ce qui donne finalement  $\int_0^x e^t \cos t dt = \frac{e^x(\sin x + \cos x) - 1}{2}$ .

---

### Exercice 5.15

Calculer les intégrales :  $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + 2}$ ,  $\int_{-1/2}^{1/2} \frac{dx}{1 - x^2}$ ,  $\int_2^3 \frac{2x + 1}{x^2 + x - 3} dx$  et  $\int_{-2}^0 \frac{dx}{x^3 - 7x + 6}$ .

————— corrigé —————

La première se calcule avec un changement de variable. On obtient

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + 2} = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2 + 1} dx = \frac{\sqrt{2}}{2} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{1}{y^2 + 1} dy = \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

Les intégrales suivantes se calculent en utilisant une décomposition en éléments simples. On calcule, par exemple, la troisième. Comme  $x^3 - 7x + 6 = (x - 1)(x^2 + x - 6) = (x - 1)(x - 2)(x + 3)$ , on peut montrer qu'il existe  $a, b, c \in \mathbb{R}$  t.q.

$$\frac{1}{x^3 - 7x + 6} = \frac{a}{x - 1} + \frac{b}{x - 2} + \frac{c}{x + 3} \text{ pour tout } x \notin \{1, 2, -3\}.$$

On peut trouver les valeurs de  $a, b, c$  par identification (et montrer aussi ainsi l'existence de  $a, b, c$ ) mais le plus rapide est de remarquer que

$$\begin{aligned} a &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{x^3 - 7x + 6} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x - 2)(x + 3)} = -\frac{1}{4}, \\ b &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{x^3 - 7x + 6} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x - 1)(x + 3)} = \frac{1}{5}, \\ c &= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x + 3}{x^3 - 7x + 6} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{(x - 1)(x - 2)} = \frac{1}{20}. \end{aligned}$$

On peut maintenant calculer l'intégrale demandée

$$I = \int_{-2}^0 \frac{dx}{x^3 - 7x + 6} = a \int_{-2}^0 \frac{1}{x-1} dx + b \int_{-2}^0 \frac{1}{x-2} dx + c \int_{-2}^0 \frac{1}{x+3} dx.$$

Puis on a

$$\begin{aligned} \int_{-2}^0 \frac{1}{x-1} dx &= [\ln(1-x)]_{-2}^0 = -\ln 3, \\ \int_{-2}^0 \frac{1}{x-2} dx &= [\ln(2-x)]_{-2}^0 = -\ln 2, \\ \int_{-2}^0 \frac{1}{x+3} dx &= [\ln(x+3)]_{-2}^0 = \ln 3. \end{aligned}$$

On en déduit que  $I = \frac{\ln 3}{4} - \frac{\ln 2}{5} + \frac{\ln 3}{20} = \frac{3\ln 3 - 2\ln 2}{10}$ .

---

### Exercice 5.16

Evaluer les intégrales  $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$  et  $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ . Comparer  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$  avec  $\int_1^{n+1} \frac{dx}{x}$ . En déduire la valeur de

$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k}$ . Comparer la suite croissante  $u_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2}$  avec  $\int_1^n \frac{dx}{x^2}$ . En déduire que la somme  $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$  est finie.

**corrigé**

Soit  $f$  une fonction continue de  $[1, +\infty[$  dans  $\mathbb{R}$ . Si  $\int_1^a f(x) dx$  a une limite (finie ou infinie) quand  $a \rightarrow +\infty$ , on pose (ceci est une définition, non vue en cours)

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_1^a f(x) dx.$$

Comme  $\int_1^a \frac{dx}{x} = \ln a$ , on a donc  $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = +\infty$ .

Comme  $\int_1^a \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{a} + 1$ , on a donc  $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = 1$ .

Soit  $k \in \mathbb{N}^*$ , Pour  $x \in [k, k+1[$ , on pose  $g(x) = \frac{1}{k}$  (de sorte que  $g(x) = 1/k \geq 1/x$  car  $x \geq k$ ). Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , la fonction  $g$  est donc une fonction en escalier sur l'intervalle  $[1, n+1]$  et comme  $g(x) \geq 1/x$  pour tout  $x$ , on a

$$\int_1^{n+1} \frac{dx}{x} \leq \int_1^{n+1} g(x) dx = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

On en déduit que  $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \geq \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = +\infty$ .

Soit  $k \in \mathbb{N}^*$ , Pour  $x \in [k, k+1[$ , on pose  $h(x) = \frac{1}{k+1}$  (de sorte que  $h(x) = 1/(k+1) \leq 1/x$  car  $x \leq k+1$ ). Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , la fonction  $h^2$  est donc une fonction en escalier sur l'intervalle  $[1, n]$  et comme  $h^2(x) \leq 1/x^2$  pour tout  $x$ , on a

$$\int_1^n \frac{dx}{x^2} \geq \int_1^n h^2(x) dx = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2}.$$

On en déduit que  $\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} < +\infty$ .

---

**Exercice 5.17**

Pour  $t > 0$ , on pose  $f(t) = \frac{\sin t}{t}$ . On pose aussi  $f(0) = 0$ . Montrer que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}_+$ . Pour  $x > 0$ , on pose  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ ,  $G(x) = \int_0^x f(t) \sin t dt$ ,  $H(x) = \int_0^x f(t)^2 dt$ . Montrer que  $F(x)$  et  $H(x)$  ont des limites dans  $\mathbb{R}$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$ . Montrer que  $G(x)$  tend vers  $+\infty$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$ .

# Chapitre 6

## Courbes planes

### 6.1 Fonctions d'une variable réelle à valeur vectorielle

Dans ce paragraphe, on considèrera  $f$  une application de domaine de définition  $D \subset \mathbb{R}$  à valeurs dans  $\mathbb{R}^n$  où  $n \in \mathbb{N}^*$ .

#### 6.1.1 Limites et continuité

**Définition 6.1** On suppose que  $D \supset ]b, a[ \cup ]a, c[$  avec  $b < a < c$ . Pour chaque  $x \in ]b, a[ \cup ]a, c[$ ,  $f(x) \in \mathbb{R}^n$ . On note  $f_i(x)$  la  $i$ -ème composante de  $f(x)$ . On définit ainsi  $n$  applications de  $D$  dans  $\mathbb{R}$  :  $f_i : x \rightarrow f_i(x)$ . On dira que  $f$  admet une limite en  $a$  si chaque application  $f_i$  admet une limite en  $a$ . Si on note  $l_i = \lim_{x \rightarrow a} f_i(x)$  alors  $l = (l_1, \dots, l_n)$  est par définition la limite de  $f$  en  $a$  et on note  $l = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ . On a donc

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \Leftrightarrow \forall i \in 1, \dots, n, \lim_{x \rightarrow a} f_i(x) = l_i. \quad (6.1)$$

**Remarque 6.1** On peut définir la limite de  $f$  en un point  $a$  sans passer par les composantes. On définira dans le chapitre 7 la notion de norme sur  $\mathbb{R}^n$ . Alors  $f$  admet  $l$  comme limite en  $a$  si pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe  $\delta > 0$  t.q. :

$$x \in D, |x - a| \leq \delta \Rightarrow \|f(x) - l\| \leq \varepsilon$$

où  $\|f(x) - l\|$  désigne une norme du vecteur  $(f(x) - l)$ .

#### Exemple 6.1

$$f : x \in \mathbb{R} \rightarrow f(x) = (x^2, \cos x) \quad (6.2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = (0, 1).$$

On définit de manière évidente les limites à droite et à gauche et les limites aux bornes (éventuellement infinies) de  $D$  (en se ramenant aux composantes de  $f$ ).

**Définition 6.2** Si  $a \in D$ , on dit que  $f$  est continue en  $a$  si  $f$  admet une limite en  $a$  égale à  $f(a)$ .

De manière équivalente,  $f$  est continue en  $a$  si chacune des applications  $f_i$  est continue en  $a$ .

### 6.1.2 Dérivée et formule de Taylor-Young

De la même manière on définit la dérivée de  $f$  par

**Définition 6.3** Soit  $a \in D$ . On suppose qu'il existe  $b < a < c$  tels que  $]b, c[ \subset D$ .

1.  $f$  est dérivable en  $a$  si chacune des fonctions composantes  $f_i$  est dérivable en  $a$ . La dérivée de  $f$  en  $a$ , notée  $f'(a)$ , est définie par  $f'(a) = (f'_1(a), \dots, f'_n(a))$ . On a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a). \quad (6.3)$$

2. Si toutes les fonctions composantes sont dérivables en tout point de  $D$ , alors  $f$  est dérivable sur  $D$  et on peut définir la fonction vectorielle  $f' : x \in D \rightarrow f'(x) = (f'_1(x), \dots, f'_n(x))$ .

3. On définit de même pour  $k \in \mathbb{N}$ ,  $f^{(k)} = (f_1^{(k)}, \dots, f_n^{(k)})$ .

4.  $f \in C^k(D; \mathbb{R}^n)$  si  $f_i \in C^k(D; \mathbb{R})$ , pour tout  $1 \leq i \leq n$ .

**Exemple 6.2** Dans l'exemple 6.1,  $f$  est indéfiniment dérivable sur  $\mathbb{R}$  et on a

$$f'(x) = (2x, -\sin x), \quad (6.4)$$

$$f''(x) = (2, -\cos x), \quad (6.5)$$

et pour  $k > 2$

$$f^{(k)}(x) = (0, \cos(x + k\frac{\pi}{2})). \quad (6.6)$$

**Théorème 6.1 (Taylor-Young vectoriel)** Soit  $-\infty < \alpha < \beta < \infty$  et  $f$  de  $] \alpha, \beta [$  dans  $\mathbb{R}^n$ . On suppose  $f$  de classe  $C^p$ ,  $p \geq 1$ . Soit  $a \in ] \alpha, \beta [$ . Alors pour tout  $x \in ] \alpha, \beta [$ ,

$$f(x) = \sum_{k=0}^p \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + (x-a)^p \varepsilon(x), \quad \text{avec } \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0. \quad (6.7)$$

On dit que  $(x-a)^p \varepsilon(x)$  est un "petit o" de  $(x-a)^p$  dans  $\mathbb{R}^n$  lorsque  $x$  tend vers  $a$  et on note  $(x-a)^p \varepsilon(x) = o(x-a)^p$ .

## 6.2 Courbes paramétrées planes

Une courbe paramétrée dans un plan  $P$  muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  décrit l'ensemble des points  $M(x, y)$  du plan  $P$  tels que  $(x, y)$  dépendent d'un paramètre réel (qu'on a l'habitude de noter  $t$ ):

$$\vec{OM}(t) = x(t) \vec{i} + y(t) \vec{j} \quad (6.8)$$

**Définition 6.4** On appelle courbe paramétrée dans le plan une application d'une partie  $D$  de  $\mathbb{R}$  dans le plan  $P$  qui à tout réel  $t \in D$  associe un point  $M(t)$  du plan  $P$  de coordonnées  $(x(t), y(t))$ .  $S = \{M(t); t \in D\}$  est le support géométrique de la courbe paramétrée. Si  $D = [a, b]$  on dit que la courbe paramétrée est un arc d'extrémités  $A(x(a), y(a))$  et  $B(x(b), y(b))$ . Le système  $F$  qui à  $t \in D$  associe

$$F(t) = \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (6.9)$$

est appelé représentation paramétrique de la courbe  $S$ .

**Exemple 6.3** 1. Un segment de droite:  $[AB]$ . On peut choisir

$$F : t \in [0, 1] \rightarrow \begin{cases} x = x_a + t(x_b - x_a) \\ y = y_a + t(y_b - y_a). \end{cases} \quad (6.10)$$

On a

$$F(0) = (x_a, y_a) \quad (6.11)$$

$$F(1) = (x_b, y_b), \quad (6.12)$$

$$M(x, y) \in [AB] \Leftrightarrow \exists t \in [0, 1] \text{ t.q. } (x, y) = F(t). \quad (6.13)$$

2. Le graphe d'une fonction d'une variable réelle est une courbe paramétrée :

Soit  $f$  une fonction continue sur  $[a, b]$  et  $C_f$  son graphe.

$$F : t \in [a, b] \rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = f(t) \end{cases} \quad (6.14)$$

est bien une représentation paramétrique de la courbe  $C_f$ .

3. Un arc de cercle.

Soit  $A$  et  $B$  deux points d'un cercle  $C$  de centre  $\omega$  et de rayon  $R$ . Soit  $(\alpha, \beta)$  les coordonnées de  $\omega$  dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  du plan où est situé  $C$ . Soit  $\theta_a \in [0, 2\pi[$ , l'angle orienté  $(\vec{Ox}, \vec{\omega A})$  et  $\theta_b$  l'angle  $(\vec{Ox}, \vec{\omega B})$ . L'arc  $AB$  peut être décrit par le paramétrage suivant

$$F : t \in [\theta_a, \theta_b] \rightarrow \begin{cases} x = \alpha + R \cos t \\ y = \beta + R \sin t \end{cases} . \quad (6.15)$$

4. Une ellipse

$$F : t \in [0, 2\pi[ \rightarrow \begin{cases} x = \alpha + a \cos t \\ y = \beta + b \sin t \end{cases} . \quad (6.16)$$

**Remarque 6.2** Il n'y a pas unicité de la représentation paramétrique d'une courbe. A un même support  $S$  est associée une infinité de représentations paramétriques. Par exemple

1.  $t \in [0, 2\pi]$ ,

$$F_1(t) = (\alpha + R \cos t, \beta + R \sin t) \quad (6.17)$$

2.  $t \in [0, 2\pi]$ ,

$$F_2(t) = (\alpha + R \cos t, \beta - R \sin t) \quad (6.18)$$

Le support de ces 2 courbes paramétrées est le cercle de centre  $\omega$  et de rayon  $R$ . Dans le cas de  $F_1$ , le cercle est parcouru dans le sens direct, et dans le sens inverse dans l'autre cas.

Si  $F$  est une représentation paramétrique d'une courbe  $S$  et  $\phi$  une application surjective de  $D'$  dans  $D$ , alors  $F \circ \phi$  est une autre représentation paramétrique de la même courbe  $S$ .

## 6.3 Etude de courbes planes

Soit une courbe paramétrée  $S$  définie par une représentation paramétrique  $(I, F)$ , où  $I$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $F$  une fonction vectorielle de  $I$  dans  $\mathbb{R}^2$ . On notera  $(x(t), y(t))$  les composantes de  $F$ . L'objet de ce paragraphe est l'étude jusqu'au tracé de  $S$ .

### 6.3.1 Domaine d'étude

On va commencer par essayer de réduire le domaine d'étude de  $F$ .

#### Périodicité

Si les fonctions  $x, y$  sont périodiques, on cherche le plus petit  $T > 0$  tel que

$$\forall t \in I, x(t+T) = x(t) \text{ et } y(t+T) = y(t). \quad (6.19)$$

La fonction  $F$  sera  $T$  périodique.  $T$  peut s'obtenir en cherchant le p.p.c.m des périodes de  $x$  et  $y$ . Si un tel  $T$  existe, la courbe  $S$  sera entièrement décrite lorsque  $t$  parcourt  $I \cap [a, a+T]$  où  $a \in \mathbb{R}$ .

#### Exemple 6.4

$$I = \mathbb{R}, \text{ et } F(t) = (\cos^3 t, \sin 2t) \quad (6.20)$$

$x$  est  $2\pi$  périodique,  $y$  est  $\pi$  périodique, donc  $F$  est  $2\pi$  périodique. On peut réduire le domaine d'étude à tout intervalle de longueur  $2\pi$ .

#### Symétries

Supposons que  $I$  soit un intervalle centré à l'origine.

Si pour tout  $t \in I$

1. 
$$x(-t) = x(t), \text{ et } y(-t) = -y(t) \quad (6.21)$$

alors  $Ox$  est axe de symétrie.

2. 
$$x(-t) = -x(t), \text{ et } y(-t) = y(t) \quad (6.22)$$

alors  $Oy$  est axe de symétrie.

3. 
$$x(-t) = -x(t), \text{ et } y(-t) = -y(t) \quad (6.23)$$

alors  $O$  est centre de symétrie.

### 6.3.2 Tangente en un point à une courbe pararamétrée

**Définition 6.5** Soit  $M_0(x(t_0), y(t_0)) \in S$  et  $M = F(t_0 + h)$  (pour  $h$  tel que  $t_0 + h \in I$ ). On dit que  $S$  admet une demi-tangente en  $M_0$  si  $\frac{\overrightarrow{M_0M}}{M_0M}$  admet une limite quand  $h \rightarrow 0^+$ . De même si  $h \rightarrow 0^-$ . On dit que  $S$  admet une tangente en  $M_0$  si elle admet des demi-tangentes colinéaires (elles seront égales ou opposées, et non nulles). Ces demi-tangentes définissent alors une unique droite passant par  $M_0$ , appelée la tangente à  $S$  en  $M_0$ .

De manière plus intuitive, la tangente à  $S$  en  $M_0$  est la “limite” de la droite  $MM_0$  lorsque  $M$  tend vers  $M_0$  en restant sur  $S$  (il resterait à préciser le sens de la limite d’une droite).

**Exemple 6.5** Si

$$F(t) = \begin{cases} (e^{-1/t}, 0) & \text{si } t \geq 0, \\ (0, e^{-1/t}) & \text{si } t < 0, \end{cases} \quad (6.24)$$

alors la courbe  $S$  possède deux demi-tangentes non colinéaires (et  $F$  est pourtant  $C^\infty$ ).

**Définition 6.6** Supposons que  $F$  soit dérivable en  $t_0 \in I$ . Si  $F'(t_0) \neq 0$ ,  $M_0$  est appelé un point régulier de  $S$  et sinon, il est appelé point stationnaire.

**Proposition 6.1 (Tangente en un point stationnaire)** Soit  $t_0 \in I$ . Si  $F$  est dérivable en  $t_0$  et si  $F'(t_0) \neq 0$ , alors  $S$  admet une tangente en  $M_0$  et un de ses vecteurs directeurs est  $\vec{v} = x'(t_0)\vec{i} + y'(t_0)\vec{j}$ .

Soit  $M = F(t_0 + \Delta t) \in S$ . La droite  $(M_0M)$  a pour vecteur directeur

$$\frac{F(t_0 + \Delta t) - F(t_0)}{\Delta t} \quad (6.25)$$

Lorsque  $\Delta t$  tends vers 0,

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{F(t_0 + \Delta t) - F(t_0)}{\Delta t} = F'(t_0). \quad (6.26)$$

Ainsi dans le repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ , un vecteur directeur de la tangente à la courbe en  $M_0$  est

$$x'(t_0)\vec{i} + y'(t_0)\vec{j}. \quad (6.27)$$

La tangente admet la représentation paramétrique suivante

$$\begin{cases} x(\theta) = x(t_0) + x'(t_0)\theta \\ y(\theta) = y(t_0) + y'(t_0)\theta \end{cases} \quad (\theta \in \mathbb{R}), \quad (6.28)$$

et l’équation cartésienne

$$y'(t_0)(x - x(t_0)) - x'(t_0)(y - y(t_0)) = 0. \quad (6.29)$$

**Proposition 6.2 (Tangente en un point stationnaire)** S’il existe  $k \in \mathbb{N}^*$  tel que  $F$  soit dérivable jusqu’à l’ordre  $k$  en  $t_0$  et tel que  $F^{(k)}(t_0) \neq 0$ , alors  $S$  admet une tangente en  $M_0$ . Elle a pour vecteur directeur la première dérivée  $F^{(p)}(t_0)$  non nulle.

La tangente admet la représentation paramétrique suivante

$$\begin{cases} x(\theta) = x(t_0) + x^{(p)}(t_0)\theta \\ y(\theta) = y(t_0) + y^{(p)}(t_0)\theta \end{cases} \quad (\theta \in \mathbb{R}), \quad (6.30)$$

et l’équation cartésienne

$$y^{(p)}(t_0)(x - x(t_0)) - x^{(p)}(t_0)(y - y(t_0)) = 0. \quad (6.31)$$

### 6.3.3 Position de la courbe par rapport à la tangente

Supposons que  $F$  soit suffisamment dérivable. Soit  $t_0 \in I$ . S'il existe  $k \in \mathbb{N}^*$  tel que  $F$  soit dérivable jusqu'à l'ordre  $k$  en  $t_0$  et tel que  $F^{(k)}(t_0) \neq 0$ , soit  $p = \min\{k \in \mathbb{N}^*; F^{(k)}(t_0) \neq 0\}$ . Soit  $q$  le plus petit entier  $> p$  (s'il existe) tel que les vecteurs  $(F^{(p)}(t_0), F^{(q)}(t_0))$  forment une base de  $\mathbb{R}^2$ . Posons

$$\overrightarrow{u}(t_0) = x^{(p)}(t_0) \overrightarrow{i} + y^{(p)}(t_0) \overrightarrow{j} \quad (6.32)$$

$$\overrightarrow{v}(t_0) = x^{(q)}(t_0) \overrightarrow{i} + y^{(q)}(t_0) \overrightarrow{j} \quad (6.33)$$

La formule de Taylor-Young vectorielle donne

$$F(t_0 + h) = F(t_0) + F^{(p)}(t_0) \frac{h^p}{p!} + \sum_{k=p+1}^{k=q-1} F^{(k)}(t_0) \frac{h^k}{k!} + F^{(q)}(t_0) \frac{h^q}{q!} + h^q \varepsilon(h). \quad (6.34)$$

Comme pour  $p \leq k \leq (q-1)$  les vecteurs  $F^{(p)}(t_0), F^{(k)}(t_0)$  sont linéairement dépendants, il existe des scalaires  $\lambda_k$  tels que  $F^{(k)}(t_0) = \lambda_k F^{(p)}(t_0)$ , pour tout  $p \leq k \leq (q-1)$ . On obtient donc

$$F(t_0 + h) = F(t_0) + F^{(p)}(t_0) \sum_{k=p}^{k=q-1} \lambda_k \frac{h^k}{k!} + F^{(q)}(t_0) \frac{h^q}{q!} + h^q \varepsilon(h). \quad (6.35)$$

Lorsque  $h \rightarrow 0$ ,  $\frac{h^p}{p!}$  et  $\frac{h^q}{q!}$  sont des équivalents des coordonnées  $(x(t_0 + h), y(t_0 + h))$  de  $F(t_0 + h)$  dans le repère  $(M_0, \overrightarrow{u}(t_0), \overrightarrow{v}(t_0))$ . On en déduit

1.  $p$  impair et  $q$  pair:

La courbe est d'un même côté par rapport à la tangente et de part et d'autre de l'axe passant par  $M_0$  et porté par le vecteur  $\overrightarrow{v}(t_0)$ . On dit que  $M_0$  est un *méplat* ou *point ordinaire*.

2.  $p$  impair et  $q$  impair:

La courbe traverse la tangente et l'axe passant par  $M_0$  et porté par le vecteur  $\overrightarrow{v}(t_0)$ .  $M_0$  est appelé *point d'inflexion*.

3.  $p$  pair et  $q$  impair:

La courbe traverse la tangente et est située d'un même côté par rapport à l'axe passant par  $M_0$  et porté par le vecteur  $\overrightarrow{v}(t_0)$ .  $M_0$  est appelé *point de rebroussement de première espèce*.

4.  $p$  pair et  $q$  pair:

La courbe est située d'un même côté par rapport à la tangente et l'axe passant par  $M_0$  et porté par le vecteur  $\overrightarrow{v}(t_0)$ .  $M_0$  est appelé *point de rebroussement de seconde espèce*.

**Définition 6.7**  $M(t_0)$  est appelé *point birégulier* si  $(F'(t_0), F''(t_0))$  forment une base.

**Exemple 6.6** Soit  $F(t) = (t^2 + t^4, t^3 - t^4)$ .  $F$  est indéfiniment dérivable sur  $\mathbb{R}$ ;  $M(0) = (0, 0)$  est un point stationnaire. Par contre  $F''(0) = (2, 0)$  et  $F^{(3)}(0) = (0, 6)$ . Donc  $p = 2, q = 3$ . L'origine est donc un point de rebroussement de première espèce.

#### Remarque 6.3

Lorsque  $M(t_0)$  est un point birégulier, le signe du déterminant formé par  $(F'(t_0), F''(t_0))$ :

$$x'(t_0)y''(t_0) - x''(t_0)y'(t_0)$$

donne la concavité de la courbe au point  $M(t_0)$ . Plus précisément, on a

1.  $x'(t_0)y''(t_0) - x''(t_0)y'(t_0) > 0$ , alors la courbe “tourne en  $M(t_0)$  dans le sens direct” (dans une orientation directe “classique”, la courbe “tourne à gauche”, elle tourne sa concavité vers le haut.
2.  $x'(t_0)y''(t_0) - x''(t_0)y'(t_0) < 0$ , alors la courbe “tourne en  $M(t_0)$  dans le sens indirect” (dans une orientation directe “classique”, la courbe “tourne à droite”, elle tourne sa concavité vers le bas.

### 6.3.4 Branches infinies

**Définition 6.8** On dit que la courbe  $S$  de représentation paramétrique  $(I, F)$  admet une branche infinie quand  $t \rightarrow t_0$  où  $t_0$  peut être fini ou  $\infty$ , quand l'une ou l'autre des composantes  $x(t)$  ou  $y(t)$  tend vers l'infini.

1. Si  $\lim_{t \rightarrow t_0} |x(t)| = \infty$  et  $\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = y_0$  (fini) alors la droite  $y = y_0$  est asymptote.
2. Si  $\lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = x_0$  (fini) et  $\lim_{t \rightarrow t_0} |y(t)| = \infty$  alors la droite  $x = x_0$  est asymptote.
3. Si  $\lim_{t \rightarrow t_0} |x(t)| = \infty$  et  $\lim_{t \rightarrow t_0} |y(t)| = \infty$  on étudie la limite de  $\frac{y}{x}$  quand  $t \rightarrow t_0$ .
  - (a) Si  $\lim_{t \rightarrow t_0} \left| \frac{y(t)}{x(t)} \right| = \infty$  (respectivement 0), la courbe admet une branche parabolique de direction asymptotique  $(Oy)$  (respectivement  $(Ox)$ ).
  - (b) Si  $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y(t)}{x(t)} = a \in \mathbb{R}^*$ , la courbe admet une branche parabolique de direction asymptotique  $y = ax$ .
    - i. Si  $\lim_{t \rightarrow t_0} |y(t) - ax(t)| = \infty$ , la courbe admet une branche parabolique de direction asymptotique  $y = ax$ .
    - ii. Si  $\lim_{t \rightarrow t_0} (y(t) - ax(t)) = b$ , (fini), la courbe admet une asymptote d'équation  $y = ax + b$ . La précision de la position de la courbe par rapport à l'asymptote s'obtient en étudiant le signe au voisinage de  $t_0$  de  $y(t) - ax(t) - b$ .

**Exemple 6.7** 1.  $F(t) = \left( \frac{t^2}{t^2-1}, \frac{t}{t-1} \right)$ . La courbe est définie sur  $] -\infty, -1[ \cup ] -1, 1[ \cup ] 1, +\infty[$ . En  $\pm\infty$  les limites sont finies, la courbe n'a donc pas d'asymptote en  $\pm$ . Par contre

$$\lim_{t \rightarrow (-1)^-} x(t) = +\infty, \text{ et } \lim_{t \rightarrow (-1)^-} y(t) = \frac{1}{2}. \quad (6.36)$$

Donc  $y = \frac{1}{2}$  est asymptote horizontale en  $t = (-1)^-$ . De même

$$\lim_{t \rightarrow (-1)^+} x(t) = -\infty, \text{ et } \lim_{t \rightarrow (-1)^+} y(t) = \frac{1}{2}, \quad (6.37)$$

et  $y = \frac{1}{2}$  est asymptote horizontale en  $t = (-1)^+$ . De plus

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} x(t) = -\infty, \text{ et } \lim_{t \rightarrow 1^+} x(t) = +\infty, \quad (6.38)$$

et

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{y(t)}{x(t)} = 2. \quad (6.39)$$

On calcule alors

$$\lim_{t \rightarrow 1} (y(t) - 2x(t)) = -\frac{1}{2}. \quad (6.40)$$

On en déduit donc que la droite  $y = 2x - \frac{1}{2}$  est asymptote à la courbe. Pour connaître la position de la courbe par rapport à l'asymptote, on étudie

$$s(t) = y(t) - 2x(t) + \frac{1}{2} = \frac{1-t}{2(1+t)}.$$

On obtient que

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} s(t) = 0^+,$$

donc la courbe est au-dessus de l'asymptote, et on obtient que

$$\lim_{t \rightarrow 1^+} s(t) = 0^-,$$

donc la courbe est au-dessous de l'asymptote.

2.  $F(t) = (t + \frac{1}{t}, t + \frac{1}{2t^2})$ . On peut montrer qu'on a des branches infinies en  $0, \pm\infty$ . En  $\pm\infty$ , on montre que la droite  $y = x$  est asymptote et qu'elle est au-dessus de l'asymptote en  $-\infty$  et au-dessous en  $+\infty$ . En  $t = 0$ , la courbe présente une direction asymptotique verticale. Il n'y a pas d'asymptote, mais une branche parabolique.

### 6.3.5 Points multiples

#### Définition 6.9

S'il existe  $t_1 \neq t_2$  tels que  $F(t_1) = F(t_2)$ , le point  $M$  de coordonnées  $(x(t_1) = x(t_2), y(t_1) = y(t_2))$  est appelé point double (voire multiple s'il y a plusieurs valeurs de  $t$  qui correspondent au même point).

**Exemple 6.8**  $F(t) = (\frac{t^2+t-2}{t(t-2)}, \frac{t^2+t-2}{t-2})$ . La courbe est définie sur  $] -\infty, 0[ \cup ]0, 2[ \cup ]2, +\infty[$ .  $(0, 0)$  est un point double qui correspond aux valeurs  $t = 1$  et  $t = -2$  (et ce sont les seules).

### 6.3.6 Plan d'étude d'une courbe plane paramétrée

Nous allons exposer ce plan à travers un exemple

$$F(t) = (t^2, \frac{(1+t)^2}{1+t^2})$$

1. Domaine de définition :  $I = \mathbb{R}$
2. Réduction du domaine d'étude : ici pas de périodicité, ni de symétries apparentes.
3. Variations de  $F$ .  $F$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ . On a

$$F'(t) = (2t, \frac{2(1+t)(1-t)}{(1+t^2)^2}).$$

Comme  $F'(t) \neq 0$ , pour tout  $t$ , tous les points sont réguliers et la tangente à la courbe en  $M(t)$  est portée par  $F'(t)$ . On définit  $m(t) = \frac{y'(t)}{x'(t)}$ . On a

$$m(t) = 0 \Leftrightarrow t = 1, \text{ ou } t = -1,$$

donc aux points  $(F(1) = (1, 2)$  et  $F(-1) = (1, 0)$ , la courbe admet une tangente horizontale. De plus,  $\lim_{t \rightarrow 0} |m(t)| = \infty$ , donc au point  $F(0) = (0, 1)$ , la courbe admet une tangente verticale.

4. Branches infinies De plus  $\lim_{|t| \rightarrow +\infty} |x(t)| = +\infty$  et  $\lim_{|t| \rightarrow +\infty} |y(t)| = 1$ , donc la droite d'équation  $y = 1$  est asymptote à la courbe (et c'est la seule).
5. Points multiples On montre que  $F(t_1) = F(t_2)$  n'a pas de solution réelle. Donc la courbe n'a pas de point multiple.

## 6.4 Courbes en coordonnées polaires

Soit le plan  $P$  muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

**Définition 6.10** Soit  $M$  un point de  $P$  de coordonnées  $(x, y)$  dans  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . Tout couple  $(r, \theta) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$  est appelé coordonnées polaires de  $M$ . On dit que  $\theta$  est un angle polaire de  $M$  et  $r$  est un rayon vecteur de  $M$ . Le point  $O$  est appelé pôle.

A tout couple  $(r, \theta) \in \mathbb{R}^2$  correspond un unique point de plan  $P$ . A un point du plan  $P$  distinct du pôle correspond une double infinité de coordonnées polaires : si  $(r, \theta), (r', \theta')$  sont deux systèmes de coordonnées polaires d'un point  $M$ , alors il existe  $h \in \mathbb{Z}$  tel que  $r' = (-1)^h r$  et  $\theta' = \theta + h\pi$ .

**Définition 6.11** Les courbes en coordonnées polaires sont les courbes définies par l'équation :  $\overrightarrow{F(\theta)} = r(\theta)\overrightarrow{u(\theta)}$ , où  $\overrightarrow{u(\theta)} = \frac{\overrightarrow{OM}}{OM}$ .  $r(\theta)$  est appelée équation polaire de la courbe.

Ces courbes polaires sont des courbes planes paramétrées, mais il est plus commode de les étudier directement. Toutes les propriétés de la courbe vont dépendre de  $r(\theta)$ .

**Exemple 6.9** 1.  $r(\theta) = \frac{p}{1+e \cos \theta}$ , est l'équation polaire d'une conique.  $p$  est la distance du foyer à la directrice et  $e$  l'excentricité.

- (a)  $e < 1$  correspond à une ellipse,
- (b)  $e = 1$  correspond à une parabole,
- (c)  $e > 1$  correspond à une hyperbole.

En effet, puisque  $x = r(\theta) \cos \theta, y = r(\theta) \sin \theta$  on a  $r(\theta) = p - ex$ . Donc  $(1 - e^2)x^2 + y^2 + 2exp = p^2$ .

2.  $r(\theta) = \frac{c}{\sin(\theta - \alpha)}$  est l'équation polaire d'une droite  $(D)$  ne passant pas par l'origine.  $c$  est la distance à l'origine et  $\alpha$  l'angle  $(Ox, (D))$ .
3.  $r(\theta) = D \cos(\theta - \alpha)$  est l'équation polaire du cercle passant par  $O$  et de diamètre  $D$ .

### 6.4.1 Tangente en un point

Si  $r(\theta)$  est dérivable, alors  $F$  l'est et on a  $F'(\theta) = r'(\theta)\overrightarrow{u(\theta)} + r(\theta)\overrightarrow{u'(\theta)}$ . Mais

$$\overrightarrow{u(\theta)} = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j},$$

d'où

$$\overrightarrow{u'(\theta)} = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}.$$

Ainsi,  $u'(\theta)$  est un vecteur unitaire obtenu à partir de  $u(\theta)$  par la rotation de centre  $O$  et d'angle  $\frac{\pi}{2}$ .

1. Si  $F'(\theta) \neq 0$ , dans le repère  $(O, \overrightarrow{u(\theta)}, \overrightarrow{u'(\theta)})$  la tangente à la courbe au point  $M(\theta)$  a pour pente

$$\frac{r(\theta)}{r'(\theta)}.$$

Si  $r'(\theta) = 0$ , la tangente est parallèle au vecteur  $\overrightarrow{u'(\theta)}$ .

2. Si  $F'(\theta_0) = 0$ , la courbe passe par le pôle et s'il existe  $k$  tel que  $r^{(k)}(\theta) \neq 0$ , la tangente existe :  $c'$  est la droite d'angle polaire  $\theta = \theta_0$

### 6.4.2 Branches infinies

La courbe présente une branche infinie si  $r$  ou  $\theta$  tendent vers l'infini. Trois cas se présentent

1.  $\lim_{|\theta| \rightarrow +\infty} |r(\theta)| = +\infty$ . La courbe présente une branche en spirale (pas de direction asymptotique).
2.  $\lim_{|\theta| \rightarrow +\infty} |r(\theta)| = r_0 \in \mathbb{R}$ . La courbe admet un cercle asymptote de centre 0 et de rayon  $r_0$ .
3.  $\lim_{\theta \rightarrow \theta_0} |r(\theta)| = +\infty$ . La courbe admet une branche infinie de direction asymptotique la droite de vecteur directeur  $\overrightarrow{u(\theta_0)}$ . Les coordonnées cartésiennes de  $M(r, \theta)$  dans le repère  $(O, \overrightarrow{u(\theta_0)}, \overrightarrow{u'(\theta_0)})$  sont  $X = r \cos(\theta - \theta_0)$ ,  $Y = r \sin(\theta - \theta_0)$ . Quand  $\theta$  tends vers  $\theta_0$ ,  $|X|$  tend vers  $+\infty$ . Si  $\lim_{\theta \rightarrow \theta_0} r(\theta) \sin(\theta - \theta_0) = k$ , on a

- (a)  $k = \pm\infty$ , la courbe a une branche parabolique de direction  $\overrightarrow{u(\theta_0)}$ .
- (b)  $k \in \mathbb{R}$ , la droite d'équation  $Y = k$  est asymptote à la courbe. La position de la courbe par rapport à l'asymptote est déduite du signe de  $r(\theta) \sin(\theta - \theta_0) - k$ . En pratique on pose  $(\theta - \theta_0) = h$ , on cherche un développement limité en 0 de  $r(h + \theta_0) \sin h = k + ah + h\varepsilon(h)$ .

### 6.4.3 Etude des points multiples

Ce sont les points tels qu'il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tel que

$$r(\theta) = r(\theta + 2k\pi), \text{ ou } r(\theta) = -r(\theta + (2k + 1)\pi), \quad (6.41)$$

et le pôle si l'équation  $r(\theta) = 0$  a plusieurs solutions en  $\theta$ .

### 6.4.4 Plan d'étude d'une courbe polaire

Soit la courbe d'équation polaire  $r = r(\theta)$ .

1. Ensemble de définition. On le note  $I$ .
2. Périodicité : le plus petit  $T > 0$  tel que

$$r(\theta + T) = r(\theta) \quad \forall \theta \in I.$$

Dans ce cas, le point  $M'$  correspondant à  $\theta + T$  se déduit du point  $M(\theta)$  par la rotation de centre  $O$  et d'angle  $T$ . Il suffira de faire varier  $\theta$  dans un intervalle de longueur  $T$  et de déduire la courbe par des rotations de centre  $O$  et d'angles  $kT$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .

3. Symétries. Si  $I$  est un intervalle centré en 0, et si

- (a)  $r(\theta) = r(-\theta)$  ou  $r(\theta) = -r(\pi - \theta)$ ,  $Ox$  est axe de symétrie,
  - (b)  $r(\theta) = -r(-\theta)$  ou  $r(\theta) = r(\pi - \theta)$ ,  $Oy$  est axe de symétrie,
  - (c)  $r(\theta) = r(\pi + \theta)$ ,  $O$  est centre de symétrie.
4. Etude des variations et du signe de  $r$  et tangentes en les points remarquables.
  5. Recherche des branches infinies.
  6. Recherche des points multiples.
  7. Tracé de la courbe.

**Exemple 6.10** *Etudions la courbe d'équation polaire*

$$r(\theta) = \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)}$$

1. Ensemble de définition :  $\mathbb{R}$  privé de  $k\pi$   $k \in \mathbb{Z}$ .
2. Périodicité :  $2\pi$ . On réduit le domaine d'étude à  $] -\pi, 0[ \cup ] 0, \pi[$
3. Symétries :  $r(\theta) = -r(-\theta)$ , on a donc une symétrie par rapport à l'axe ( $Oy$ ); on réduit donc le domaine d'étude à  $] 0, \pi[$ .
4. Etude des variations de  $r$ :  $r$  est décroissante sur  $] 0, \pi[$ .  $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} r(\theta) = +\infty$  et  $r(\pi/2) = 0$ . Un calcul direct conduit à  $F'(\theta) \neq 0 \forall \theta$ . La courbe admet donc en tout point une tangente de pente  $\frac{r(\theta)}{r'(\theta)}$  dans le repère orthonormé  $(O, \vec{u}(\theta), \vec{u}'(\theta))$ . De plus  $r(\theta) = 0 \Leftrightarrow \theta = \pi/2$ , donc la courbe admet au pôle une tangente d'angle polaire  $\pi/2$ , c'est-à-dire l'axe ( $Oy$ ).
5. Recherche des branches infinies : Comme

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} r(\theta) = +\infty,$$

la courbe admet une branche infinie de direction asymptotique la droite d'angle polaire  $0$ . Dans le repère  $(O, Ox, Oy)$ , l'ordonnée du point  $M(\theta)$  est  $r(\theta) \sin(\theta - 0) = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2}$ . On a  $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} r(\theta) \sin(\theta) = 2$ . Donc la courbe admet une asymptote d'équation  $Y = 2$  dans le repère  $(O, Ox, Oy)$ . De plus  $r(\theta) \sin \theta - 2 = -2 \sin^2 \frac{\theta}{2} < 0$ , pour  $\theta \rightarrow 0^+$ .

6. Recherche des points multiples: on a un point double correspondant à  $\theta = -\frac{\pi}{2}$  et  $\theta = \frac{\pi}{2}$ . La tangente en ce point a pour pente  $1$  en  $\frac{\pi}{2}$  et  $-1$  en  $-\frac{\pi}{2}$ .

## 6.5 Exercices

**Exercice 6.1** 1. Soit  $I$  un intervalle ouvert de  $\mathbb{R}$  et  $t_0 \in I$ . Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  définie par  $f(t) = (f_1(t), f_2(t))$ . On suppose que chacune des applications composantes  $f_i$  sont dérivables sur  $I$ . Etudier la dérivabilité en  $t_0$  de l'application qui à  $t \in I$  associe  $\|f(t)\| := \sqrt{f_1^2(t) + f_2^2(t)}$  dans les cas suivants

- (a)  $f(t_0) \neq 0$ ,
- (b)  $f(t_0) = 0$  et  $f'(t_0) \neq 0$ .

2. Soit  $I = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  et  $f(t) = (\sin t, 1)$ . Montrer que l'application qui à  $t \in I$  associe  $\|f(t)\|_1 := |\sin t| + |1|$  n'est pas dérivable en  $t_0 = 0$ .
3. Soit  $I = [-1, 0]$  et  $f(t) = (t, t + 1)$ . Montrer que l'application qui à  $t \in I$  associe  $\|f(t)\|_\infty := \max\{|t|, |t + 1|\}$  n'est pas dérivable en  $t_0 = -\frac{1}{2}$ .

**Exercice 6.2** Soit  $a, b$  2 réels non nuls. Soit  $S_{a,b}$  le support de la courbe de représentation paramétrique  $F_{a,b}(t) = (2t + \frac{a^3}{t^3}, t^2 + \frac{b^3}{t})$  sur  $I = ]0, +\infty[$ .

1. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que  $S_{a,b}$  possède un et un seul point de rebroussement.
2. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que  $S_{a,b}$  possède au moins un point double.

**Exercice 6.3** Préciser l'étude locale à l'origine des courbes suivantes

1.

$$F(t) = (t^2 + t^4, t^3 - t^4) \text{ sur } I = \mathbb{R},$$

2.

$$F(t) = (\cos^3 t, \sin t) \text{ sur } I = \mathbb{R},$$

3.

$$F(t) = (2(t - \sin t), 2(1 - \cos t)) \text{ sur } I = \mathbb{R}.$$

**Exercice 6.4** Construire les courbes définies paramétriquement par

1.

$$F(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t),$$

2.

$$F(t) = ((1+t)e^{-\frac{1}{t}}, (t-1)e^{\frac{1}{t}}),$$

3.

$$F(t) = \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, t \frac{1-t^2}{1+t^2}\right),$$

4.

$$F(t) = \left(\frac{t}{1+t^3}, \frac{t^2}{1+t^3}\right),$$

5.

$$F(t) = (t^2 e^{-t}, t^4 e^{-t}).$$

**Exercice 6.5 (Extrait du concours "petites mines" 2006)** Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . Soit  $\Gamma$  la courbe d'équation polaire  $r(\theta) = \frac{\sin \theta}{2 - \cos \theta}$ .

1. Montrer qu'il existe une symétrie  $s$  telle que  $s(M(\theta)) = M(-\theta)$ . En déduire un domaine d'étude de la courbe.
2. Donner une équation cartésienne de la tangente à la courbe au point  $M(\frac{\pi}{2})$ .

3. Tracer l'allure de la courbe.

**Exercice 6.6** Etudier les branches infinies des courbes définies en coordonnées polaires par

1.

$$r(\theta) = \frac{\cos \theta}{1 - 2 \sin(\theta)},$$

2.

$$r(\theta) = \frac{\cos \theta}{\cos(\theta) - \sin(\theta)}.$$

**Exercice 6.7** Construire les courbes d'équation polaire suivante

1.

$$r(\theta) = + \tan\left(\frac{\theta}{2}\right),$$

2.

$$r(\theta) = 1 + \cos \theta,$$

3.

$$r(\theta) = \frac{\pi}{\theta},$$

4.

$$r(\theta) = \frac{\sin 2\theta}{\cos(\theta) + \sin(\theta)}.$$

# Chapitre 7

## Fonctions réelles de plusieurs variables

### 7.1 Limite, continuité

On s'intéresse dans ce chapitre aux applications de  $\mathbb{R}^n$  (ou d'une partie de  $\mathbb{R}^n$ ) dans  $\mathbb{R}^p$ , avec  $n, p \in \mathbb{N}^*$ . On va commencer par munir  $\mathbb{R}^n$  (et  $\mathbb{R}^p$ ) d'une "norme" particulière, appelée "norme euclidienne", qui jouera le rôle de la valeur absolue dans  $\mathbb{R}$ .

**Définition 7.1 (Norme euclidienne)** Soit  $m \in \mathbb{N}^*$ . Pour  $x \in \mathbb{R}^m$ , on note  $x_1, \dots, x_m$  les composantes de  $x$  et on pose :

$$|x| = \left( \sum_{i=1}^m x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Si  $x, y \in \mathbb{R}^m$ , en notant  $x_1, \dots, x_m$  les composantes de  $x$  et  $y_1, \dots, y_m$  les composantes de  $y$ , on définit aussi le produit scalaire de  $x$  avec  $y$ , que nous noterons  $x \cdot y$  par la formule :

$$x \cdot y = \sum_{i=1}^m x_i y_i.$$

Pour  $m \in \mathbb{N}^*$ , l'application  $x \mapsto |x|$  est une application de  $\mathbb{R}^m$  dans  $\mathbb{R}_+$  vérifiant les trois propriétés suivantes (qui font de cette application une norme) :

$$\text{(Non dégénérescence) pour tout } x \in \mathbb{R}^m, |x| = 0 \Leftrightarrow x = 0, \quad (7.1)$$

$$\text{(homogénéité positive) pour tout } x \in \mathbb{R}^m \text{ et tout } \lambda \in \mathbb{R}, |\lambda x| = |\lambda| |x|, \quad (7.2)$$

$$\text{(inégalité triangulaire) pour tout } x, y \in \mathbb{R}^m, |x + y| \leq |x| + |y|. \quad (7.3)$$

**Remarque 7.1** Soit  $m \in \mathbb{N}^*$ . Si  $x \mapsto \|x\|$  est une application de  $\mathbb{R}^m$  dans  $\mathbb{R}_+$  vérifiant les trois propriétés (7.1)-(7.3) (avec  $\|x\|, \|\lambda x\|, \|x + y\|$  et  $\|y\|$  au lieu de  $|x|, |\lambda x|, |x + y|$  et  $|y|$ ), on dit que cette application est une norme. Si  $\|\cdot\|$  est une norme sur  $\mathbb{R}^m$ , on peut montrer qu'il existe  $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$  t.q. :

$$x \in \mathbb{R}^m \Rightarrow C_1 |x| \leq \|x\| \leq C_2 |x|.$$

On dit que les normes  $\|\cdot\|$  et  $|\cdot|$  sont “équivalentes”. Les propriétés d’une fonction  $f$  (de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^p$ ) introduites dans ce chapitre (continuité, dérivabilité, caractère  $C^1$ ...) seraient alors les mêmes en remplaçant la norme euclidienne (sur  $\mathbb{R}^n$  et  $\mathbb{R}^p$ ) par d’autres normes. (Ce résultat d’équivalence des normes sur  $\mathbb{R}^m$  est dû au fait que  $\mathbb{R}^m$  est un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$ , de dimension finie. Sur un espace vectoriel de dimension infinie, les propriétés de  $f$  telles que continuité et dérivabilité dépendraient de la norme choisie.)

Une propriété intéressante de la norme euclidienne et du produit scalaire définis dans la définition 7.1 est l’inégalité de Cauchy-Schwarz que nous donnons maintenant (et qui est d’ailleurs utile pour démontrer la propriété (7.3))

**Proposition 7.1 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)** Soit  $m \in \mathbb{N}^*$  et  $x, y \in \mathbb{R}^m$ . On a alors

$$|x \cdot y| \leq |x||y|. \quad (7.4)$$

On définit maintenant les notions de limite et de continuité pour une fonction de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^p$  de manière similaire au cas  $n = p = 1$ .

**Définition 7.2 (Boule ouverte)** Soit  $m \in \mathbb{N}^*$ ,  $a \in \mathbb{R}^m$  et  $\delta > 0$ . La boule ouverte de centre  $a$  et de rayon  $\delta$  est l’ensemble  $B(a, \delta) = \{x \in \mathbb{R}^m, |x - a| < \delta\}$ .

**Définition 7.3 (Limite un point de  $\mathbb{R}$ )** Soit  $n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $f$  une application de  $D \subset \mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^p$  et  $l \in \mathbb{R}^p$ . Soit  $a \in \mathbb{R}^n$ . On suppose qu’il existe  $\delta > 0$  t.q.  $D \supset B(a, \delta) \setminus \{a\}$ . On dit que  $l = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$  si pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q. :

$$x \in D, x \neq a, |x - a| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon.$$

Comme dans le cas  $n = p = 1$ , la limite de  $f$  en  $a$  (sous les hypothèses de la définition 7.3), si elle existe, est unique. Il y a aussi une caractérisation séquentielle de la limite.

**Proposition 7.2 (Caractérisation séquentielle de la limite)** Soit  $n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $f$  une application de  $D \subset \mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^p$  et  $l \in \mathbb{R}^p$ . Soit  $a \in \mathbb{R}^n$ . On suppose qu’il existe  $\delta > 0$  t.q.  $D \supset B(a, \delta) \setminus \{a\}$ . Alors,  $l$  est la limite en  $a$  de  $f$  si et seulement si  $f$  transforme toute suite convergente vers  $a$  en suite convergente vers  $l$ , c’est-à-dire :

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D \setminus \{a\}, \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l.$$

**Exemple 7.1 (Application linéaire)** Soit  $n, p \in \mathbb{N}^*$  et  $f$  une application linéaire de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^p$ . Alors,  $f$  est continue. En fait,  $f$  est même lipschitzienne, c’est-à-dire qu’il existe  $k \in \mathbb{R}$  t.q.  $|f(x)| \leq k|x|$  pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$ .

## 7.2 Différentielle, dérivées partielles

Nous définissons d’abord les dérivées partielles d’une application de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^p$ , puis la différentielle.

**Définition 7.4 (Ouvert de  $\mathbb{R}^n$ )** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ . On dit que  $\Omega$  est ouvert si pour tout  $a \in \Omega$ , il existe  $\alpha > 0$  t.q.  $B(a, \alpha) \subset \Omega$ .

**Remarque 7.2** Soit  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$  ( $n \geq 1$ ) et  $a$  un point de  $\Omega$ . D'après la définition 7.4, Il existe  $\alpha > 0$  t.q.  $B(a, \alpha) \subset \Omega$ . Soit  $j \in \{1, \dots, n\}$ . Si  $x \in \mathbb{R}^n$  est t.q.  $x_k = a_k$  pour  $k \neq j$  et  $|x_j - a_j| < \alpha$ , on a donc  $|x - a| < \alpha$  et donc  $x \in \Omega$ . Ceci va nous permettre de d'introduire la notion de "dérivées partielles" d'une application  $f$  de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}^p$  ( $p \geq 1$ ), consistant à fixer  $(n - 1)$  composantes de  $x$  et à considérer les applications qui à la composante restante de  $x$  associe l'une des composantes de  $f$  (on est ainsi ramené à étudier une application définie sur une partie de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ ).

**Définition 7.5** Soit  $n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$  et  $f$  une application de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}^p$ . Pour  $x \in \mathbb{R}^n$ , on note  $x_1, \dots, x_n$  les composantes de  $x$  et  $f_1(x), \dots, f_p(x)$  les composantes de  $f(x)$  (de sorte que les  $f_i$  sont des applications de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}$ ).

Soit  $i \in \{1, \dots, p\}$ ,  $j \in \{1, \dots, n\}$  et  $a \in \Omega$ . On note  $g$  l'application que à  $x_j$  associe  $f_i(x)$ , avec  $x_k = a_k$  si  $k \in \{1, \dots, n\}$ ,  $k \neq j$  (de sorte que  $g$  est une application définie sur un voisinage de  $a_j$ , dans  $\mathbb{R}$ , à valeurs dans  $\mathbb{R}$ , voir la remarque 7.2). Si  $g$  est dérivable au point  $a_j$ , on dit que  $f$  admet une dérivée partielle en  $a$  selon  $x_j$  et on pose :

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) = g'(a_j).$$

Nous donnons maintenant la définition de différentielle et nous faisons ensuite le lien entre différentielle et dérivées partielles.

**Définition 7.6** Soit  $n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$  et  $f$  une application de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}^p$ . Soit  $a \in \Omega$ . On dit que  $f$  est différentiable en  $a$  si il existe une application linéaire de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^p$ , notée  $Df(a)$ , t.q.

$$f(a + h) = f(a) + Df(a)(h) + |h|g(h), \text{ pour } h \neq 0 \text{ t.q. } a + h \in \Omega,$$

avec  $\lim_{h \rightarrow 0} g(h) = 0$  (et donc  $g$  continue en 0 si on pose  $g(0) = 0$ ). L'application  $Df(a)$  est alors unique (voir la proposition 7.3).

**Remarque 7.3** On s'intéresse ici au cas particulier  $p = 1$  et (pour simplifier)  $n = 2$ . Soit  $T$  une application linéaire de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}$ . On définit alors  $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$  par

$$\begin{aligned} a_1 &= T(h) \text{ si } h \text{ est le vecteur de composantes } 1 \text{ et } 0, \\ a_2 &= T(h) \text{ si } h \text{ est le vecteur de composantes } 0 \text{ et } 1. \end{aligned}$$

Avec ce choix de  $a_1$  et  $a_2$ , on a, par linéarité de  $T$ ,

$$T(h) = a_1 h_1 + a_2 h_2 \text{ si } h \text{ est le vecteur de composantes } h_1 \text{ et } h_2.$$

On note maintenant  $dx_1$  l'application linéaire de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}$  définie par  $T(h) = h_1$  si  $h$  a pour composantes  $h_1$  et  $h_2$ . De même, on note  $dx_2$  l'application linéaire de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}$  définie par  $T(h) = h_2$  si  $h$  a pour composantes  $h_1$  et  $h_2$ . On a alors  $T(h) = a_1 dx_1(h) + a_2 dx_2(h)$  pour tout  $h \in \mathbb{R}^2$ , c'est-à-dire :

$$T = a_1 dx_1 + a_2 dx_2.$$

Soit  $n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$ ,  $f$  une application de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}^p$  et  $a \in \Omega$ . Le fait que  $f$  admette des dérivées partielles en  $a$  n'implique pas que  $f$  soit différentiable en  $a$  (ni même que  $f$  soit continue en  $a$ , voir l'exercice 7.2). Par contre si  $f$  est différentiable en  $a$ ,  $f$  admet alors des dérivées partielles en  $a$ , ceci est énoncé dans la proposition 7.3.

**Proposition 7.3 (différentielle et dérivées partielles)** Soit  $n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$  et  $f$  une application de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}^p$ . Soit  $a \in \Omega$ . On suppose que  $f$  est différentiable en  $a$ . Alors,  $f$  admet des dérivées partielles en  $a$  et, pour  $i \in \{1, \dots, p\}$ , la  $i$ -ème composante de  $Df(a)(h)$ , notée  $(Df(a)(h))_i$  vérifie :

$$(Df(a)(h))_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) h_j, \text{ pour tout } h \in \mathbb{R}^n.$$

(En particulier, ceci montre l'unicité de la différentielle.)

Une réciproque partielle de la proposition 7.3 sera donnée dans la proposition 7.6.

**Remarque 7.4** Sous les hypothèses de la proposition 7.3, dans le cas particulier  $n = 2$  et  $p = 1$  (dans ce cas,  $f$  n'a qu'une composante, notée  $f$  et non  $f_1$ ), la remarque 7.3 donne

$$Df(a) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) dx_2.$$

D'autres notations sont utilisées pour exprimer la différentielle au point  $a$  d'une application  $f$  de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^p$  ::

- La matrice jacobienne. C'est une matrice de  $p$  lignes et  $n$  colonnes. Elle sera notée  $M_f(a)$ .
- Le gradient de  $f$ , si  $p = 1$ . C'est un vecteur de  $\mathbb{R}^n$ . Il sera noté  $\nabla f(a)$ .
- La dérivée de  $f$ , si  $n = 1$ . C'est un vecteur de  $\mathbb{R}^p$ . Il sera noté  $f'(a)$ .

Nous donnons maintenant les définitions de  $M_f(a)$ ,  $\nabla f(a)$  et  $f'(a)$ .

**Définition 7.7 (Matrice jacobienne, gradient, dérivée)** Soit  $n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$  et  $f$  une application de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}^p$ . Soit  $a \in \Omega$ . On suppose que  $f$  est différentiable en  $a$ .

1. (Matrice jacobienne) La matrice jacobienne de  $f$  en  $a$ , que nous noterons  $M_f(a)$ , est la matrice de  $p$  lignes et  $n$  colonnes dont le coefficient de la  $i$ -ème ligne et  $j$ -ème colonne est  $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$ .
2. (Gradient) On suppose ici que  $p = 1$ . Le gradient de  $f$  en  $a$ , noté  $\nabla f(a)$ , est le vecteur de  $\mathbb{R}^n$  dont la  $j$ -ème composante est  $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$ .
3. (Dérivée) On suppose ici que  $n = 1$ . La dérivée de  $f$  en  $a$ , notée  $f'(a)$ , est le vecteur de  $\mathbb{R}^p$  dont la  $i$ -ème composante est  $f'_i(a)$ . (Il n'y a pas ici de dérivée partielle car il n'y a qu'une seule variable.)

Nous allons maintenant faire le lien entre différentielle, matrice jacobienne, gradient et dérivée. En pratique, on confond le vecteur  $x$  de  $\mathbb{R}^n$ , dont les composantes sont  $x_1, \dots, x_n$ , avec la matrice à  $n$  lignes et 1 colonne formée avec  $x_1, \dots, x_n$ , c'est-à-dire la matrice  $(x_1 \ \dots \ x_n)^t$  (appelée aussi "vecteur colonne"). Cette confusion nous permet d'écrire la remarque 7.5.

**Remarque 7.5 (différentielle, matrice jacobienne, gradient et dérivée)** Soit  $n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$  et  $f$  une application de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}^p$ . Soit  $a \in \Omega$ . On suppose que  $f$  est différentiable en  $a$ .

1. (Différentielle et matrice jacobienne) Pour tout  $h \in \mathbb{R}^n$ , on a  $Df(a)(h) = M_f(a)h$  (où  $M_f(a)h$  désigne le produit de la matrice jacobienne avec la matrice à  $n$  lignes et 1 colonne que l'on confond avec le vecteur  $h$ ).
2. (Différentielle, matrice jacobienne et gradient) Si  $p = 1$ , la matrice jacobienne est une matrice à 1 ligne et  $n$  colonnes. Le gradient de  $f$  en  $a$  est un vecteur de  $\mathbb{R}^n$  que l'on confond donc avec une matrice à  $n$  lignes et 1 colonne, cette matrice est la transposée de la matrice jacobienne, c'est-à-dire  $\nabla f(a) = M_f(a)^t$ . On a donc :

$$Df(a)(h) = M_f(a)h = \nabla f(a) \cdot h, \text{ pour tout } h \in \mathbb{R}^n.$$

3. (Différentielle, matrice jacobienne et dérivée) Si  $n = 1$ , la matrice jacobienne est une matrice à  $n$  lignes et 1 colonne. La dérivée  $f'$  en  $a$  est un vecteur de  $\mathbb{R}^p$  que l'on confond donc avec une matrice à  $p$  lignes et 1 colonne. Cette matrice est la matrice jacobienne, c'est-à-dire  $f'(a) = M_f(a)$ . On a donc :

$$Df(a)(h) = M_f(a)h = hf'(a), \text{ pour tout } h \in \mathbb{R}.$$

**Remarque 7.6 (base canonique et représentation d'une application linéaire)**

Soit  $n \geq 1$ . Pour  $i \in \{1, \dots, n\}$ , on note  $e_i$  l'élément de  $\mathbb{R}^n$  dont toutes les composantes sont nulles sauf la  $i$ -ème, cette  $i$ -ème composante valant 1. On rappelle que la famille  $\{e_1, \dots, e_n\}$  est une base de  $\mathbb{R}^n$  (et s'appelle "base canonique de  $\mathbb{R}^n$ "). Si  $x \in \mathbb{R}^n$  a pour composantes  $x_1, \dots, x_n$ , la décomposition de  $x$  dans cette base est (avec les opérations usuelles dans  $\mathbb{R}^n$  d'addition et de multiplication par un nombre réel) :

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i.$$

Soit maintenant  $n, p \in \mathbb{N}^*$  et  $T$  une application linéaire de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^p$ . Pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$  on a donc, en notant  $x_1, \dots, x_n$  les composantes de  $x$  et  $\{e_1, \dots, e_n\}$  la base canonique de  $\mathbb{R}^n$  :

$$T(x) = \sum_{i=1}^n x_i T(e_i).$$

Pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ , le vecteur  $T(e_i)$  est un vecteur de  $\mathbb{R}^p$  (on le confond donc avec une matrice à  $p$  lignes et 1 colonne). On note  $A$  la matrice (à  $p$  lignes et  $n$  colonnes) dont, pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ , la  $i$ -ème colonne est formée de  $T(e_i)$ . On a alors  $T(x) = Ax$  (le vecteur  $x$  de  $\mathbb{R}^n$  est confondu avec une matrice à  $n$  lignes et 1 colonne). La matrice  $A$  est la matrice qui représente l'application linéaire  $T$  dans les bases canoniques de  $\mathbb{R}^n$  et  $\mathbb{R}^p$ .

**Proposition 7.4 (Différentielle d'une fonction composée)** Soit  $n, p, q \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$ ,  $O$  un ouvert de  $\mathbb{R}^p$ ,  $f$  une application de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}^p$  et  $g$  une application de  $O$  dans  $\mathbb{R}^q$ . Soit  $a \in \Omega$ . On suppose que  $f$  est différentiable en  $a$ ,  $f(a) \in O$  et  $g$  différentiable en  $f(a)$ . Alors  $g \circ f$  (qui est bien définie au voisinage de  $a$ ) est différentiable en  $a$  et  $D(g \circ f)(a) = Dg(f(a)) \circ Df(a)$ , ou encore, avec les matrices jacobiniennes,  $M_{g \circ f}(a) = M_g(f(a))M_f(a)$ .

**Exemple 7.2** On considère ici une application de  $\mathbb{R}$  de  $\mathbb{R}$  mais définie "en passant par  $\mathbb{R}^2$ ". c'est-à-dire que  $\gamma$  est une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}^2$  et  $\varphi$  est une application de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $\gamma$  et  $\varphi$  sont de classe  $C^1$  et on considère la fonction  $f = \varphi \circ \gamma$ , de sorte que  $f$  est une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  de classe  $C^1$ . Pour tout  $t \in \mathbb{R}$ , la proposition 7.4 donne

$$f'(t) = D\varphi(\gamma(t))(\gamma'(t)) = M_\varphi(\gamma(t))\gamma'(t).$$

Noter que  $D\varphi(\gamma(t))$  est une application linéaire de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}$  (représentée par la matrice  $M_\varphi(\gamma(t))$  de 1 ligne et 2 colonnes) et que  $\gamma'(t)$  est un vecteur de  $\mathbb{R}^2$ . En notant  $\gamma_1$  et  $\gamma_2$  les deux composantes de  $\gamma$ , on a aussi

$$f'(t) = \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}(\gamma(t))\gamma'_1(t) + \frac{\partial \varphi}{\partial x_2}(\gamma(t))\gamma'_2(t).$$

On note  $\gamma(0) = a$  et  $\gamma(1) = b$ . On a donc  $f(0) = \varphi(a)$  et  $f(1) = \varphi(b)$ . Comme  $f$  est de classe  $C^1$ , le chapitre 5 (voir la remarque 5.8) donne

$$\varphi(b) - \varphi(a) = f(1) - f(0) = \int_0^1 f'(t) = \int_0^1 D\varphi(\gamma(t))(\gamma'(t))dt.$$

Le terme de droite, c'est-à-dire  $\int_0^1 D\varphi(\gamma(t))(\gamma'(t))dt$ , s'appelle "intégrale de la différentielle de  $\varphi$  le long du chemin  $\{\gamma(t), t \in [0, 1]\}$ " (ce "chemin" est un "arc de courbe" dans  $\mathbb{R}^2$ ). Nous venons de démontrer que cette intégrale ne dépend donc que des extrémités du chemin c'est-à-dire de  $a$  et  $b$  (et, bien sûr, de  $\varphi$ ) et non de l'ensemble du chemin (pourvu que celui ci soit de classe  $C^1$ , cette hypothèse peut être légèrement affaiblie).

On utilise parfois la notion de dérivée dans une direction donnée, on donne ci après la définition de cette dérivée (en se limitant au cas des fonctions à valeurs dans  $\mathbb{R}$ ).

**Définition 7.8 (Dérivée directionnelle)** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$  et  $f$  une application de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}$ . Soit  $a \in \Omega$  et  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $x \neq 0$ . Pour  $t \in \mathbb{R}$  t.q.  $a + tx \in \Omega$ , on pose  $g(t) = f(a + tx)$  (comme  $\Omega$  est ouvert, la fonction  $g$  est donc définie sur un voisinage de 0). On dit que  $f$  admet une dérivée en  $a$  dans la direction  $x$  si la fonction  $t \mapsto \frac{g(t) - g(0)}{t}$  admet une limite à droite en 0. On note  $f'_x(a)$  cette limite, c'est-à-dire :

$$f'_x(a) = \lim_{t \rightarrow 0, t > 0} \frac{f(a + tx) - f(a)}{t}.$$

Avec les notations de la définition 7.8, il est assez facile de voir que si  $f$  est différentiable en  $a$ , alors, pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $x \neq 0$ ,  $f$  admet une dérivée en  $a$  dans la direction  $x$  et cette dérivée est  $f'_x(a) = Df(a)(x)$ . Ceci est une conséquence de la proposition 7.4 (voir l'exercice 7.3). Par contre l'existence de la dérivée directionnelle en  $a$  dans toutes les directions (c'est-à-dire pour tout  $x \neq 0$ ) ne donne pas la différentiabilité de  $f$  en  $a$  (exercice 7.4).

**Définition 7.9 (Norme d'une application linéaire)** Soit  $n, p \in \mathbb{N}^*$  et  $f$  une application linéaire de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^p$ . On définit alors la norme de  $f$  par la formule suivante :

$$\|f\| = \sup_{x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0} \frac{|f(x)|}{|x|}.$$

(Cette application est bien une norme sur l'ensemble des applications linéaires de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^p$ , qui est un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$ .)

Si  $f$  une application linéaire de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^p$ , on peut remarquer que

$$|f(x)| \leq \|f\| |x| \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}^n. \quad (7.5)$$

Soit  $f$  continue de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , dérivable en tout point de  $\mathbb{R}$ . On rappelle (théorème 3.2) que si  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq b$ , il existe  $c \in ]a, b[$  t.q.  $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ . Ce résultat peut être mis en défaut pour une application de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^p$  dès que  $p > 1$ , comme le montre l'exemple suivant :

On prend ici  $n = 1$ ,  $p = 2$  et, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x)$  est le vecteur dont les composantes sont  $\cos(x)$  et  $\sin(x)$ , c'est-à-dire  $f(x) = (\cos(x), \sin(x))^t$ . L'application  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$  et la matrice jacobienne de  $f$  au point  $x$  est  $Df(x) = (-\sin(x), \cos(x))$ . On prend maintenant  $a = 0$  et  $b = 2\pi$  et on remarque que, pour tout  $c \in \mathbb{R}$  on  $f(b) - f(a) \neq Df(c)(b - a)$ . En effet, on a  $f(b) - f(a) = 0$  et  $Df(c)(b - a) = M_f(c)(b - a) = 2\pi(-\sin(c), \cos(c))^t \neq 0$  car  $\sin(c)$  et  $\cos(c)$  ne s'annule jamais tous les deux pour une même valeur de  $c$ .

On va toutefois donner une généralisation convenable du théorème des accroissements finis (théorème 7.1). Pour cela, si  $n \geq 1$  et  $a, b \in \mathbb{R}^n$ , on note  $]a, b[ = \{ta + (1 - t)b, t \in ]0, 1[ \}$  et  $[a, b] = \{ta + (1 - t)b, t \in [0, 1] \}$

**Théorème 7.1 (Théorème des Accroissements Finis, cas vectoriel)** Soit  $n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$  et  $f$  une application continue de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}^p$ . Soit  $a, b \in \Omega$  t.q.  $[a, b] \subset \Omega$ ,  $a \neq b$ . On suppose  $f$  différentiable en tout point de  $]a, b[$ . On a alors :

$$|f(b) - f(a)| \leq \left( \sup_{c \in ]a, b[} \|Df(c)\| \right) |b - a|.$$

DÉMONSTRATION : On donne ici une démonstration consistant à se ramener au théorème des accroissements finis pour une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  (théorème 3.2). Mais, cette démonstration est limitée au choix de la norme euclidienne dans l'espace  $\mathbb{R}^p$  (choix que nous avons fait pour tout ce chapitre) alors que le résultat est vrai pour tout choix de norme sur  $\mathbb{R}^n$  et  $\mathbb{R}^p$  (la démonstration doit alors être légèrement modifiée).

Pour  $t \in [0, 1]$ , on a  $tb + (1 - t)a \in \Omega$  et on pose  $\varphi(t) = (f(tb + (1 - t)a) - f(a)) \cdot (f(b) - f(a))$ . La fonction  $\varphi$  est donc continue de  $[0, 1]$  dans  $\mathbb{R}$ . Par dérivation de fonctions composées, elle est aussi dérivable sur  $]0, 1[$  et on a, pour tout  $t \in ]0, 1[$ ,

$$\varphi'(t) = Df(tb + (1 - t)a)(b - a) \cdot (f(b) - f(a)).$$

On peut alors utiliser le théorème 3.2 sur la fonction  $\varphi$ . On obtient qu'il existe  $s \in ]0, 1[$  t.q.

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(s) = Df(sb + (1 - s)a)(b - a) \cdot (f(b) - f(a)).$$

On remarque maintenant que  $\varphi(1) = |f(b) - f(a)|^2$  et  $\varphi(0) = 0$ . En posant  $y = sb + (1 - s)a$  et en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz (inégalité (7.4)) on a donc

$$|f(b) - f(a)|^2 = Df(y)(b - a) \cdot (b - a) \leq \|Df(y)(b - a)\| |f(b) - f(a)|.$$

On en déduit, avec (7.5)

$$|f(b) - f(a)| \leq \|Df(y)\| |b - a| \leq \left( \sup_{c \in ]a, b[} \|Df(c)\| \right) |b - a|.$$

Ce qui termine cette démonstration. ■

**Définition 7.10 (Fonctions de classe  $C^k$ )** Soit  $n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$  et  $f$  une application de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}^p$ .

1. On dit que  $f$  est classe  $C^0$  sur  $\Omega$  si  $f$  est continue sur  $\Omega$ , c'est-à-dire continue en tout point de  $\Omega$ . On note alors  $f \in C(\Omega, \mathbb{R}^p)$  ou  $f \in C^0(\Omega, \mathbb{R}^p)$ .

2. On dit que  $f$  est classe  $C^1$  sur  $\Omega$  si  $f$  est différentiable en tout point de  $\Omega$  et que, pour tout  $(i, j) \in \{1, \dots, p\} \times \{1, \dots, n\}$ , la fonction  $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$  est continue sur  $\Omega$ . On note alors  $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^p)$ .
3. Pour  $k \geq 2$ , on dit que  $f$  est de classe  $C^k$  (et on écrit  $f \in C^k(\Omega, \mathbb{R}^p)$ ) si  $f$  est différentiable en tout point de  $\Omega$  et les fonctions  $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$  sont de classe  $C^{k-1}$  sur  $\Omega$  (pour tout  $(i, j) \in \{1, \dots, p\} \times \{1, \dots, n\}$ ).
4. On dit que  $f$  est classe  $C^\infty$  sur  $\Omega$  si  $f$  est de classe  $C^k$  pour tout  $k \in \mathbb{N}$ .

**Proposition 7.5 ( $C^k$  est un e.v.)** Soit  $n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$  et  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$ . Alors,  $C^k(\Omega, \mathbb{R}^p)$  est un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$ .

**Proposition 7.6 (Existence de la différentielle)** Soit  $n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$  et  $f$  une application de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}^p$ . On suppose que  $f$  admet des dérivées partielles en tout point de  $\Omega$ .

1. Soit  $a \in \Omega$ . On suppose que les dérivées partielles de  $f$  sont continues en  $a$ . Alors,  $f$  est différentiable en  $a$ .
2. On suppose que  $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^p)$ . Alors,  $f$  est différentiable en tout point de  $\Omega$ .

Soit  $n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$  et  $f$  une application de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}^p$ . Si  $f$  est de classe  $C^2$ , les dérivées partielles de  $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$  admettent elle-mêmes des dérivées partielles. On note, pour  $a \in \Omega$ ,  $i \in \{1, \dots, p\}$  et  $(j, k) \in \{1, \dots, n\}^2$  :

$$\frac{\partial^2 f_i}{\partial x_k \partial x_j}(a) = \frac{\partial(\frac{\partial f_i}{\partial x_j})}{\partial x_k}(a).$$

Le théorème 7.2 compare  $\frac{\partial^2 f_i}{\partial x_k \partial x_j}(a)$  et  $\frac{\partial^2 f_i}{\partial x_j \partial x_k}(a)$ .

**Théorème 7.2 (Dérivées croisées)** Soit  $n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$  et  $f$  une application de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}^p$ . On suppose  $f$  de classe  $C^2$ . On a alors  $\frac{\partial^2 f_i}{\partial x_k \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_j \partial x_k}(a)$  pour tout  $a \in \Omega$ , tout  $i \in \{1, \dots, p\}$  et tout  $(j, k) \in \{1, \dots, n\}^2$ .

**Remarque 7.7** Voici une conséquence intéressante du théorème 7.2. Soit  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^2$  et  $g_1, g_2$  deux applications de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}$ , de classe  $C^1$ . On se demande si il existe une application  $f$  de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}$ , différentiable et t.q., pour tout  $a \in \Omega$ ,  $\frac{\partial f}{\partial x_1}(a) = g_1(a)$  et  $\frac{\partial f}{\partial x_2}(a) = g_2(a)$ . Une condition nécessaire pour l'existence de  $f$  est donnée par le théorème 7.2, il faut que, pour tout  $a \in \Omega$ ,  $\frac{\partial g_1}{\partial x_2}(a) = \frac{\partial g_2}{\partial x_1}(a)$ .

Enfin, on termine ce paragraphe en définissant le jacobien d'une application différentiable de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^n$  (utile, par exemple, pour les calculs d'intégrales en utilisant des changements de variables).

**Définition 7.11 (Jacobien)** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$  et  $f$  une application de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}^n$ . Soit  $a \in \mathbb{R}^n$ . on suppose  $f$  différentiable en  $a$ . le jacobien de  $f$  est  $a$ , noté  $J(a)$ , est la valeur absolue du déterminant de la matrice jacobienne de  $f$  en  $a$ , c'est-à-dire :

$$J(a) = |\det(M_f(a))|.$$

### 7.3 Recherche d'un extremum

On s'intéresse dans cette section, à la recherche d'un point où une fonction  $f$ , définie sur un ouvert de  $\mathbb{R}^n$ , à valeurs dans  $\mathbb{R}$ , atteint son maximum ou son minimum.

**Définition 7.12 (Point critique, minima)** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$  et  $f$  une application de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}$ . Soit  $a \in \Omega$ .

1. On dit que  $a$  est un point critique de  $f$  si  $f$  est différentiable en  $a$  et  $\nabla f(a) = 0$ .
2. On dit que  $f$  atteint un minimum local en  $a$  si il existe  $\delta > 0$  t.q.  $f(a) \leq f(x)$  pour tout  $x \in B(a, \delta)$ .

**Proposition 7.7 (Condition nécessaire de minimalité)** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$  et  $f$  une application de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}$ . Soit  $a \in \Omega$ . On suppose que  $f$  atteint un minimum local en  $a$ . Alors, si  $f$  différentiable en  $a$ , on a  $\nabla f(a) = 0$ .

Pour obtenir une condition nécessaire plus précise que celle donnée dans la proposition 7.7 (et aussi pour obtenir une condition suffisante), on suppose dans la proposition 7.8 que  $f$  est de classe  $C^2$  sur  $\Omega$  et on introduit la matrice hessienne de  $f$ .

**Définition 7.13 (Matrice hessienne)** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$  et  $f$  une application de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}$ , de classe  $C^2$ . Soit  $a \in \Omega$ . On appelle matrice hessienne de  $f$  en  $a$  la matrice à  $n$  lignes et  $n$  colonnes dont le terme à la  $i$ -ième ligne et  $j$ -ième colonne est  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$ . On note  $H(a)$  cette matrice (c'est une matrice symétrique, grâce au théorème 7.2).

**Proposition 7.8 (Condition nécessaire et condition suffisante de minimalité)** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$  et  $f$  une application de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}$ , de classe  $C^2$ . Soit  $a \in \Omega$ .

1. (Condition nécessaire) On suppose que  $f$  atteint un minimum local en  $a$ . On a alors  $\nabla f(a) = 0$  et  $H(a)$  (matrice hessienne de  $f$  en  $a$ ) est (symétrique) semi-définie positive (c'est-à-dire  $H(a)h \cdot h \geq 0$  pour tout  $h \in \mathbb{R}^n$ ).
2. (Condition suffisante) On suppose que  $\nabla f(a) = 0$  et que  $H(a)$  est (symétrique) définie positive (c'est-à-dire  $H(a)h \cdot h > 0$  pour tout  $h \in \mathbb{R}^n$ ,  $h \neq 0$ ). Alors,  $f$  atteint un minimum local en  $a$ .

### 7.4 Exercices

#### Exercice 7.1 (Différentiable implique continu)

Soit  $n, p \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$  et  $f$  une application de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}^p$ . Soit  $a \in \Omega$ . On suppose que  $f$  est différentiable en  $a$ . Montrer que  $f$  est continue.

#### Exercice 7.2 (Existence des dérivées partielles n'implique pas continuité)

Soit  $f$  de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}$  définie par :

$$f(x) = \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + x_2^2} \text{ pour } x = (x_1, x_2)^t \in \mathbb{R}^2, x \neq 0,$$
$$f(0) = 0.$$

Montrer que  $f$  admet des dérivées partielles en 0 mais que  $f$  n'est pas continue en 0 (et donc que  $f$  n'est pas différentiable en 0).

**Exercice 7.3 (Différentiable implique existence des dérivées directionnelles)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^n$  et  $f$  une application de  $\Omega$  dans  $\mathbb{R}$ . Soit  $a \in \Omega$  et  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $x \neq 0$ . On suppose que  $f$  est différentiable en  $a$ , montrer que  $f$  est dérivable en  $a$  dans la direction  $x$  et que  $f'_x(a) = Df(a)(x)$ .

**Exercice 7.4 (Existence des dérivées directionnelles n'implique pas continuité)**

Pour  $x = (x_1, x_2)^t \in \mathbb{R}^2$ ,  $x \neq 0$ , il existe un et un seul couple  $(\rho, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times [0, 2\pi[$  t.q.  $x_1 = \rho \cos(\theta)$  et  $x_2 = \rho \sin(\theta)$ . On pose alors  $f(x) = \frac{\rho^2}{2\pi - \theta}$ . On pose aussi  $f(0) = 0$  (de sorte que  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}^2$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ ).

1. Soit  $x \in \mathbb{R}^2$ ,  $x \neq 0$ . Montrer que  $f$  admet une dérivée en 0 dans la direction  $x$  et calculer  $f'_x(0)$ .
2. Montrer qu'il existe une application  $T$ , linéaire de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}$ , t.q., pour tout  $x \in \mathbb{R}^2$ ,  $x \neq 0$ ,  $f'_x(0) = T(x)$ .
3. Montrer que  $f$  n'est pas continue en 0 (et donc n'est pas différentiable en 0).

**Exercice 7.5 (Mécanique, Analyse et Algèbre)**

Soient  $x$  et  $y$  deux fonctions de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}^2$ , de classe  $C^1$ . On désigne par  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  l'ensemble des matrices  $2 \times 2$  à coefficients dans  $\mathbb{R}$ . On note  $M(t) \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  la matrice dont les deux lignes sont formées par les vecteurs (lignes)  $x(t)$  et  $y(t)$ ,  $M_x(t)$  la matrice dont les deux lignes sont formées par les vecteurs (lignes)  $x'(t)$  et  $y(t)$  et  $M_y(t)$  la matrice dont les deux lignes sont formées par les vecteurs (lignes)  $x(t)$  et  $y'(t)$ .

1. Soit  $f$  une fonction bilinéaire de  $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}$  (c'est-à-dire que, pour tout  $u \in \mathbb{R}^2$ , les applications  $z \mapsto f(z, u)$  et  $z \mapsto f(u, z)$  sont des applications linéaires de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}$ ). On rappelle qu'une application bilinéaire est nécessairement continue. Pour tout réel  $t$ , on pose  $g(t) = f(x(t), y(t))$ . Montrer que  $g$  est une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , de classe  $C^1$ , et que

$$g'(t) = f(x'(t), y(t)) + f(x(t), y'(t))$$

pour tout  $t \in \mathbb{R}$ . [On pourra, par exemple, écrire  $f(x(t+h), y(t+h)) - f(x(t), y(t)) = f(x(t+h) - x(t), y(t+h)) + f(x(t), y(t+h) - y(t))$ .]

2. En utilisant la question 1 et l'application  $N \mapsto \det(N)$  (de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  dans  $\mathbb{R}$ ), montrer que  $\varphi'(t) = \det(M_x(t)) + \det(M_y(t))$ , avec  $\varphi(t) = \det(M(t))$ .
3. On suppose que pour tout  $t \in \mathbb{R}$ , on suppose qu'il existe une matrice  $A(t) = \begin{bmatrix} a_{1,1}(t) & a_{1,2}(t) \\ a_{2,1}(t) & a_{2,2}(t) \end{bmatrix}$  t.q., pour tout  $t \in \mathbb{R}$ ,  $M'(t) = A(t)M(t)$ . Montrer que  $M_x(t) = A_x(t)M(t)$  et  $M_y(t) = A_y(t)M(t)$  avec

$$A_x = \begin{bmatrix} a_{1,1}(t) & a_{1,2}(t) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ a_{2,1}(t) & a_{2,2}(t) \end{bmatrix}.$$

4. Montrer que  $\det(M_x(t)) = a_{1,1}(t)\det(M(t))$  et  $\det(M_y(t)) = a_{2,2}(t)\det(M(t))$ . En déduire que  $\varphi'(t) = \text{trace}(A(t))\varphi(t)$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$  (avec  $\varphi(t) = \det(M(t))$ ).

NB: Les courageux pourront montrer que le résultat de la question 4 (c'est-à-dire  $\varphi'(t) = \text{trace}(A(t))\varphi(t)$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$ ) est encore vrai si la matrice  $M(t)$  est formée de  $n$  vecteurs lignes  $x_1(t), \dots, x_n(t)$  de  $\mathbb{R}^n$  et que  $M'(t) = A(t)M(t)$  avec  $n \geq 1$  et  $x_1, \dots, x_n$  fonctions de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}^n$ , de classe  $C^1$ .